

احياء مقترح / الوراثة

الفرع العلمي - الفصل الأول
(الدورة المميغية ٢٠١٧)

الأحياء
لهم بالتفوّق والنجاح

لهم بالتفوّق والنجاح
الأحياء

الأسئلة المقترحة طادة العلوم الحياتية

خاص بطلاب الفرع العلمي

الوحدة الأولى / الفصل الأول

الوراثة / الأسئلة المقترحة ٢٠١٢

إعداد!

استاذ العلوم الحياتية: رامي نصار

٠٧٨٦١٥٢٦٠ / ٠٧٨٦٤٧٠٠١٢ / ٠٧٩٦٧٨٧٣٦٢

المنهاج

٠٧٨٦١٥٢٦٠ / ٠٧٨٦٧٨٧٣٦٢

Facebook: Tawjihi On Line

درس اطادة: أ. رامي نصار

احياء مقترح / الوراثة

الأحياء
مع اهتمامكم بالتفوّق والنجاح

مع اهتمامكم بالتفوّق والنجاح
الأحياء

الفرع العلمي - الفصل الأول
(الدورة المبكرة ٢٠١٧)

الأسئلة التالية خاصة بالفرع العلمي:

إذا علمت أن جين عدم وجود القرون (N) سائد على جين وجود القرون (n) فإذا لقح ثور عديم القرون ثلاثة بقرات:

١) البقرة الأولى أعطت عجلًا له قرون (البقرة ذات قرون).

٢) البقرة الثانية أعطت عجلًا عديم القرون (البقرة ذات قرون).

٣) البقرة الثالثة أعطت عجلًا له قرون (البقرة عديمة القرون).

المطلوب: بين الطرز الجينية لكل من:

ج) العجلول الثلاث

ب) البقرات الثلاث

أ) الثور

nn - ٣ Nn - ٢ nn - ١

Nn - ٣ nn - ٢ nn - ١

Nn الإجابة:

جين صفة الأزهار الحمراء (R) في نبات ما سائد على جين صفة الأزهار البيضاء (r)، وجين صفة طول الساق (T) سائد على جين صفة قصر الساق (t)، فإذا جرى تلقيح بين نباتتين أحدهما أبيض الأزهار قصير الساق ونتجت نباتات تحمل الطرز الشكلية بالأعداد التالية: (٦١) نبات طويل الساق، (٥٩) نبات قصير الساق، (١٢٠) نبات أحمر الأزهار، المطلوب

٢) ما الطرز الجيني للنبات المجهول (للصفتين معاً).

٣) ما احتمال ظهور نباتات حمراء الأزهار قصيرة الساق.

٤/١ - ٣

TR. tR - ٢

TtRR - ١ الإجابة:

رجل أصلع فصيلة دمه غير معروفة مصاب بمرض نزف الدم، تزوج من فتاة عاديه الشعر فصيلة دمها B غير مصابة بمرض نزف الدم الوراثي لكن والدها مصاب به، أنجبا طفلاً ذكرًا عادي الشعر فصيلة دمه O غير مصاب بمرض نزف الدم، وطفلة أنثى صلعاء فصيلة دمها (AB) حاملة لجين الإصابة بمرض نزف الدم.

جين الصلع Z وجين الشعر الطبيعي H، وجين الإصابة بنزف الدم r وجين عدم الإصابة R :

المطلوب: ١- اكتب الطرز الجينية (للصفات الثلاث معاً) لكل من: الرجل : الفتاة : الطفل : الطفلة

٢- ما احتمال انجاب طفل فصيلة دمه (B) اصلع ومصاب بمرض نزف الدم الوراثي

الطفل: $X^R Y$ ii HH
الطفولة: $X^R X^r I^A I^B ZZ$

الرجل: $X^R Y I^A i ZH$
الفتاة: $X^R X^r I^B i ZH$
٦٤/٣

اجري تلقيح بين ثور أحمر الشعر وبقرنين مع أنثى أبيض الشعر وبذون قرون طرازها الجيني لصفة القرون نفس طراز الثور، وكان من بين الأفراد الناتجة ذكرًا بدون قرون ولون الشعر بعضه أحمر وبعضه أبيض، فإذا علمت أن جين وجود القرون (D) وجين عدم وجود القرون (S)، وجين الشعر الأحمر (C^R) وجين الشعر الأبيض (C^W) :

٢- ما احتمال ظهور أنثى بقرنين وحمراء الشعر؟

١- أكتب الطرز الجينية لكل من الأفراد المذكورين؟

٣- ما نوع توارث صفة لون الشعر ، وصفة القرون؟

٢- الأنثى: $SS C^R C^W$ -٣
ج) لون الشعر (سيادة مشتركة) ، القرون (متاثرة بالجنس)

١- الثور: $DS C^R C^R$
ب) الاحتمال (صفر)

احياء مقترن / الوراثة

اللهم اهبنا حياة ممتدة بالتفوق والنجاح

الله اهْمَّكُمْ بِالنَّفْعَ وَالْبَيْعَ
الْأَحْيَاءُ

الفرع العلمي - الفصل الأول

عند تهجين ذكر ذيابة خل ضامر الأجنحة أسود الجسم أحمر العيون مع أنثى طبيعية الأجنحة رمادية الجسم (غير نقية الصفتين) عيونها بيضاء، نتاج الطرز الشكلية لأفراد الجيل الأول بالنسبة التالية:

جين العيون الحمراء (R) ، جين العيون البيضاء (r) جين الأجنحة الطبيعية (T) جين الأجنحة الصامرة (t)

جين الجسم الرمادي (G) جين الجسم الأسود (g)

المطلوب: ١- اوجد الطرز الجينية للأبوين لجميع الصفات؟

٢- اوجد الطرز الجينية لجامیتات الأبوین؟

٣- هل تدل النتائج السابقة على حدوث عملية العبور الجيني ولماذا؟

$$\begin{array}{c|cc} T & t \\ G & g & X^r X^r \end{array} \quad \begin{array}{c|cc} t & t \\ g & g & X^R Y \end{array} \quad -\downarrow$$

$$\begin{array}{c|cc} T & t \\ G & X^r & , & g & X^r \end{array} \quad \begin{array}{c|cc} t \\ g & X^R & , & t \\ g & Y \end{array} \quad -\downarrow$$

٣- لا يدل على حدوث عملية العبور لعدم ظهور تراكيب جينية جديدة بين صفاتي لون الجسم وطبيعة الجناح.

في نوع من الدجاج جين وجود الريش على الأرجل (G) وجين عدم وجود الريش على الأرجل (g)، ويؤدي وجود جين سائد B مرتبط بالجنس إلى ظهور بقعه بيضاء في قم رؤوس الصغار تنمو إلى خطوط بيضاء على ريش الدجاج الأسود البالغ أجب عمما يلي:

١- ما الطرز الجينية والشكلية في الأفراد الناتجة من تزاوج ديك غير مخطط الريش عاري الأرجل مع دجاجة مخططة الريش مغطاة الأرجل، حيث كان من بين الأفراد ديك عارية الأرجل.

٢- كيف يمكن الاستفادة من نتائج هذا النوع من التزاوج لتحديد جنس الصغار حديثي الفقس للصفة المرتبطة بالجنس؟

X^BY Gg: الدجاجة X^bX^bgg: الديك ****

X^bX^bgg: الديك ****

X^bYgg X^BX^bgg X^bYGg X^BX^bGg - 1

$$X^B X^b gg \qquad X^b Y G g \qquad X^B X^b G g - \text{!}$$

X^bY_{Gg} **X^BX^b_{Gg}** - 1

$$X^BX^bGg - 1$$

ديك مخطط عاري الارجل. **غير مخططة مغطاة الارجل.** **ديك مخطط عارية الارجل.**

٢- تكون الأفراد الصغيرة (حديثة الفقس) التي تحمل بقعة بيضاء في قمة الرأس ذكوراً والتي لا تحمل البقعة البيضاء إناثاً عند إجراء تلقيح بين ذياباتي فاكهة الذكر أسود الجسم ضامر الجناح، والأنثى رمادية اللون طبيعية الجناح (غير نقاء الصفتين)، وحدثت نسبة تكرار عملية العبور بنسبة ١٧ % وكان جين اللون الرمادي (G) والأجنحة الطبيعية (T) سائدان على جيني اللون الأسود (g) والأجنحة الضامرة (t)

المطلوب:

١) أكتب الطرز الشكلية للأبناء؟

٢) ما نسبة كل فرد من الأفراد الناتجة من عملية العبور؟

٤- سوداء الجسم ضامرة الأجنحة
٣- سوداء الجسم طبيعية الأجنحة
٢- رمادية الريش طبيعية الأجنحة
١- سوداء الجسم ضامرة الأجنحة

الفرع العلمي - الفصل الأول
(الدورة المبكرة ٢٠١٧)

إذا كانت نسبة تكرار العبور بين الجينات التالية كما يلي:

$$\% ٤ = (C / E) \quad \% ١٤ = (A / D) \quad \% ٣ = (C / B) \quad \% ٥ = (E / D) \quad \% ١٠ = (D / B) \quad \% ٧ = (A / C)$$

المطلوب: ١- حدد كل من الجينات التالية (E / C / D) على الخارطة الجينية؟

٢- ما نسبة العبور بين (A / B) و (A / E) و (D / C) ؟

٣- ما نسبة الارتباط بين (A / C) و (E / D) ؟

A B C E D

$$- ٤ (\% ٤) , (\% ٩) , (\% ٧) - ٣ (\% ٩٥) , (\% ٩٣)$$

تزوج رجل فصيلة دمه (B) من فتاة فصيلة دمها (A) سليمة من عمي الألوان الوراثي، فولد لهما طفلة فصيلة دمها (O) ومصابة بعمي الألوان الوراثي. إذا كان جين الرؤية الطبيعية (R) سائداً على جين عمي الألوان (r)،

المطلوب: ١- ما الطرز الجينية (للصفتين معاً) لكل من الرجل والفتاة والطفلة؟

٢- ما الطرز الجينية (للصفتين معاً) المحتملة لجامياتات الرجل؟

٣- ما احتمال إنجاب طفل ذكر فصيلة دمه (AB) ومصاب بعمي الألوان الوراثي؟

$X^r X^r$ ii

$I^B X^r$

$X^R X^r I^A i$

$I^B Y$

الفتاة: $X^R X^r I^A i$

$i X^r$

$X^r Y I^B i$

$i Y$

- ٢ - ٣٢/١

تزوج شاب أصلع غير مصاب بمرض نزف الدم الوراثي والده طبعي الشعر، من فتاة غير مصابة بمرض نزف الدم طبيعية الشعر والدتها صلقاء، فأنجبا طفلاً ذكراً طبعي الشعر مصاباً بمرض نزف الدم. فإذا رمز لجين الإصابة بمرض نزف الدم (r)، ولجين عدم الإصابة (R)، ورمز لجين الشعر الطبيعي (H)، وجين الصلع (Z).

المطلوب: ١) ما الطرز الجينية لكل من الشاب والفتاة والطفل (للصفتين معاً).

٢- ما نوع الوراثة لكل من نزف الدم والصلع

$X^r Y H H$

الفتاة: $X^R X^r H Z$

الصلع: متأثرة بالجنس

١- الرجل: $X^R Y H Z$

٢- النزف: صفة مرتبطة بالجنس

عرف كل مما يلي:

- ١- التوزيع الحر: جيني كل صفة ينفصل عن بعضهما ويتوزع على الجاميات توزعاً عشوائياً ومستقلاً عن جيني الصفة الأخرى.
- ٢- العمى اللوني: عدم قدرة المصاب التمييز بين اللونين الأحمر والأخضر.
- ٣- الصفة غير المتماثلة: صفة وراثية يختلف جينها المقابلان.
- ٤- عبور جيني: عملية تبادل للجينات بين الكروماتيدات غير الشقيقة أثناء الطور التمهيدي من الانقسام المتساوي.
- ٥- السيادة مشتركة: أن كل جين من الجينين الم مقابلين لصفة معينة يسود سيادة تامة أي تظهر صفتاً الجينين معاً.
- ٦- صفة متاثرة بالجنس: صفة تحمل جيناتها على الكروموزوم الجسدي وتتاثر بالهرمونات الجنسية الذكرية.

علل كل مما يلي:

- ١- ظهور النسبة (٩ : ٣ : ١) عند توارث زوجاً الصفتين الم مقابلتين.
بسبب التوزيع الحر والذي يدل على توزع جيني كل صفة على الجاميات توزعاً عشوائياً ومستقلاً.
- ٢- يستخدم التقليح الاختباري للصفة السائدة؟
بسبب وجود هذه الصفة بالطراز الجيني النقى والطراز الجيني غير النقى
- ٣- تشتراك السيادة التامة بوراثة فصائل الدم عند الإنسان.
بسبب اجتماع الجين السادس I مع الجين المتاثر II
- ٤- ظهور بعض الصفات الوراثية عند الإنسان او الحيوان او النبات بشكل متدرج او متراكم.
لأنه هذه الصفات يتحكم بها أكثر من زوجين من الجينات المتعددة غير المقابلة
- ٥- وجود أكثر من طراز جيني مختلف لصفة لون القمح في النبات ولكن جميعها تعطي نفس الطراز الشكلي.
لوجود ثلاثة ازواج من الجينات تتحكم في انتاج الصبغة في خلايا كل منها (الجينات المتعددة غير المقابلة)
- ٦- تكون المسافة بين اي جينين على الكروموزوم ثابتة.
لان موقع الجينات على الكروموزوم ثابتة لا تتغير
- ٧- اختلاف الطرز الشكلي لأوراق نبات الحوذان المائي حسب الوسط البيئي الذي تنمو فيه.
بسبب تأثير بعض الجينات بالعوامل البيئية الخارجية والداخلية
- ٨- قد تختلف درجة لون الجلد لتتواءم متماثل يحمل نفس الطراز الجيني.
بسبب عوامل بيئية ، وهي اختلاف درجة التعرض لأشعة الشمس.
- ٩- نسبة إصابة الذكور بمرض نزف الدم أكثر منها في الإناث.
لأن هذه الصفة مرتبطة بالجنس ويسببها جين متعدد يحمل على الكروموزوم (X) ويكتفي لظهور الصفة عند الذكور وجود جين واحد، بينما يحتاج ظهور الصفة عند الإناث إلى جينين متاثرين وهذا الاحتمال

(ان أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا)

اتخني للجميع الفجاج

استاذ العلوم الطبيعية: رامي فضّل