



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣

(وثيقة محمية/محظوظ)

مدة الامتحان: ٣٠ دس

رقم المبحث: ١٠٨

المبحث : الرياضيات/ورقة الثانية/ف

اليوم والتاريخ: الخميس ١٣/٧/٢٠٢٣

رقم النموذج: (١)

الفرع: (أدبي، شرعي، فندي جامعات)

رقم الجلوس:

اسم الطالب:

ملحوظة مهمة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددتها (٥)؛ بحيث تكون إجابتك على السؤال الأول على نموذج الإجابة (ورقة القارئ الصوتي)، وتكون إجابتك عن باقي الأسئلة على دفتر الإجابة، علماً أن عدد صفحات الامتحان (٥).

سؤال الأول: (١٠٠ علامة)

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الصوتي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك في هذا السؤال، علماً أن عدد فقراته (٢٥).

(١) إذا كان $s = \frac{1}{2}(s^2 + 4s)$ دس ، فإن قيمة $\frac{1}{s}$ عندما $s = -1$ تساوي:

د) ٦

ج) ٦-

ب) ١٠

أ) ١٠-

(٢) إذا كان $s = \frac{4}{s+4}$ دس يساوي :

ب) ٤ طاس+ج

أ) ٤ طاس+ج

د) ٢ طاس+ج

ج) ٢ طاس+ج

(٣) إذا كان $q(s)$ اقترانًا متصلًا، وكان $q(2) = 9$ ، $q(s) = 16 - s$ ، فما قيمة $q(3)$ ؟

د) ٧

ج) ٧

ب) ٢٥

أ) ٢٥-

(٤) إذا كان $s^2 - 3s - 32 = 0$ ، فما قيمة الثابت ج؟

د) ٨

ج) ٨

ب) ٢

أ) ٢

(٥) إذا كان $s^2 - 8s + 20 = 0$ دس يساوي :

د) صفر

ج) ١

ب) ٨

أ) ٨-

(٦) إذا كان $q(s) = \frac{7}{8}s$ ، فإن $q(s)$ دس يساوي :

د) $\frac{7}{8}$ ج) $-\frac{7}{8}$ ب) $\frac{8}{7}$ أ) $-\frac{8}{7}$

(٧) إذا كان $m = 12$ دس ، فإن قيمة الثابت م تساوي:

د) ٤

ج) ٢-

ب) ٢

أ) ٤-

الصفحة الثانية/ نموذج (١)

(٨) إذا كان $\int_{-1}^4 f(s) ds = 8$ ، $\int_1^7 f(s) ds = 7$ ، فما قيمة $\int_1^8 f(s) ds$ ؟

١٥ د)

١٥ ج)

٩ ب)

٩ أ)

(٩) $\int_{-1}^3 s^3 ds$ يساوي :

$$b) \int_{-1}^3 s^3 ds = \frac{1}{4} [s^4]_{-1}^3$$

$$d) \int_{-1}^3 s^3 ds = \frac{1}{4} [s^4]_{-1}^3$$

$$a) \int_{-1}^3 s^3 ds = \frac{1}{4} [s^4]_{-1}^3$$

$$c) \int_{-1}^3 s^3 ds = \frac{1}{4} [s^4]_{-1}^3$$

(١٠) $\int_{-2}^2 (s^5 - s^6) ds$ يساوي :

$$b) \int_{-2}^2 (s^5 - s^6) ds = s^6 - s^5 \Big|_{-2}^2$$

$$d) \int_{-2}^2 (s^5 - s^6) ds = s^6 + s^5 \Big|_{-2}^2$$

$$a) \int_{-2}^2 (s^5 - s^6) ds = s^6 - s^5 \Big|_{-2}^2$$

$$c) \int_{-2}^2 (s^5 - s^6) ds = s^6 + s^5 \Big|_{-2}^2$$

(١١) قيمة $\int_{-1}^3 s^2 ds$ تساوي :

٩ د)

٩ ج)

٧ ب)

٧ أ)

(١٢) إذا كان $\int_1^3 h(s) ds = 1$ ، فإن قيمة $\int_1^3 (f(s) + h(s)) ds$ تساوي:

٦ د)

٤ ج)

٦ ب)

٤ أ)

(١٣) $\int_{-3}^4 g(x) dx$ يساوي :


$$a) -2 \text{ جتا}(4s - 3) + \text{ج}$$

$$d) 8 \text{ جتا}(4s - 3) + \text{ج}$$

$$a) 2 \text{ جتا}(4s - 3) + \text{ج}$$

$$c) -8 \text{ جتا}(4s - 3) + \text{ج}$$

(١٤) معتمداً الشكل المجاور الذي يمثل منحنى الاقتران $f(s)$ ، إذا كانت المساحة $M = 7$ وحدات مربعة ،



$\int_{-2}^2 f(s) ds = 4$ ، فما قيمة المساحة M بالوحدات المربعة ؟

١١ ب)

٧ أ)

٣ د)

٤ ج)

(١٥) إذا كان تسارع جسم يسير على خط مستقيم بعد مرور ن ثانية من بدء الحركة يعطى بالعلاقة :

$T(n) = (2n - 9) m/\text{ث}^2$ ، وكانت سرعته الابتدائية $U(0) = 8 m/\text{ث}$ ، فما سرعة الجسم بعد مرور

ثانيتين من بدء حركته ؟

٨ د)

٤ ج)

٢ ب)

٩ أ)

الصفحة الثالثة / نموذج (١)

(١٦) كم عدداً مكوناً من منزلتين يمكن تكوينه من مجموعة الأرقام $\{6, 8, 9\}$ ، إذا لم يسمح بتكرار الأرقام ؟

د) $9 \times 8 \times 6$

ج) $\binom{3}{2}$

ب) 3×3

أ) ل) (٢٠٣)

(١٧) إذا كان $\frac{(n-2)!}{(n-3)!} = 4$ ، فإن قيمة n تساوي :

د) ٧

ج) ٥

ب) ٦

أ) ٤

(١٨) ما قيمة المقدار $\frac{L(1,24)}{4!}$ ؟

د) ٢٣

ج) ٢٤

ب) ٦

أ) ١

(١٩) قيمة $\binom{8}{1}$ تساوي :

د) ٨

ج) ١٧

ب) ٧

أ) ١٨

(٢٠) حل المعادلة: $L(n, 3) = 6L(n, 2)$ هو :

د) ٧

ج) ٨

ب) ٣

أ) ٤

(٢١) إذا كان المتوسط الحسابي لعلامات طلبة في امتحان الرياضيات هو (٦٠) ، والانحراف المعياري لها (٦) ، فإن

العلامة التي تتحرف فوق المتوسط ثلاثة انحرافات معيارية هي:

د) ٥٤

ج) ٦٦

ب) ٧٨

أ) ٤٢

(٢٢) إذا كان (z) متغيراً عشوائياً طبيعياً معيارياً ، وكان $L(z \geq 1,6) = 0,9452$ ، فما قيمة $L(z \geq -1,6)$ ؟

د) ٠,٥٤٨٠

ج) ٠,٥٤٨

ب) ٠,٦٠٠٠

أ) ٠,٩٤٥٢

(٢٣) أي معاملات الارتباط الآتية هو الأضعف ؟

د) ٠,٦

ج) -٠,٩

ب) ٠,٤

أ) -٠,٧

(٢٤) معتمدًا الجدول المجاور الذي يمثل التوزيع الاحتمالي

للمتغير العشوائي S ، ما قيمة الثابت k ؟

ب) ٠,٣

د) ٠,١

٢	١	٠	S
$\frac{k}{3}$	٠,٧	٠,٢	$L(S)$

(٢٥) إذا كان S ، Ch متغيرين عدد قيم كل منها (٧) ، وكان $\sum_{r=1}^7 (S_r - \bar{S})^2 = 8$ ،

$\sum_{r=1}^7 (S_r - \bar{S})(Ch_r - \bar{Ch}) = 24$ ، $\bar{S} = 60$ ، $\bar{Ch} = 18$ ، مما معادلة خط الانحدار للتباين بقيم (Ch)

إذا علمت قيمة (S) ؟

د) $Ch = 6 - 3$

ج) $Ch = 3 - S$

ب) $Ch = S + 6$

أ) $Ch = 3 + S - 6$

الصفحة الرابعة/ نموذج (١)

السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

(١٨) علامة

أ) جد كلاً من التكاملات الآتية:

$$(1) \int_{s-2}^{s+2} ds, s \neq 2$$

$$(2) \int_{s-3}^{s-2} (s^2 + 4s - 1) ds$$

$$(3) \int_{s-3}^{s-2} (s^2 - 3s + 4) ds$$

ب) إذا كان $\int_{s=14}^{s=15} (h(s) + 6) ds = 14$ ، فجد قيمة $(q(s) - h(s)) ds$.

(٧) علامات

السؤال الثالث: (١٨ علامة)

أ) إذا كان ميل المماس لمنحنى الاقتران $q(s)$ عند النقطة (s, q) يساوي $(4s^3 - 2)$ ، فجد قاعدة الاقتران q ، علمًا بأن منحناه يمر بالنقطة $(1, 5)$.

ب) جد مساحة المنطقة المغلقة المحصورة بين منحنى الاقتران $q(s) = 6 - 2s$ ، محور السينات ، والمستقيمين $s = 1$ ، $s = 2$.

السؤال الرابع: (٢٤ علامة)

(١٢) علامة

أ) أجب عن كل مما يأتي:

$$(1) \text{جد قيمة: } \frac{L(2, 8)}{L(3, 7)} \times \frac{L(6)}{L(6)}$$

ب) جد قيمة n التي تحقق المعادلة الآتية:

$$(n-1)! = \frac{1}{3} L(3, 10) - L(6)$$

ب) مجموعة مكونة من (٦) رجال و (٥) نساء ، ما عدد الطرق التي يمكن بها تكوين لجنة رباعية منهم بحيث يكون فيها رجال على الأقل؟

الصفحة الخامسة/ نموذج (١)

السؤال الخامس: (٣٣ علامة)

أ) زرع شخص شجرين في حديقة منزله، إذا دلَّ المتغير العشوائي (S) على عدد الأشجار الناجحة، وكان احتمال نجاح زراعة الشجرة الواحدة (٠,٧)، فاكتب جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي S .

(١٢ علامة)

ب) تبع كُتل (٢٠٠٠) صندوق برتقال عند التعبئة توزيعاً طبيعياً، متوسطه الحسابي (٧) كغم، وانحرافه المعياري (٤)،
جد عدد الصناديق التي تقل كتلتها عن (٦,٨) كغم
(١١ علامة)

ملاحظة: يمكنك الاستفادة من الجدول الآتي الذي يمثل جزءاً من جدول التوزيع الطبيعي المعياري:

٢	١,٥	١	٠,٥	٠	٤
٠,٩٧٧٢	٠,٩٣٣٢	٠,٨٤١٣	٠,٦٩١٥	٠,٥٠٠٠	$P(z \geq)$

ج) جد معامل ارتباط بيرسون (ر) بين المتغيرين S ، $ص$ في الجدول الآتي:
(١٠ علامات)

٧	١٠	٩	٨	٦	S
٦	١٢	٨	١٠	٩	$ص$

انتهت الأسئلة

هذه الصغيرة تغير
شخصه للأبد
لأنها