

الاسم: كوش محمد محمد

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٨ / الدورة الصيفية

س ٣٠ : ١

مدة الامتحان : ٣٠ : ١

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠١٨/٦/٣٠

(وثيقة محمية / محدود)

المبحث : الرياضيات / الفصل الثاني

الفرع : الأدبي والشرعي والفندقي والسياحي (مسار الجامعات)

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٥)، علماً بأن عدد الصفحات (٤).

السؤال الأول: (٢٥ علامة)

أ) يتكوّن هذا الفرع من (٦) فقرات من نوع الاختيار من متعدد، يلي كل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح. انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة وجانبه رمز البديل الصحيح لها: (١٢ علامة)

(١) إذا كان ق اقتراناً متصلاً ، وكان $\lfloor$ ق (س) دس = $٣س - ٢$ ، فإن ق⁻ (٢) تساوي:

- (أ) ٦ (ب) ١٠ (ج) ٤ (د) ١٢

(٢) إذا كان ق (٢) = $٨ -$ ، ق (٤) = ١٢ ، فإن قيمة $\lfloor$ ق⁻ (س) دس تساوي:

- (أ) $٤ -$ (ب) ٤ (ج) ٢٠ (د) $٢٠ -$

(٣) إذا كان ق (س) = هـ جاس ، حيث هـ العدد النيبيري، فإن ق⁻ (س) تساوي:

- (أ) جتاس هـ جتاس (ب) جتاس هـ جاس (ج) -جتاس هـ جتاس (د) -جتاس هـ جاس

* (٤) قيمة $\lfloor$ ق^٣ ٦ دس تساوي:

- (أ) ١٨ (ب) ٦ (ج) ٣٦ (د) صفر


(٥) إذا كان ق (س) = لو^٢ (س + ١) ، فإن ق⁻ (١) تساوي:

- (أ) ٢ (ب) $\frac{٣}{٢}$ (ج) ١ (د) $\frac{٢}{٣}$

الصفحة الثانية

٦) يُمثّل الشكل المجاور منحنى الاقتران $ص = ق(س)$ ،

إذا كان $\int_0^b ق(س) دس = ٥$ ، وكانت المساحة



المحصورة بين منحنى الاقتران $ق$ ومحور السينات $س$ في الفترة $[٠, ٢]$ ، تساوي ١٢ وحدة مربعة،

فما قيمة $\int_0^2 ق(س) دس$ ؟

أ) ٧ (ب) ٧- (ج) ١٧ (د) ١٧-

ب) إذا كان $\int_0^3 ق(س) دس = ٣$ ، $\int_0^4 ق(س) دس = ٤$ ، فما قيمة $\int_0^4 (٣ ق(س) + ٢ س + ٤) دس$ ؟

(٦ علامات)

ج) جد كلاً من التكاملات الآتية:

(١) $\int_0^1 (س - ٢ - ٥) دس$ ، $س \neq ٠$

(٢) $\int_0^3 س^٣ جتا(س) دس$

(٤ علامات)

السؤال الثاني: (١٣ علامة)

أ) إذا كان ميل المماس لمنحنى الاقتران $ص = ق(س)$ عند النقطة $(س, ص)$ يساوي $(٢ - س)^٣$ ، فجد قاعدة الاقتران $ق$ ، علماً بأن منحناه يمرّ بالنقطة $(١, ٨)$.

(٤ علامات)

ب) تتحرك نقطة مادية على خط مستقيم بحيث أن سرعتها بعد مرور (ن) ثانية من بدء حركتها تعطى بالعلاقة: $ع(ن) = (٦ ن + ٩) م/ث$ ، جد موقع النقطة المادية بعد مرور (٥) ثوانٍ من بدء حركتها، علماً بأن موقعها الابتدائي $ف(٠) = ٣ م$

(٤ علامات)

ج) جد مساحة المنطقة المغلقة المحصورة بين منحنى الاقتران $ص = ق(س)$ وخط $س = ١٢ - ٢ س$ ومحور السينات على الفترة $[٠, ٨]$.

(٥ علامات)

السؤال الثالث: (١٦ علامة)

أ) يتناقص ثمن عقار بمرور الزمن وبصورة مستمرة منتظمة وفق قانون الاضمحلال بمعدل ٢٪ سنوياً،

إذا كان ثمنه الأصلي (٥٤٠٠٠) دينار، فكم يصبح ثمنه بعد مرور (٥٠) عاماً؟ (اعتبر $ه = ٧, ٢$)

(٣ علامات)

يتبع الصفحة الثالثة/ ...

الصفحة الثالثة

(ب) يتكوّن هذا الفرع من (٤) فقرات من نوع الاختيار من متعدد، يلي كل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح. انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة وبجانبه رمز البديل الصحيح لها: (٨ علامات)


(١) بكم طريقة يمكن اختيار قميص وحذاء لشرائهما من محل تجاري يبيع (٣) أنواع من القمصان و (٤) أنواع من الأحذية؟

- (أ) 4×3 (ب) ل (٣ ، ٤) (ج) 4×3 (د) $\left(\begin{matrix} 4 \\ 3 \end{matrix} \right)$

$$\begin{array}{r} 15 \times 7 \\ 105 \end{array}$$

(٢) ما عدد تباديل مجموعة مكونة من (٦) عناصر مأخوذة (٤) في كل مرة؟

- (أ) ل (٤ ، ٦) (ب) $\left(\begin{matrix} 6 \\ 4 \end{matrix} \right)$ (ج) 4×6 (د) $4 \times 6 \times 4$



(٣) الشكل المجاور يُمثّل منحنى توزيع طبيعي معياري لبيانات إحدى الدراسات، إذا علمت أن:

ل (ز $\geq$ p) = ٠,٣ ، فما قيمة ل (ز $\geq$ p) ؟

- (أ) ٠,٣ (ب) ٠,٠٣ (ج) ٠,٧ (د) ٠,٠٧

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

(٤) معتمداً الجدول المجاور الذي يُبيّن العلامات المعيارية لطالب في أربعة مباحث، ما المبحث الذي يكون تحصيل الطالب فيه أفضل؟

المبحث	الرياضيات	التاريخ	الجغرافيا	اللغة العربية
العلامة المعيارية	١	٠	٣-	٢

(أ) الرياضيات (ب) التاريخ

(ج) الجغرافيا (د) اللغة العربية

(ج) بكم طريقة يمكن تشكيل فريق طبي رباعي من بين (٦) أطباء، و (٤) ممرضين للمشاركة في يوم طبي مجاني، بحيث يكون رئيس الفريق طبيب ومساعد ممرض وبقيّة الأعضاء من الأطباء؟ (٥ علامات)

$$\begin{array}{r} 4 \times 6 \\ 24 \end{array}$$

السؤال الرابع: (١٤ علامة)

(أ) حلّ المعادلة الآتية:

$$n! = l(3, n) \times 6!$$

(ب) إذا كان س متغيراً عشوائياً ذا حدين معاملته n = ٣ ، p = ٠,٩ ، فجد كلاً مما يأتي: (٦ علامات)

$$1 - (0.9)^3 = 0.271$$

(١) ل (س = ٢) $0.081 \times 0.1 \times 0.1$

(٢) ل (س $\leq$ ١)

$$0.9 + 0.081 \times 0.1 \times 0.1 = 0.90081$$

يتبع الصفحة الرابعة/ ...

الصفحة الرابعة

ج) تتبع علامات طلبة في امتحان عام توزيعاً طبيعياً متوسطه الحسابي (٧٥) ، وانحرافه المعياري (٥) ، إذا اختير طالب عشوائياً، فما احتمال أن تكون علامته أقل من أو يساوي (٨٠)؟ (٤ علامات)

ملاحظة: يمكنك الاستفادة من الجدول الآتي الذي يُمثل جزءاً من جدول التوزيع الطبيعي المعياري:

$$\frac{75-80}{5} = -1 \quad \text{و} \quad \frac{75-75}{5} = 0 \quad \text{و} \quad \frac{80-75}{5} = 1$$

ز	٠	٠,١	٠,٢	١	٢
ل (ز ≥ ٢)	٠,٥٠٠٠	٠,٥٣٩٨	٠,٥٧٩٣	٠,٨٤١٣	٠,٩٧٧٢

السؤال الخامس: (٧ علامات)

أ) إذا كان س ، ص متغيرين، عدد قيم كل منهما (٥) ، وكان

$$\sum_{k=1}^5 (s_k - \bar{s})(v_k - \bar{v}) = 7 \quad , \quad \sum_{k=1}^5 (s_k - \bar{s})^2 = 10 \quad , \quad \sum_{k=1}^5 (v_k - \bar{v})^2 = 20$$

فجد معامل ارتباط بيرسون الخطي بين المتغيرين س ، ص

(٤ علامات)

ب) إذا كانت معادلة خط الانحدار للعلاقة بين معدل طالب في الثانوية العامة (س)، ومعدل في

الجامعة (ص) هي: $\hat{v} = 1,4s - 35$ ، فتنبأ بمعدل طالب في الجامعة إذا كان

معدل في الثانوية العامة (٨٥)

(٣ علامات)

$$\begin{aligned} \hat{v} &= 1,4s - 35 \\ \hat{v} &= 1,4 \times 85 - 35 \\ \hat{v} &= 119 - 35 \\ \hat{v} &= 84 \end{aligned}$$

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

$$\begin{array}{r} 85 \times 1,4 \\ 119 \\ \hline 119 - 35 \\ \hline 84 \end{array}$$