تطبيقات هندسة

* حيث قاعده الاقتران ⇐ نفس كامل المنحنى
او كامل الدالة المعطاه

وعندما نقطة تقع (-١، ٣)

نعوض ان ناتج تعويض (-١) مكان كل س يعيد التكامل
لصل ٣ الهدف منه ايجاد صفر ثابت التكامل

مثال: حيث قاعده الاقتران ق دار سؤال ما ان منحناه يمر بالنقطة (-١، ٣)

وأن ميل المماس [ق'(س)] ص = ق(س) عند النقطة (س، ص)

نعوض بالقاعده ق'(س) = ٢س - ١

الحل: [ق(س) = ∫ ق'(س) د س]

ق(س) = ∫ (٢س - ١) د س = ٢س²/٢ - س + جـ

ق(س) = س² - س + جـ

(-١، ٣) ⇐ ٣ = (-١)² - (-١) + جـ

٣ = ١ + ١ + جـ ⇐ جـ = ١

ق(س) = س² - س + ١

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

مثال : جد قاعده الاقتران ق ق علماً بأن ميل المماس لمنحنى ق عند النقطه (س ، ص) يحقق القاعده

ق ق (س) = $٣س^{٢} - ٨س$ وأن منحناه يمر بالنقطه (-١ ، ٣)

الحل : ق (س) = $\int (٣س^{٢} - ٨س)$ د س

ق (س) = $\frac{٣س^{٣}}{٣} - \frac{٨س^{٢}}{٢} + ج$

ق (س) = $س^{٣} - ٤س^{٢} + ج$

$٣ = (-١)^{٣} - ٤(-١)^{٢} + ج$

$٣ = -١ - ٤ + ج$

$٣ = -٥ + ج$

$ج = ٨$

ق (س) = $س^{٣} - ٤س^{٢} + ٨$

تدريب: جد قيمة ه (١٤) ، علمًا بأن ميل المماس لمنحنى الاقتران هو = ه (س) عند النقطة (س ، ص)

تحقق بالعلاقة $ق'(س) = \sqrt[3]{٦ س - ١}$ وأن منحناه يمر بالنقطة (٠ ، ٥)

الحل: $ه(س) = \int ٠.٦ (٦ س - ١)^{\frac{1}{٣}} \, د س$

$ه(س) = \frac{٠.٦ \times ٣}{٤} (٦ س - ١)^{\frac{٤}{٣}} + ج$

$ه(س) = \frac{٩}{١٠} \sqrt[٣]{(٦ س - ١)^{٤}} + ج$

$ه(س) = \frac{٩}{١٠} \sqrt[٣]{(٦ س - ١)^{٣} \times (٦ س - ١)} + ج$

$٥ = \frac{٩}{١٠} \sqrt[٣]{١} + ج$

$٥ = \frac{٩}{١٠} + ج$

$ج = ٥ - \frac{٩}{١٠} = \frac{٤٠}{٨} - \frac{٩}{١٠} = \frac{١}{١٠}$

$ه(س) = \frac{٩}{١٠} \sqrt[٣]{(٦ س - ١)^{٤}} + \frac{١}{١٠}$

$ه(١٤) = \frac{٩}{١٠} \sqrt[٣]{(٦ \times ١٤ - ١)^{٤}} + \frac{١}{١٠}$

$= \frac{٩}{١٠} (٨٣ \times ٨٣ \times ٨٣ \times ٨٣)^{\frac{١}{٣}} + \frac{١}{١٠}$

$= \frac{٩}{١٠} (٨٣)^{٤} + \frac{١}{١٠} = \frac{٤٣٤٢٤١}{١٠} = ٤٣٤٢٤.١$