إختر رمز الاجابة الصحيحة

[1] إذا كان $\lim_{س \to 1} \frac{ه(س) - 6}{س - 1} = 4$ فإن $\lim_{س \to 1} \frac{س^2 + 2س - 3}{ه(س) - 6} =$

أ) 1 ب) -1 جـ) 2 د) -2

[2] إذا كانت $\lim_{س \to 3} (2 ه(س) - 1) = 5$ ، $\lim_{س \to 3} هـ(س) = 2$

فإن $\lim_{س \to 3} (ه(س) + هـ(2س - 3) - س)$

أ) 4 ب) 7 جـ) -4 د) 2

[3] $\lim_{س \to 0} (|س| + [س])$

أ) صفر ب) 1 جـ) -1 د) غير موجودة

[4] $\lim_{س \to \frac{\pi}{2}} \frac{\text{جتا} س}{2س - \pi}$

أ) $-\frac{1}{2}$ ب) $\frac{1}{2}$ جـ) -1 د) 1

[5] إذا كان $ه(س)$ متصل عند $س = 5$ ، ويمر بالنقطة $(5, 2)$ ، $ه(2) = 4$

فإن $\lim_{س \to 2} (ه(س + 3) + س^2) =$

أ) 10 ب) 8 جـ) 6 د) 4

[6] $\lim_{س \to -2} \frac{س^2 - [س + 3]}{س - 2} =$

أ) 4 ب) -4 جـ) 8 د) صفر

[7] $\lim_{س \to 5} \frac{\sqrt{س - 5} - 2}{س - 3} =$

أ) صفر ب) -1 جـ) 1 د) غير موجودة

٨) $\lim_{هـ \to 0} \frac{٥(٢+هـ)^{٣} - ٤٠}{هـ}$

أ) ٦٠ ب) ١٦ جـ) ٦ د) -٦

٩) $\lim_{س \to 0^+} س \, ظا^{٢}(٣س)$

أ) $\frac{١}{٩}$ ب) ٩ جـ) -٩ د) $-\frac{١}{٩}$

١٠) $\lim_{س \to ٢} \frac{س^{٣} - ٤}{٧س - ١٠}$

أ) ٤ ب) ٢ جـ) صفر د) غير موجودة

١١) إذا كان $د(س) = \frac{٢س^{٣} - ١١}{س^{٢} + م س + ٩}$ متصلاً على ح ، فإن مجموعة الكتابة م

أ) $(-٩ ، ٩)$ ب) $(-٣ ، ٣)$ جـ) $[-٩ ، ٩]$ د) $(-٦ ، ٦)$

١٢) $\lim_{س \to -٢} \frac{ظا \pi س}{س + ٢}$

أ) ٢ ب) π جـ) $-\pi$ د) ٢π

١٣) $\lim_{س \to \frac{\pi}{٤}} \frac{جتا^{٢} س - جتا^{٢} \frac{\pi}{٤}}{٤س - \pi} =$

أ) ١ ب) -١ جـ) $\frac{١}{٤}$ د) $-\frac{١}{٤}$

١٤) $\lim_{س \to -١^-} \frac{|\frac{١}{س+٣}| - \frac{١}{٤}}{|س - ١|} =$

أ) ١٦ ب) -٦ جـ) -١٦ د) $\frac{١}{١٦}$

١٥) $\lim_{س \to ٢} \frac{٨^{س} - ٦٤}{٨ - ٢^{س+١}} =$

أ) ١٢ ب) ٢٤ جـ) -٢٤ د) -١٢

١٦) $\lim_{س \to 0} \frac{ظا ٢س - ١}{س^{٢}} =$

أ) $\frac{١}{٢}$ ب) ٢ جـ) ٤ د) ١

١٧) إذا كانت $\lim_{س \to ٣} \frac{س^{٥} - ٩^{٥}}{س - ٣} = ٨٠$ ، فإن مجموعة الكتابة ٩ ، ٩ $\in$ ط

أ) ٣ ب) ٤ جـ) ٥ د) ٥

(١٨) إذا كان $هـ(س) = \begin{cases} [س] + ب & ، ١ \leq س < ٢ \\ \frac{١٠}{س} & ، ٢ \leq س \leq ٣ \end{cases}$ ما قيمة الثابت ب التي تجعل $هـ$ متصلاً على $[١ ، ٣]$

أ) ٤ ب) -٥ جـ) ٣ د) ١

(١٩) نهـا $\frac{[س+٢] - ٧ - ٤ + ٦س}{|س-١٢| + ٢}$ $س \to ٢$ =

أ) ٩ ب) $-\frac{٥}{٤}$ جـ) ٤ د) -٥

(٢٠) نهـا $\frac{هـ^{٢س} - هـ^{س+١}}{هـ^{٣س} - هـ^{٣}}$ $س \to ١$ =

أ) $٢هـ$ ب) $\frac{١}{هـ^{٣}}$ جـ) $\frac{١}{٣هـ - هـ^{٣}}$ د) $\frac{٢}{هـ^{٣}}$

(٢١) إذا كانت نهـا $\frac{١ - جا(أ - س)}{٣س^{٢}}$ $س \to ٠$ = ب ، $أ \in [٠ ، \pi]$ ، فإن قيمة الثابت ب =

أ) ٦ ب) $\frac{١}{٢}$ جـ) $\frac{١}{٦}$ د) ٢

(٢٢) إذا كان $هـ(س) = \begin{cases} \frac{س^{٢} - س - ٣٠}{أ س - ٦أ} & ، س > ٦ \\ ب س & ، س < ٦ \\ ١ & ، س = ٦ \end{cases}$ متصلاً على ح ، ما قيمة الثابتين أ ، ب على الترتيب

أ) $\{١١ ، ٦\}$ ب) $\{١١ ، \frac{١}{٦}\}$ جـ) $\{-١١ ، \frac{١}{٦}\}$ د) $\{-١١ ، -\frac{١}{٦}\}$

(٢٣) إذا كان $هـ(س)$ متصل ، وكانت نهـا $\frac{هـ(س)}{س}$ $س \to ٢$ = ٣ فإن نهـا $\frac{هـ(س)}{س}$ $س \to ٢$ =

أ) ٩ ب) ١٨ جـ) ٦ د) ٣٦

(٢٤) اذا كان $هـ(س) = \begin{cases} ٣ & ، س = ١ \\ [س] + ٥ & ، ١ < س < ٢ \\ ٦ & ، س = ٢ \end{cases}$ فإن الاقتران $هـ$ متصل على الفترة

أ) $[١ ، ٢]$ ب) $(١ ، ٢)$ جـ) $[١ ، ٢)$ د) $(١ ، ٢]$

(٢٥) معتمداً على الشكل الذي يمثل $هـ(س)$ ، المعرف على ح

فإن مجموعة قيم أ حيث نهـا $هـ(س)$ $س \to أ$ = صفر هي



أ) $\{-٢ ، ٠\}$ ب) $\{$صفر$\}$

جـ) $\{٠ ، ٢\}$ د) $\{-٢ ، ٠ ، ٢\}$

٢٦ إذا كان هـ اقترانًا متصلاً عند س = ١ ، وكان هـ(١) = ٤ فإن $\lim_{س \to ١} \left(\frac{|س-١|}{س-١} + هـ(س) \right)$ =

أ) ٣ ب) ١ جـ) ٥ د) غير موجودة

٢٧ إذا كان ل(س) = $\begin{cases} ٢ جتا^٢ س ، & س < \frac{\pi}{٢} \\ أ س^٢ + \pi^٢ ، & س \geq \frac{\pi}{٢} \end{cases}$ فإن قيمة أ التي تجعل ل متصل عند س = $\frac{\pi}{٢}$ هي

أ) -٢ ب) صفر جـ) -٤ د) ٤

٢٨ إذا كانت $\lim_{س \to ٠} \frac{٤ س^٢ - جا ب س}{ب س - ظا ٤ س} = \frac{١}{٤}$ ، جد قيمة الثابت ب

أ) $-\frac{٤}{٥}$ ب) $\frac{٤}{٥}$ جـ) $\frac{٥}{٤}$ د) $-\frac{٥}{٤}$

٢٩ إذا كان هـ(س) = $\begin{cases} أ س^٣ - ب س + ١ ، & س < ١ \\ ٥ ، & س = ١ \\ س^٢ - (أ+ب) س + ٢ ، & س > ١ \end{cases}$ متصلاً عند س = ١ فإن قيمة الثابتين أ ، ب على الترتيب

أ) {١ ، ٣} ب) {١ ، -٣} جـ) {٣ ، ١} د) {٣ ، -٣}

٣٠ إذا كان ل(س) = $\begin{cases} ٢ س + ١ ، & س \in ص \\ س^٢ + ٤ ، & س \notin ص \end{cases}$ فإن $\lim_{س \to ٢}$ ل(س)

أ) ٥ ب) ٨ جـ) ٢ د) غير موجودة

٣١ $\lim_{س \to ٠} \frac{١ - جا س - جتا^٢ س}{س}$ =

أ) $-\frac{١}{٢}$ ب) -١ جـ) صفر د) $\frac{١}{٢}$

٣٢ إذا كانت $\lim_{س \to ٣} \frac{س^٢ - أ(س+١) + ٧}{س - ٣}$ موجودة ، فما قيمة الثابت أ =

أ) ٤ ب) -٤ جـ) $\frac{٣}{٤}$ د) $-\frac{٣}{٤}$

٣٣ إذا كانت $\lim_{س \to أ}$ هـ(س-٢) = $\lim_{س \to ٤}$ هـ(أس+١) ، فإن قيمة الثابت أ =

أ) ١ ب) ٥ جـ) ٤ د) ٢

٣٤ $\lim_{س \to -٢} \frac{س + [\frac{١}{٣} س + ٤]}{|س| - ٢}$ =

أ) -١ ب) ١ جـ) ٢ د) -٢

(٣٥) اذا كان هـ(س) = |٤ - س²| ، فإن مجموعة قيم الثابت م التي تجعل نهـا هـ(س) موجودة
س→م

أ) (-٢ ، ٢) ب) [-٢ ، ٢] جـ) [-٢ ، ٢) د) (-٢ ، ٢]

(٣٦) اذا كان ل(س) = [س + ٤] ، هـ(س) = [٣ - س] فإن نهـا (ل(س) - هـ(س)) =
س→١

أ) ٦ ب) ٨ جـ) ٧ د) غير موجودة

(٣٧) نهـا ظا(π/٤ - π/٤ س) / (س² - ٢س) =
س→١

أ) ١ ب) -١ جـ) π/٢ د) π/٤

(٣٨) نهـا (π - ٢س) ظاس =
س→π/٢

أ) ٢ ب) -٢ جـ) صفر د) ١/٢

(٣٩) نهـا ٧س³ ظا²٢س قتا٥س =
س→٠

أ) ٧/٢ ب) ٧/١٠ جـ) ٧٠ د) ١٤٠

(٤٠) إذا كان هـ(س) = { س² + ١ ، |س| < ٢ ، ٣س - ١ ، |س| ≥ ٢ } فإن قيم س التي يكون عندها هـ(س) غير متصل

أ) ٢ ب) ١ جـ) -٢ د) {-٢ ، ٢}

(٤١) إذا كان هـ(س) = (١ - س) / (١٧ - س²) ، فإن هـ(س) متصل بالفترة

أ) [-١ ، ١] ب) (-٥٥ ، -١] جـ) [١ ، ٥٥) د) (-١ ، ١)

(٤٢) اذا كان هـ(س) = { ٥/س + س² ، ٠ < س ≤ ٢ ، [س + ١] ، ٢ < س < ٣ } اقترانا متصلاً عند س = ٢ فإن قيمة الثابت م =

أ) -٤ ب) ٤ جـ) ٢ د) -٢

(٤٣) نهـا س جا(π/٢ س) / (س - ١) =
س→١

أ) ١ ب) -١ جـ) π د) -π

(٤٤) إذا كان هـ(س) كثير حدود، وكانت نهـا هـ(س) / س = ٤ فإن نهـا (س+١)² - ١ / هـ(س) تساوي
س→٠ س→٠

أ) ٤ ب) ١ جـ) ١/٤ د) ٠

٤٥ الشكل المجاور يمثل $f(س)$ المعرف على $[-١ ، ٥]$ فإن $\lim_{س \to ١^+} (f(س-٣) + [٥-س]) =$



أ) ٢ ب) ٣

جـ) ٥ د) ٦

٤٦ إذا كانت $\lim_{س \to جـ} ق(س)$ غير موجودة فإن قيمة الثابت جـ تساوي

أ) $[٤ ، ∞)$ ب) $(٤ ، ∞)$ جـ) $(-∞ ، ٤]$ د) $(-∞ ، ٤)$

٤٧ اذا كانت $\lim_{س \to ٩} \frac{س^{٤} - ٩}{س^{٣} - س - ٦}$ غير موجودة ، فإن قيم الثابت م =

أ) $\{٣ ، ٢\}$ ب) $\{٣\}$ جـ) $\{٣ ، -٢\}$ د) $\{-٢\}$

٤٨ $\lim_{س \to ٠} \frac{س \, جا ٥س - ظا ٥س}{جا ٤س - ٣س} =$

أ) $-\frac{٥}{٢}$ ب) $\frac{٥}{٢}$ جـ) ٢ د) -٢

٤٩ $\lim_{س \to ٣} \frac{س^{٤} - ٣س}{س - \sqrt{س + ١} - ١} =$

أ) -٤ ب) ٤ جـ) ٢ د) -٢

٥٠ $\lim_{س \to ٠^-} جا س \sqrt{١ - \frac{١}{س^{٢}}} =$

أ) ١ ب) -١ جـ) صفر د) غير موجودة

٥١ اعتماداً على الشكل المجاور الذي يمثل منحنى ه(س) بالفترة [-٣، ٣] ما قيم س حيث -٣ < س < ٣ التي يكون عندها الاقتران غير قابل للاشتقاق



أ) {-١، ٢} ب) {صفر}

ج) {-١، ٠، ٢} د) [-١، ٠] ∪ [٢، ٣]

٥٢ $\lim_{هـ \to 0} \frac{\text{ظا}\frac{1}{2} - \text{جتا}(\frac{\pi}{3} + هـ)}{هـ}$ =

أ) $\frac{1}{2}$ ب) $-\frac{1}{2}$ ج) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ د) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

٥٣ إذا كان ق'(٢) = ٦ ، فإن نها $\lim_{هـ \to 0} \frac{ه(٢+٣هـ) - ه(٢)}{-هـ}$ تساوي

أ) -١٨ ب) ١٨ ج) -٦ د) -٢

٥٤ إذا كان معدل التغير في الاقتران ه(س) في الفترة [-٢، م] يساوي $\frac{م^2 - ٤}{م + ٢}$ فإن ق'(-٢) تساوي

أ) ٢ ب) صفر ج) -٤ د) ٤

٥٥ إذا كان معدل التغير للاقتران ه(س) عندما تتغير س من س إلى س + هـ يساوي $س^2 هـ - ٤ س هـ^2$ ، فإن ق'(٣) =

أ) ٩ ب) -٩ ج) صفر د) -٣

٥٦ إذا كان ه(س) = |٤ - ٢ص| فإن ق'(٢) =

أ) ٢ ب) -٢ ج) صفر د) غير موجودة

٥٧ إذا كان ه(٤) = ٥ ، ق'(٤) = -١ ، ق(٤) = ٢ ، فإن $(\frac{ه}{ق})'(٤)$ تساوي

أ) ١١ ب) -٩ ج) -٦ د) ٦

٥٨ إذا كان ص = ه(س) ، $ص^3$ = ه(٢س^٤ - ص) ، ق'(٦) = ٤ ، ه(٦) = -٨ فإن $\frac{دص}{دس}\Big|_{س=٢}$

أ) $\frac{7}{3}$ ب) $-\frac{7}{3}$ ج) $\frac{3}{7}$ د) $-\frac{3}{7}$

٥٩) إذا كان $ه(س) = \begin{cases} س^2 + ٢س + ٣ & ، س \geq ١ \\ [س] + ٤س & ، س < ١ \end{cases}$ فإن $هَ(١) =$

أ) ١ ب) ٤ جـ) صفر د) غير موجودة

٦٠) إذا كان $ل(س)$ قابلاً للاشتقاق عند $س = -١$ ، $ل(-١) = ١$ ، $ل'(-١) = ٢$
وكان $ه(س) = ظا(\frac{\pi}{٣} ل(س))$ فإن $هَ(-١) =$

أ) $\frac{٨}{٣}$ ب) $\frac{٨}{\pi٣}$ جـ) $\frac{٨}{٣}\pi$ د) $\frac{\pi}{٣}^٢$

٦١) اذا كان $ل(س)$ قابلاً للاشتقاق عند $س = ٢$ وكان $ل(٢) = ٣$ ، $ل'(٢) = -١$
وكان $ه(س) = \frac{(ل(س))^٢}{س^٢ - س}$ فإن $هَ(٢)$

أ) ٧ ب) -٦ جـ) $-\frac{٣٩}{٤}$ د) $-\frac{١٣}{٤}$

٦٢) إذا كان $ه$ ، $هـ$ اقترانين قابلين للاشتقاق، بحيث كان $هَ(س) = ه(س)$
$قَ(س) = -هـ(س)$ وكان $ل(س) = (هـ(س))^٢ + (ه(س))^٢$ فإن $ل'(س) =$

أ) $-٤ه(س)قَ(س)$ ب) $٤ه(س)قَ(س)$ جـ) ١ د) صفر

٦٣) اذا كان $ه(س) = س^٣ + ٢س$ ، $هـ(س) = ٣س^٢$ فإن $(قَ \circ هـ)''(٢) =$

أ) ٨٤×٢ ب) ١٠٩٦ جـ) ١٩٩٦ د) ٢٤٤٦

٦٤) $ه(س) = ٢$ ظا س ، $هـ(س) = \frac{س}{س+٤}$ جد $(هـ \circ ه)'(\frac{\pi}{٤})$

أ) $\frac{٤}{٩}$ ب) $-\frac{٤}{٩}$ جـ) $\frac{٩}{٤}$ د) $-\frac{٩}{٤}$

٦٥) إذا كان $ص = ن^٢ - ٤ن$ ، $س = ٣ن - ٥$ فإن $\frac{د^٢ص}{دس^٢}$ عندما $ن = ٦$

أ) ١ ب) $\frac{١}{٦}$ جـ) ٦ د) $\frac{١}{٢}$

٦٦) اذا كان $س^٣ + ٢سص + ص^٣ = ٣$ فإن $\frac{دص}{دس}$ عند النقطة $(٢ ، -١)$

أ) $\frac{١٠}{٧}$ ب) $-\frac{١٠}{٧}$ جـ) $\frac{٧}{١٠}$ د) $-\frac{٧}{١٠}$

٦٧) اذا كان $هـ(س) = ه(جا٢س)$ ، وكان $هَ(\frac{\pi}{٣}) = ٨$ ، فإن $هَ(\frac{\pi}{٦})$

أ) ١٦ ب) -١٦ جـ) ٨ د) -٨

٦٨ إذا كان $هـ(س^3-1) = \frac{1}{س} - س^2$ ، فإن $هـ'(7)$

أ) $\frac{5}{48}$ ب) $\frac{48}{5}$ جـ) $-\frac{5}{48}$ د) $-\frac{48}{5}$

٦٩ إذا كان $ص = (ق س + ظ س)^2$ ، فإن $\frac{د ص}{د س}$ عندما $س$ = صفر هي

أ) ٢ ب) -2 جـ) صفر د) ١

٧٠ إذا كان $هـ(س) = أ س^2 + 3 س$ ، وكانت $\lim_{س \to 1} \frac{هـ(س) - هـ(1)}{س - 1} = 7$ ، ما قيمة الثابت أ

أ) ٤ ب) ١٢ جـ) ٢ د) صفر

٧١ اذا كان $هـ(س) = 2 س^ن$ ، وكانت $هـ^{(3)}(س) = 12 أ س^2$ ، فإن الثابت أ =

أ) ٧ ب) ٨ جـ) ٩ د) ١٠

٧٢ مستطيل طوله ٣ أمثال عرضه ، جد معدل تغير مساحته بالنسبة لعرضه عندما يصبح العرض = ٥

أ) ٢٠ ب) ٤٠ جـ) ٦٠ د) ٣٠

٧٣ $هـ(س) = س^3 + س^5$ جد $\lim_{ه \to 0} \frac{هـ(1+2ه) - هـ(1-2ه)}{ه}$

أ) ٨ ب) ١٦ جـ) ٤٨ د) $\frac{4}{3}$

٧٤ اذا كان $هـ(س) = [\sqrt{س^2 + 4س}]$ فإن $هـ'(3) =$

أ) صفر ب) غير موجودة جـ) ٣ د) $\sqrt{10}$

٧٥ إذا كان $هـ(س) = \begin{cases} س^3 + ب ، & س < 2 \\ أ س^2 + 8 س ، & س \geq 2 \end{cases}$ وكانت $هـ'(2)$ موجودة فإن قيمة ب ، أ على الترتيب

أ) $\{1، 12\}$ ب) $\{-2، 6\}$ جـ) $\{12، 1\}$ د) $\{6، -2\}$

٧٦ اذا كان $هـ(س) = \frac{|س^2 - 1|}{[س + 1]}$ فإن $هـ'(\frac{1}{2}) =$

أ) ١ ب) -1 جـ) ٢ د) -2

٧٧ إذا كان $جا ص = 2 جا س$ فإن $(ص')^2$ تساوي

أ) $3 ق أ ص$ ب) $3 ق أ ص + 1$ جـ) $3 ق أ ص + 1$ د) $3 ق أ س$

٧٨ إذا كان $\frac{1}{س} + \frac{1}{س + ص} = \frac{ص}{س}$ فإن $\frac{د ص}{د س}$ عندما $ص = 3$ هي

أ) ٢ ب) ٣ جـ) ٤ د) ١

٧٩) $ق(س) = ظا٢س$ ، فإن $ق''(س) + ٥ق(س)$ يساوي

أ) $ظا٥س$ ب) $ظا٢س$ ج) $جا٢س$ د) $جا٥س$

٨٠) إذا كان $\frac{دص}{دس} = ٣ن^{٢}$ ، $\frac{دس}{دن} = \frac{١}{٢ن}$ ، فإن $\frac{د^{٢}ص}{دس^{٢}}$ عند $ن = ٢$ يساوي

أ) ٤٠ ب) ٤٢ ج) ٤٥ د) ٤٨

٨١) إذا كان $(ص - س)^{٢} = -٢س + ٢٨$ فإن صَ عند النقطة $(٢، ٦)$

أ) ٥ ب) ١٥ ج) ٢٥ د) $\frac{٥}{٤}$

٨٢) إذا كان $ص = س^{٤} - ٧س + ٩$ فإن قيم س التي تحقق المعادلة $ص + صَ + صً = صفر$ هي

أ) $\{١، -٤\}$ ب) $\{٤، ١\}$ ج) $\{-١، ٤\}$ د) $\{-١، -٤\}$

٨٣) إذا كان $ص = ٧^{س}$ فإن $\frac{دص}{دس}$ $(ص \times صَ)$ يساوي

أ) ١ ب) صفر ج) ٢ د) -٣

٨٤) إذا كان $ق(٢س + ١) = ٣س \, هـ(س^{٤})$ وكان $هـ(١) = ٥$ ، $هَ(١) = -٢$ فإن $قَ(٣)$

أ) $\frac{٣}{٢}$ ب) ٣ ج) ٣ د) $\frac{٢}{٣}$

٨٥) إذا كان $ص = جا^{٢}س$ فإن $\frac{د^{٢}ص}{دس^{٢}}$ بدلالة ص

أ) $٢ - ٤ص$ ب) $ص^{٢} - ٢ص$ ج) $ص - ص^{٢}$ د) $ص^{٢} + ص$

٨٦) إذا كان $س = جا٣ث$ ، $ص = ظا٥ث$ ، فإن $\frac{د^{٢}ص}{دس^{٢}}$ عندما $ث = \frac{\pi}{٥}$

أ) ٢ ب) ١ ج) ٣ د) -١

٨٧) إذا كان $ص = جتا٣س$ ، فإن $(ص^{٢})''$ عندما $س = \frac{\pi}{٢}$

أ) ١٢ ب) ١ ج) ٢ د) -٢

٨٨) إذا كان $ق(س) = س$ ، $هـ(س) = س^{٢} + ١$ وكان $ص = (ق \circ هـ)^{٣}(س)$ فإن $\frac{دص}{دس}$ عند $س = ١$

أ) ١٥٠ ب) ٢٠٠ ج) ٥٠٠ د) ٦٠٠

٨٩) إذا كان $ص = جا٢ن$ ، $س = ظا٢ن$ ، فإن $\frac{د^{٢}ص}{دس^{٢}} =$

أ) $-ظا٢ن$ ب) $-ظا^{٣}٢ن$ ج) $ظا٢ن$ د) $-ظا^{٢}٢ن$

٩٠) إذا كان $قَ(٢) = ٥$ ، $ق(٩) = ٢$ ، فإن $\lim_{س \to ٩} \frac{ق(٩) - ق(س^{٣}+١)}{س - ٩}$ يساوي

أ) ٢٤ ب) ١٢ ج) -١٢ د) -٢٤

٩١) إذا كان $هَ(٣) = ٥$ ، $ق(س) = س^{٤} - ٩$ ، وكان $(ق \circ هـ)'(٣) = ١٥$ ، فإن $هـ(٣)$

أ) $\frac{٣}{٤}$ ب) $-\frac{٣}{٤}$ ج) $\frac{٣}{٢}$ د) $-\frac{٣}{٢}$

٩٢ اذا كان س جاص = ١ ، فإن ص =

أ) قاص + جاص ب) ضاص + قاص ج) قاص د) ضاص - قاص

٩٣ اذا كان (و ∘ هـ)(س) = ١ ، هـ(١) = ٣ ، هـَ(١) = ٥ فإن وَ(١) =

أ) $-\frac{٥}{٩}$ ب) $\frac{٥}{٩}$ ج) $\frac{٩}{٥}$ د) $-\frac{٩}{٥}$

٩٤ اذا كان د(١) = ٨ ، وَ(١) = ٧ فإن $\lim_{س \to \pi} \frac{د(جا(\frac{س}{٢})) - ٨}{\pi - س}$ يساوي

أ) $\frac{٧}{٢}$ ب) صفر ج) -٧ د) -٢

٩٥ اذا كان د(س) = { س٢ + ٥ ، س ≠ ٢ ؛ ٨ ، س = ٢ } فإن وَ(٢)

أ) ٤ ب) ٨ ج) صفر د) غير موجودة

٩٦ إذا كان ل(س) = { هـ(س) + ٥ ، س ≤ ١ ؛ ٦س٢ + ٣ ، س > ١ } وكان هـ(س) > صفر ، ل(س) قابل للاشتقاق عند س = ١ وكان د(س) = ٥ س هـ(س) فإن وَ(١) =

أ) ٢٠ ب) ٢٥ ج) ١٥ د) ١٠

* الشكل المرسوم يمثل منحنى د(س) المعرف على ح أجب عن الفقرات ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠ بالاعتماد على الشكل



٩٧ ما قيمة وَ(-٢)

أ) صفر ب) ١ ج) غير موجودة د) -٢

٩٨ ما قيمة وَ(٣)

أ) ١ ب) -٢ ج) صفر د) -١

٩٩ ما قيمة وَ(-١)

أ) -١ ب) صفر ج) غير موجودة د) ٢

١٠٠ ما قيمة وَ(١)

أ) ٢ ب) ١ ج) صفر د) غير موجودة

١٠١) يتحرك جسم طبقاً للعلاقة ف = ظا ع حيث ف المسافة ، ع السرعة فإن تسارع الجسم عندما ف = ١ متر هو

أ) ٢ م/ث^2 ب) $\frac{\pi}{4}$ م/ث^2 ج) $\frac{\pi}{2}$ م/ث^2 د) $\frac{\pi}{8}$ م/ث^2

١٠٢) اعتماداً على الشكل المجاور الذي يمثل منحنى هـ(س) والمماس والعمودي على المماس عند النقطة (٢ ، هـ(٢)) فإن هـ'(٢) =



أ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ب) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ ج) $-\sqrt{3}$ د) $\sqrt{3}$

١٠٣) إذا كان منحنى هـ يمر بالنقطة (٢ ، ٣) والمماس المرسوم لمنحنى هـ عند هذه النقطة يصنع زاوية قياسها ٤٥° مع الاتجاه الموجب لمحور السينات فإن هـ'(٢) =

أ) ١ ب) $\frac{1}{3}$ ج) $-\frac{1}{3}$ د) -3

١٠٤) اذا كان هـ(س) = جا س - $\frac{1}{2}$ س ، س ∈ [٠ ، ٢π] ، ما قيم س التي تجعل المماس لمنحنى هـ(س) أفقياً

أ) $\{\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\}$ ب) $\{\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\}$ ج) $\{\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\}$ د) $\{\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\}$

١٠٥) تتحرك نقطة على خط مستقيم وفق العلاقة ف(ن) = ٦ن^2 - ن^3 + ١٣ حيث ف المسافة بالأمتار ، ن الزمن بالثواني جد المسافة عند انعدام التسارع

أ) ١٤ م ب) ١٨ م ج) ٢٩ م د) ٣٤ م

١٠٦) معدل التغير في حجم الكرة بالنسبة لطول نصف قطرها عندما يكون طول نصف قطرها ٥ سم يساوي

أ) ١٠٠ سم^3/ث ب) ٤π سم^3/ث ج) ٢٠٠π سم^3/ث د) ١٠٠π سم^3/ث

١٠٧) مكعب من الثلج يتناقص طول ضلعه بمعدل ٠,٢ سم/ث ، فإن معدل التغير في مساحة سطح الكعب عندما يصبح طول ضلعه ١٠ سم =

أ) -٢ سم^2/ث ب) -٤,٨ سم^2/ث ج) -٢,٤ سم^2/ث د) -٠,٢ سم^2/ث

١٠٨) مثلث متطابق الاضلاع ، تتمدد محافظاً على شكله بحيث يزداد طول ضلعه بمعدل ١ سم/ث جد معدل التغير في مساحة المثلث عندما تصبح مساحته ١٦√٣ أ) ٤√٣ سم^2/ث ب) ٤ سم^2/ث ج) ٨√٣ سم^2/ث د) ١٦ سم^2/ث

١٠٩ وعاء على شكل مخروط دائري قائم رأسه لأسفل ، ارتفاعه ١٦ سم ، نصف قطر قاعدته ٤ سم ، يُصبّ فيه ماء بمعدل 2π سم^3/ث ، فإن معدل تغير ارتفاع الماء بالوعاء عندما يصبح ارتفاع الماء ٨ سم =

أ) $\frac{1}{2}$ سم/ث ب) ٢ سم/ث جـ) $\frac{1}{8}$ سم/ث د) $\frac{1}{\pi 2}$ سم/ث

١١٠ اذا كان $هـ(س) = جـ س^2 + جـ س + ٢$ ، وكان قياس زاوية ميل المماس لمنحنى الاقتران $هـ(س)$ عند النقطة $(٢ ، هـ(٢))$ هو ١٣٥° ، فما قيمة الثابت جـ

أ) ٥ ب) -٥ جـ) $-\frac{1}{5}$ د) $\frac{1}{5}$

١١١ اذا كان المستقيم $٢س - ص + جـ = ٠$ يمس منحنى الاقتران $هـ(س) = \frac{-٢}{س}$ فما قيمة الثابت جـ

أ) $\{\pm ٢\}$ ب) $\{\pm ١\}$ جـ) $\{\pm ٣\}$ د) $\{\pm ٤\}$

١١٢ ما قياس الزاوية التي يصنعها مماس منحنى العلاقة $ص^2 + س^2 + ٦ص - ٢س + ٢ = ٠$ عند النقطة $(٢ ، -١)$ مع الاتجاه الموجب لمحور السينات

أ) $\{\frac{\pi}{4} ، \frac{5\pi}{4}\}$ ب) $\{\frac{3\pi}{4} ، \frac{7\pi}{4}\}$ جـ) $\frac{3\pi}{4}$ د) $\frac{7\pi}{4}$

١١٣ اذا كانت $ف(ن) = ن^3 - ٩ن^2 + ١٥ن$ هي العلاقة لحركة جسم ما ، حيث ف المسافة بالمتر ، ن الزمن فإن تسارع الجسم عند انعدام سرعته =

أ) ± ٦ م/ث^2 ب) ± ١٢ م/ث^2 جـ) ± ٩ م/ث^2 د) ٦ م/ث^2

١١٤ أسقط جسم من ارتفاع ١٢٠ متر عن الأرض سقوطاً حراً وفق العلاقة $ف_١(ن) = ٥ن^2$ وفي نفس الوقت قذف جسم آخر من الأرض رأسياً لأعلى وفق العلاقة $ف_٢(ن) = ٦٠ن - ٥ن^2$ ما هي اللحظة التي يكون لهما الارتفاع نفسه عن الأرض

أ) ٣ ب) ٢ جـ) ٤ د) ١

١١٥ قذف جسم رأسياً لأعلى من نقطة على الأرض وفق العلاقة $ف(ن) = ٩٠ن - ٥ن^2$ فوصل لأقصى ارتفاع ٨٠ متر ما قيمة الثابت ٩

أ) ٤٠ ب) ٥٠ جـ) ٦٠ د) ٢٠

١١٦ يتحرك جسيم على خط مستقيم بحيث أن سرعته $ع = ١٢ا ف$ ، $٢٧ صفر$ ، $ف٧ صفر$ حيث ف المسافة ، ع السرعة اذا كان تسارعه ٨ م/ث^2 ، ما قيمة الثابت ٩

أ) ٤ ب) ١٦ جـ) ٢ د) $\frac{1}{2}$

١١٧ رجل طوله ١,٧ متر، يسير على أرض مستوية بسرعة ٢ م/ث مبتعداً عن عمود كهرباء في قمته مصباح يرتفع ٥,١ متر عن الأرض فإن معدل تغير طول ظل الرجل على الأرض يساوي

أ) ٢ م/ث ب) $\frac{1}{2}$ م/ث جـ) ١ م/ث د) ٤ م/ث

١١٨ اذا كان $ق(س) = س^{3} - 3س$ ، $س \in [-2, 2]$ فإن عدد النقاط الحرجة لـ $ق(س)$ =

أ) ٣ ب) ٢ جـ) ٤ د) ٥

١١٩ إذا كانت جميع مماسات منحنى $ق(س)$ تصنع زوايا منفرجة مع الاتجاه السالب لمحور السينات في الفترة $(أ، ب)$ فإن ذلك يعني

أ) $ق(س)$ متزايد على $[أ، ب]$ ب) $ق(س)$ متناقص على $[أ، ب]$

جـ) $ق(س)$ مقعر لأسفل على $[أ، ب]$ د) $ق(س)$ مقعر لأعلى على $[أ، ب]$

١٢٠ اذا كان $ق(س) = س^{3} - 3س^{2} + 3س + 1$ فإن $ق(س)$ مقعر لأعلى بالفترة

أ) $(-\infty, 1]$ ب) $[1, \infty)$ جـ) $[-1, \infty)$ د) $(-\infty, -1]$

* إعتماداً على الشكل المرسوم الذي يمثل منحنى المشتقة الأولى للاقتران $ق(س)$ المعرف على ح أجب على الفقرات ١٢١، ١٢٢، ١٢٤، ١٢٥



١٢١ قيم س الحرجة لـ $ق(س)$ هي

أ) $\{2\}$ ب) $\{0, 3\}$ جـ) $\{0, 2, 3\}$ د) $\{2, 3\}$

١٢٢ $ق(س)$ متزايد بالفترة

أ) $(0, 2)$ ب) $[0, 2]$ جـ) $(0, 2)$ د) $(-\infty, 3]$

١٢٣ $ق(س)$ مقعر لأعلى بالفترة

أ) $[0, 2]$ ب) $[0, 3)$ جـ) $(0, 3)$ د) $(-\infty, 3]$

١٢٤ $ق(س)$ متناقص بالفترة

أ) $(-\infty, 0] \cup [2, \infty)$ ب) $[3, \infty)$ جـ) $(-\infty, 3]$ د) $[0, 3]$

١٢٥ $ق(س)$ مقعر لأسفل بالفترة

أ) $(-\infty, 0] \cup [2, \infty)$ ب) $(-\infty, 3]$ جـ) $[3, \infty)$ د) $[2, \infty)$

١٢٦ إذا كان ق(س) = ١٢س + ٦ (م-٢) $س^{٢}$ ، فإن قيم م التي تجعل منحنى ق مقعرًا لأسفل هي

أ) (-٢ ، ٢) ب) (-∞ ، -٢) جـ) (٢ ، ∞) د) (-∞ ، ٢]

١٢٧ إذا كان ظل منحنى الاقتران ق(س) = جاءس نقطة انعطاف عند س = $\frac{\pi}{٤}$ ، فإن ميل المماس عندها يساوي

أ) -٤ ب) ٤ جـ) -٢ د) -١

١٢٨ اذا كان ق(س) = $\frac{س^{٢}-٢س+١}{س^{٢}}$ فإن منحنى ق(س) متناقص بالفترة

أ) (-∞ ، ٠) ب) (١ ، ∞) جـ) [٠ ، ١] د) [١ ، ٠]

١٢٩ الشكل المرسوم يمثل منحنى قـ(س) للاقتران ق(س) المعرف على ح وكانت النقطة (١ ، ق(١)) نقطة حرجة فإن ق(١) هي قيمة



أ) عظمى محلية ب) عظمى مطلقة جـ) صغرى مطلقة د) صغرى محلية

١٣٠ إذا كان ق(س) = جتاس - جاس ، س ∈ [٠ ، π] فإن قيمة س التي تكون للاقتران عند قيمة صغرى مطلقة هي

أ) صفر ب) $\frac{\pi}{٤}$ جـ) $\frac{\pi}{٢}$ د) $\frac{\pi}{٤}$ ٣

١٣١ أي من المنحنيات التالية لـ ق(س) بحيث ق(٠) > صفر ، ق(١) = صفر ، قـ(س) < صفر دائمًا

أ)


ب)


جـ)


د)


١٣٢ الشكل المرسوم يمثل منحنى المشتقة الثانية للاقتران ق(س) المتصل على [-٣ ، ٣] ، اذا كانت قـ(-٢) = قـ(١) = صفر فإن الاقتران ق(س) متزايد بالفترة



أ) [-٣ ، ٠] ب) [-٢ ، ١] جـ) [١ ، ٣] د) [-٢ ، ٣]

١٣٣ اذا كان ق(س) = س - ١ $س^{٣}$ فإن فترة التناقص لمنحنى ق(س) هي

أ) [٠ ، $\frac{١}{٤}$) ب) [٠ ، $\frac{١}{٤}$] جـ) [$\frac{١}{٤}$ ، ∞) د) (-∞ ، ٠]

١٣٤) ما النقطة الواقعة على منحنى $ه(س) = \sqrt{س-٤}$ بحيث تكون المسافة بينها وبين نقطة $(٦، ٠)$ أقل ما يمكن (أقرب ما يمكن) ؟

أ) $(\sqrt{٥٧}، ٣)$ ب) $(-٣، \sqrt{٥٧})$ جـ) $(٣، \sqrt{٥٧})$ د) $(-٣، -\sqrt{٥٧})$

١٣٥) ما العدد الذي ينتمي للفترة $[\frac{١}{٢}، \frac{٣}{٢}]$ الذي يجعل ناتج جمع العدد ومقلوبه أكبر ما يمكن

أ) ١ ب) $\frac{٣}{٤}$ جـ) $\frac{١}{٢}$ د) $\frac{٣}{٢}$

١٣٦) طا ارتفاع أكبر مخروط دائري قائم يمكن ايجاده داخل كرة نصف قطرها ٦ سم

أ) ٢ ب) ٩ جـ) ١٢ د) ٨

١٣٧) عددان موجبان مجموع احدهما ضعف الاخر يساوي (٤٠) فإن العددين ليكون حاصل ضربهما أكبر ما يمكن

أ) $\{٢٠، ١٠\}$ ب) $\{٢٣، ٩\}$ جـ) $\{٢٤، ٨\}$ د) $\{٣٠، ٥\}$

١٣٨) موشور رباعي (قاعدته حرجة) مجموع أطوال أحرفه يساوي (٦٠) سم جد أبعاده (عرض، طول، ارتفاع) على الترتيب التي تجعل حجمه أكبر ما يمكن

أ) $(٥٠، ٥٠، ٥٠)$ ب) $\{٣٠، ٢٠، ١٠\}$ جـ) $(٤٠، ٥٠، ٥٠)$ د) $(٦٠، ٦٠، ٦٠)$

١٣٩) عددان موجبان مجموعهما (٢٠) جد العددين ليكون مجموع مربعيهما أقل ما يمكن

أ) $\{١٥، ٥\}$ ب) $\{١٦، ٤\}$ جـ) $\{١٢، ٨\}$ د) $\{١٠، ١٠\}$

١٤٠) مثلث متطابق الضلعين طول كل منهما ٨ سم، تزداد الزاوية المحصورة بينهما بمعدل $\frac{\pi}{٦٤}$ راد/ث جد معدل التغير في مساحة المثلث عندما تصبح الزاوية $٦٠°$

أ) $\frac{\pi}{٤}$ سم^٢/ث ب) $\frac{\pi}{٢}$ سم^٢/ث جـ) $\frac{\pi}{٣}$ سم^٢/ث د) $\frac{\pi}{٦}$ سم^٢/ث

١٤١) قرص دائري يتمدد محافظاً على شكله بمعدل ٢٠π سم^٢/ث، جد معدل التغير في نصف قطره عندما تصبح مساحته ١٠٠π سم^٢.

أ) ١ ب) ٢ جـ) π د) ٢π

١٤٢) إذا كان لكل $س_١ < س_٢$ فإن $ه(س_١) - ه(س_٢) > ٠$ فإن ذلك يعني

أ) ه متزايد ب) ه متناقص جـ) ه مقعر لأعلى د) ه مقعر لأسفل

١٤٣ إذا كانت قـ(س) = (س-٢)(س+١)^{٢} فإنه يوجد للاقتران هـ(س) قيمة صغرى محلية عند س =

أ) -٢ ب) -١ جـ) ٢ د) ١

١٤٤ اذا كان هـ(س) = أس^{٣} - ب س^{٢} له نقطة انطاف عند النقطة (١، ٦) فإن قيمة الثابتين أ، ب على الترتيب

أ) {٢، ٦} ب) {٦، ٢} جـ) {٣، ٦} د) {٦، ٣}

١٤٥ اذا كان هـ(س) = [$\frac{١}{٢}$س + ٣] ، س ∈ [-٢، ١] ، فإن مجال س الحرجة لـ هـ(س)

أ) [-٢، ١) ب) {-٢، -$\frac{١}{٢}$، $\frac{١}{٢}$، ١} جـ) (-٢، ١) د) [-٢، ١]

١٤٦ اذا كان هـ(س) = جتا س - $\frac{١}{٢}$ جتا ٢س ، س ∈ [٠، π] فإن الاقتران هـ(س) متناقص

أ) [$\frac{\pi}{٢}$ ، π] ب) [$\frac{\pi}{٣}$ ، π] جـ) [٠، $\frac{\pi}{٣}$] د) [$\frac{\pi}{٦}$ ، π]

١٤٧ الشكل المرسوم يمثل منحنى هـ(س) أي من النقط المبينة بالشكل تكون عندها قـ(س) > صفر ، قـ(س) < صفر



أ) م ب) ن جـ) ل د) و

١٤٨ إذا كان هـ(س) = س - ظا س ، س ∈ (-$\frac{\pi}{٤}$ ، $\frac{\pi}{٤}$) فإن نقطة الانطاف للاقتران هـ(س) هي

أ) (٠، هـ(٠)) ب) ($\frac{\pi}{٤}$ ، هـ($\frac{\pi}{٤}$)) جـ) ($\frac{\pi}{٣}$ ، هـ($\frac{\pi}{٣}$)) د) ($\frac{\pi}{٦}$ ، هـ($\frac{\pi}{٦}$))

١٤٩ اذا كان هـ(س) = س^{٣} - ٤س جد أصغر قيمة للاقتران

أ) -٢ ب) -١ جـ) -٤ د) صفر

١٥٠ اذا كان هـ(س) = ٨ - |س - ١| فإن أكبر قيمة للاقتران بالفترة [٠، ٤]

أ) ٦ ب) ٧ جـ) ٨ د) ٥

صنع دائرة

(١٥١) . مساحة المنطقة المظللة في الرسم المجاور إذا كان $\int_{أ}^{ب} = ١٢$ م^{٢} ، $\int_{ب}^{ج} = ٤$ م^{٢} ، $\int_{ج}^{د} = ٥$ م^{٢} ، $\int_{د}^{هـ} = ٦$ م^{٢}



جـ $\int_{أ}^{هـ}$ ق(س) دس

أ. ١٩ ب. ٨

جـ. ٦ د. ٤

(١٥٢) . إذا كان $\int_{أ}^{ب} (٤س^{٣} - ٣) دس = ٧$ ق(س) دس ، فإن ق(س) تساوي

أ. ٢ ب. ٣ جـ. -١ د. ٨

(١٥٣) . إذا كان $\int_{٣}^{٥} (\frac{١}{٢} ق(س) - ٣) دس = ٤$ ، $\int_{٨}^{٥} ق(س) دس = ٦$

فإن $\int_{٣}^{٨} (ق(س) + ٤س) دس$

أ. -١١٢ ب. ١٢٤ جـ. ١١٢ د. ١٢٨

(١٥٤) . إذا كان $\int ق(س) دس = هـ^{٩-س^{٢}} + ٥$ ، ق(٣) = -٢ ، ق(٣) = ٦

فإن: ق(٣) ≠ ٠ عندما أ تساوي

أ. ٣ ب. {-٣، ٣} جـ. ٩ د. {٩+}

(١٥٥) . $\int^{١} س هـ^{س} دس$ يساوي

أ. ١ ب. ٢ جـ. ٢ د. -١

(١٥٦) . $\int^{لو_{هـ}٣} \frac{هـ^{س}}{٤ + هـ^{س}} دس$

أ. $لو_{هـ}\frac{٥}{٤}$ ب. $لو_{هـ}\frac{٧}{٤}$ جـ. $لو_{هـ}٥$ د. $لو_{هـ}\frac{٤}{٣}$

(١٥٧) . يتحرك جسيم بتسارع ت = ٢ ع ، ع > ٠ . إذا كانت سرعته عند بدء الحركة ٩ م/ث ، فجد سرعته بعد ٤ ثوان:

أ. ١٦ ب. ٤ جـ. ٨ د. ١٢

(١٥٨) . إذا كان ق(س) = $لو_{هـ}(\frac{هـ^{س}}{س})^{٢}$ فإن قيمة ق(١)

أ. صفر ب. ١ جـ. هـ د. ٢

MATEMATICS MATEMATICS

مسوحة ضوئيا بـ CamScanner

١٥٩) $\int_{1}^{\sqrt{8}} \sqrt{1-س^{2}}$ د س =

أ) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ب) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ج) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ د) $-\sqrt{3}$

١٦٠) إذا كانت المساحة المحصورة بين $ه(س) = \frac{6}{س}$ ، $هـ(س) = س^{2} - 1$ ،

$ل(س) = 6$ ومحور الصادات تساوي

أ) $\frac{16}{3} + 6 لو_{هـ} 6$ ب) $\frac{16}{3}$ ج) $لو_{هـ} 64$ د) $لو_{هـ} 6 + \frac{16}{3}$

١٦١) قيمة $\int_{0}^{1} (س - 1 + 1)$ د س تساوي

أ) 1 ب) 2 ج) 3 د) 4

١٦٢) يسير جسم على خط مستقيم حسب العلاقة $ت = \frac{4}{1 + 4ع}$ ، $ع > 0$ ، وعرف

الجسم من السكون فقطع مسافة $\frac{5}{4}$ متر في أول ثانية من حركته ، فجد المسافة

التي قطعها بعد 3 ثوان من حركته

أ) $\frac{89}{12}$ ب) $\frac{75}{4}$ ج) 12 د) 89

١٦٣) $\int_{1}^{3} \frac{(س^{2} - 2)^{2} - 4}{س^{2}}$ د س يساوي

أ) $\frac{2}{3}$ ب) $-\frac{5}{7}$ ج) $-\frac{3}{4}$ د) $-\frac{2}{3}$

١٦٤) معتمداً على الشكل المجاور فجد $\int_{1}^{3} |(ه - هـ)(س)|$ د س



أ) 8 ب) -8 ج) 20 د) -2

١٦٥) إذا كان $ه(س) = 9 هـ^{س^{2}} + 4 لو_{هـ}(س + 1) + \int_{0}^{\pi} جا س$ د س

وكان $ه(0) = 6$ ، فإن قيمة الثابت 9

أ) 3 ب) 2 ج) -2 د) -3

١٦٦) جد مساحة المنطقة المظللة في الشكل المجاور حيث $ه(س) = 2ك - س^{2}$



$هـ(س) = س - 2$ ، $ل(س) = ج$

أ) $\frac{5}{6}$ ب) $\frac{3}{4}$ ج) $\frac{1}{2}$ د) $\frac{4}{7}$

مسوحة ضوئيا بـ CamScanner

١٦٧. اذا كان م(س)، ل(س) معكوسين لاشتقاق لاقتران متصل ده

وكان $\int_{-٢}^{١} (م(س)-ل(س)).دس = ٦$ فإن قيمة $\int_{-٢}^{١} م(س) هـ^{س} + \int_{-٢}^{١} ل(س).هـ^{س}.دس$

أ. هـ ب. هـ-١ ج. ٣(هـ-١) د. ٢(هـ-١)

١٦٨. قاعدة لاقتران ده حيث قَ(س)=٦س، ده(١)=١١، $\int_{١}^{٢}$ قَ(س)دس=صفر

أ. ده(س)=$س^{٢}$+٥ ب. ده(س)=٥-س+$س^{٣}$

ج. ده(س)=$س^{٣}$-٣س+٥ د. ده(س)=$س^{٣}$-٣س-٥

١٦٩. اذا كان ده متصلا على [-٦، ٢] وكان |ده(س)-١١| ≤ ٢، فإن اكبر قيمة للمقدار $\int_{١}^{٢} (٣ + قَ(س))^{٢}$.دس يساوي

أ. ١٢ ب. ٩ ج. ١٨ د. ٣٦

١٧٠. اقل قيمة للمقدار $\int_{}^{\pi} \frac{جتا س}{\sqrt{١٦+٩جتا^{٢}س}}$ دس

أ. $\frac{\pi}{٣}$ ب. $\frac{\pi}{٤}$ ج. $\frac{\pi}{٥}$ د. $\frac{\pi}{٦}$

١٧١. قيمة $\int_{}^{ج} \sqrt{١+٤س-٤س^{٢}}$.دس

أ. ٣ ب. ٢ ج. -٢ د. -٣

١٧٢. $\int_{}^{} \frac{-س}{\sqrt{(١+س)-٢(١+س)}}$.دس

أ. $-١-٢\sqrt{ج}$ ب. $١+٢\sqrt{ج}$ ج. $٢\sqrt{ج}$ د. $-٢\sqrt{ج}$

١٧٣. اذا كان أ = $\int_{}^{\frac{\pi}{٤}}$ ظا^{٤}س دس ، ب = $\int_{}^{\frac{\pi}{٤}}$ ظا^{٢}س دس فإن قيمة أ - ب

أ. $\frac{-١}{ج}$ ب. $\frac{١}{ج}$ ج. $\frac{١}{٣}$ د. $\frac{-١}{٣}$

١٧٤. قيمة $\int_{}^{لو٩} \sqrt{هـ^{س}}$ دس

أ. ٤ ب. ٧ ج. ٢ د. ١

١٧٥. اذا كان ع(س) = $س + \frac{١}{قَ(س)}$ معكوساً لاشتقاق لاقتران ده

فإن $\int_{}^{لوهـ} قَ(س)$ دس يساوي

أ. ٣ ب. $\frac{١}{ج}$ ج. $\frac{-١}{ج}$ د. ١

MATEMATICS MATEMATICS

مسوحة ضوئيا بـ CamScanner

(١٧٦) $\int_{1}^{هـ} ٤س \ لو_{هـ}(\frac{١}{س^{٢}}) \ دس$

أ $\frac{١}{٤}هـ^{٢}+\frac{١}{٤}$ ب $-\frac{١}{٤}هـ^{٢}$ ج $هـ^{٢}+\frac{١}{٤}$ د $-\frac{١}{٤}هـ^{٢}$ هـ $-\frac{١}{٤}$

(١٧٧) $\int_{-١}^{صفر} \frac{٣}{س^{٢}+٢س+١} \ دس$ أ $لو_{هـ}\frac{١}{٤}$ ب $لو\frac{١}{٤}$ ج $لو_{٢}$ د $لو_{٤}$

(١٧٨) بالاعتماد على الشكل المجاور الذي يمثل منحنى $هـ$ على $[٠،٣]$ جد $ن(م)$ حيث $م=\int_{١}^{٣} هـ(س) \ دس$



أ $١٠،٤$ ب $٤،١٠$ ج $٣،٩$ د $٩،٣$ هـ $١٠،٤$

(١٧٩) قيمة $\int_{-٢}^{٠} \frac{س}{\sqrt{س+١}} \ دس$

أ ٢ ب -٢ ج ١ د صفر هـ ٠

(١٨٠) $\int_{١}^{٢} \sqrt{س^{٢}+٢س+١} \ دس$

أ $\frac{١}{٢}$ ب $\frac{١}{٣}$ ج $\frac{-١}{٢}$ د $\frac{-١}{٣}$ هـ $\frac{١}{٢}$

(١٨١) إذا علمت أن $\int_{١}^{٣} \frac{٢س+١}{س^{٢}-س-٢} \ دس = لو_{هـ}$ ، فإن $ك$ تساوي

أ ٢ ب ١٥ ج ٢٣ د ٤ هـ ٢

(١٨٢) قذف جسيم للأعلى بتسارع مقداره $(-١٠) م/ث^{٢}$ وبسرعة ابتدائية ٤٠ م/ث، فقطع المسافة بعد ثانية ٣٥ متر، فإن أقصى ارتفاع يصله الجسم

أ ٧٠ ب ١٢٠ ج ٨٠ د ٤٠

(١٨٣) بالشكل المجاور الذي يمثل منحنى $هـ(س)$ حيث $م_{١}=٣$ ، $م_{٢}=٤$ ، جد $\int_{٤}^{٠} (٣هـ(س)-٧) \ دس$ مساحات



أ ٧ ب ٣٢ ج ٢٦ د ٣١

MATEMATICS MATEMATICS

مسوحة ضوئيا بـ CamScanner

١٨٤) إذا كان م(س) اقتران معكوس هـ(س)، م'(٢) = ٣،
م'(٧) = ٨ فإن $\int_{٢}^{٧} (٤ هـ'(س) - ٣)\, دس$
أ) -٥ ب) ٥ ج) ٩ د) -٩

١٨٥) إذا كان هـ قابلاً للاشتقاق على ح، وكان هـ(٣) = ٥،
هـ(-١) = ٤، $\int_{-١}^{٣} هـ(س)\, دس = ٨$ فإن $\int_{٢}^{٤} ٣ س^{٢} هـ(س^{٣} - ١)\, دس$
أ) ١٢ ب) ١١ ج) ١٣ د) ١٠

١٨٦) $\int_{١}^{٣} \frac{س^{٣} - ٨}{٧ س^{٤} - ٤ س + ٤}\, دس$
أ) ٨ ب) ١٠ ج) ٤ د) ٦

١٨٧) قيمة $\int_{\frac{\pi}{٤}}^{\frac{\pi}{٣}} \sqrt{جا س} - جا^{٣} س\, دس$
أ) $-\frac{٣}{٤}$ ب) $\frac{٣}{٤}$ ج) $-\frac{٢}{٣}$ د) $\frac{٢}{٣}$

١٨٨) $\int_{١}^{٢} \frac{٧}{س^{٢} - ٣ س - ١٠}\, دس$
أ) $لو_{٧}$ ب) $لو_{\frac{٨}{٥}}$ ج) $لو_{\frac{٨}{١٥}}$ د) $لو_{\frac{١٥}{٨}}$

١٨٩) مساحة المنطقة المحصورة بين هـ(س) = ظا س، و(س) = جا س
على $[\frac{\pi}{٤}, \frac{\pi}{٣}]$ تساوي
أ) $\sqrt{٣}$ ب) $\sqrt{٣} - ١$ ج) $\sqrt{٣} + ١$ د) ١

١٩٠) $\int \frac{(١ + س)^{٥}}{س^{٧}}\, دس$
أ) $\frac{(١ + س^{-١})^{٦}}{٦} + ج$ ب) $-\frac{(١ + س^{-١})^{٦}}{٦} + ج$
ج) $(١ + س^{-١})^{٦} + ج$ د) $\frac{(١ + س^{-١})^{٧}}{٧} + ج$

١٩١) $\int_{\frac{\pi}{٤}}^{\frac{\pi}{٢}} س جا س\, دس = \int_{ب}^{٢} (أ س^{٢} + ٢ س)\, دس$ فإن أ + ب تساوي
أ) $-\frac{٩}{٨}$ ب) $\frac{٩}{٨}$ ج) $\frac{٨}{٩}$ د) $-\frac{٨}{٩}$

١٩٢) إذا كان $\int_{١}^{٢} هـ(س)\, دس$ لجميع قيم س $\in [٥, ٢]$ فإن أكبر قيمة للمقدار $\int_{٤}^{٥} \frac{٦}{\sqrt{٧ هـ(س)}}\, دس$
أ) ٦ ب) ٩٠ ج) ١٨٠ د) ١٢

MATEMATICS MATEMATICS

مسوحة ضوئيا بـ CamScanner

١٩٣. $\int_{0}^{\pi} |\sin x - b| \, dx = 2$ حيث $b \in [0, 1]$ فإن قيمة b :

م. $-\frac{\sqrt{6}}{2}$ ب. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ج. $-\frac{\sqrt{2}}{6}$ د. $\frac{\sqrt{2}}{6}$

١٩٤. إذا كان $\int_{1}^{e} f(x) \, dx = \int_{1}^{e} \frac{\ln x + 2}{x} \, dx$ ، فإن $f'(1)$ =

م. $\frac{1}{4}$ ب. $\frac{1}{8}$ ج. $-\frac{1}{4}$ د. $-\frac{1}{8}$

١٩٥. إذا كان $\int_{1}^{2} f(x) \, dx = 8$ ، $\int_{1}^{2} f(x) \, dx = -3$ فإن $\int_{1}^{2} \frac{f(\ln x)}{x} \, dx$ =

م. ٧ ب. ٦ ج. -6 د. -7

١٩٦. إذا كان $s_n = 1 + a_n$ فإن a_n تساوي

م. a_n ب. $2a_n$ ج. a_n^2 د. a_{2n}

١٩٧. أكبر قيمة للعدد $\int_{-3}^{3} \sqrt{16 + x^2} \, dx$

م. ٤٢ ب. ٥ ج. ٣٠ د. ٤٥

١٩٨. إذا كان $f(x)$ متصلة على $[0, 2]$ وكان $f(1) = f(2)$ ، $f(x) = 4$ فإن $\int_{1}^{2} f(x) f'(x) \, dx$ يساوي

م. ١٥ ب. ٢ ج. ٤ د. ٨

١٩٩. إذا كان $\int_{2}^{7} (2x + f(x)) \, dx = 42$ ، فإن قيمة $\int_{2}^{7} f(x) \, dx - \int_{2}^{7} f(x) \, dx$

م. ٢ ب. ٣ ج. ٤ د. ٥

٢٠٠. قيمة $\int_{0}^{\pi} \sqrt{1 + \cos x} \, dx$ م. $2\sqrt{2}$ ب. صفر ج. ٢ د. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

٢٠١. إذا كان $f_n + f_n = f_n \cdot f_n$ فإن f_n تساوي

م. $f_n + f_n$ ب. $(f_n)^3$ ج. $(f_n)^4$ د. $(f_n + f_n)^3$

٢٠٢. قيمة $\int_{0}^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin 6x}{\sin 3x} \, dx$ م. $-\frac{2}{3}$ ب. $\frac{2}{3}$ ج. $\frac{1}{3}$ د. $-\frac{1}{3}$

٢٠٣. إذا كان $\int_{1}^{2} \frac{f(x) - 1}{x^2} \, dx = 5$ ، $\int_{1}^{2} x^2 f(x^3 - 2) \, dx = -2$ فإن $\int_{-1}^{6} f(x) \, dx$

م. ١٩ ب. ١٢ ج. -19 د. -12

MATEMATIKE MATEMATICS

مسوحة ضوئيا بـ CamScanner

٢٠٤) . $\frac{ص}{س} = س^{٣}$ فإن $\frac{د ص}{د س}$ عندما ص = صفر

أ . صفر ب . $\frac{٣}{هـ}$ جـ . $\frac{١}{هـ^{٣}}$ د . ٣

٢٠٥) . مع بعض الكائنات م = ٦ وحدات مربعة

فإن $\int_{١}^{٣} (٢ - ٥ م(س)) د س$ يساوي

أ . ٢ ب . ١٢ جـ . ٩ د . ٨

٢٠٦) . تتكاثر بكتيريا حسب العلاقة $\frac{د ن}{د ن} = ٥٠ن + ٢٠$ حيث ن : عدد البكتيريا

ن : لزمن بالثواني ، إذا كان عددها بعد ١ ثانية ٣٠ فإن عددها بعد ٣ ثانية

أ . ٣٥٠ ب . ٣٥٢ جـ . ٢٠٢ د . ٣٠٥

٢٠٧) . قيمة $\int_{٠}^{\frac{\pi}{٤}} \frac{ظا س}{(١ + ظا س)} د س$ يساوي

أ . $\frac{١}{٢}$ ب . ٠ جـ . $\frac{١}{٤}$ د . $-\frac{١}{٤}$

٢٠٨) . $\int_{-٢}^{٢} |٥ س + ٣| د س$

أ . ٨ ب . ٨- جـ . ٢ د . ٢-

٢٠٩) . $\int_{٠}^{٣} |٢ س + ١ - ٥| د س$

أ . $\frac{٣}{هـ}$ ب . ٢٠ جـ . $\frac{٣}{هـ}$ د . ٢٠ هـ

٢١٠) . $\int_{١}^{٤} \frac{١}{٨١} (٣ س + ٩)^{٣} د س = \int_{١}^{٤} س^{٤} د س$ فإن الثابت ٩

أ . ٣ ب . ٢ جـ . ٣- د . ٢-

MATEMATICS MATEMATICS

مسوحة ضوئيا بـ CamScanner