

سلاح الطالب  
في  
العمليات الحيوية - جديد  
الصف الثاني عشر  
علمي --- راجي --- اقتصاد منزلي  
الأستاذ علاء القدومي  
0795601788

## **الوحدة الثانية**

### **ما أضيق العيش لو لا فسحة الأمل**

#### **الفصل الأول**

##### **• الإحساس والإستجابة والتنظيم في جسم الإنسان**

##### **مقدمة :**

- يعمل كل من الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء بتآزر لضمان عمل الأجهزة الأخرى في الجسم
  - اذ يعملان على:- ضبط العمليات الحيوية ، وضبط الاتزان الداخلي في الجسم .
  - الاتزان الداخلي مثل : تركيز الأملاح في الجسم وثبات الرقم الهيدروجيني للدم وضبط ضغط الدم .
- للجهاز العصبي دور في إحساس الجسم بالمنبهات مثل : الحرارة والضوء والضوضاء والإستجابة لها.
- هناك تلاؤم بين تركيب الجهاز العصبي مع الوظائف التي يقوم بها .

##### **أولاً : السائل العصبي وانتقاله :**

**النسيج العصبي** هو المكون الأساسي لأجزاء الجهاز العصبي ويكون من الخلايا الدقيقة و العصبونات .

##### **1- الخلايا الدقيقة :**

- هي خلايا داعمة أصغر حجما من العصبونات ، وأكثر عددا منها .
- وتعمل الخلايا الدقيقة على 1- دعم العصبونات 2- حمايتها 3- تزويدها بالغذاء اللازم .


##### **سؤال : قارن بين**

العدد	الحجم	
أقل	أكبر	العصبون
أكثر	أصغر	الخلية الدقيقة

2 - العصبونات : مفردها عصبون والذي يتكون من الأجزاء الرئيسية الآتية :

زوائد شجرية , جسم الخلية , هضبة المحور , المحور , نهايات عصبية منتفخة تدعى الأزرار التشابكية .

انظر الشكل ( 1-2 ) ص 80



الشكل ( 1-2 ): خلايا النسيج العصبي .

#### ملاحظات :

- تعمل العصبونات على نقل المعلومات بين أجزاء الجسم والحبل الشوكي والدماغ ، وكذلك بين

العصبونات نفسها على شكل إشارات كهروكيميائية تسمى السائل العصبي .

- هضبة المحور هي نقطة إتصال جسم الخلية بالمحور .

- خلايا شفاف تكون غمد مليئي الذي يحيط بمعظم محاور العصبونات ، ويوجد بين خلايا شفاف عقد رانفيير .

#### خط سير السائل العصبي :

زوائد شجرية ← جسم الخلية العصبية ← هضبة المحور ← المحور ← نهايات عصبية

← زر تشابكي ثم عصبون آخر او غدة او عضلة .

**تكون السیال العصبي :**

\* \* ينشأ السیال العصبي (جهد الفعل) عندما يتعرض العصبون لمنبه مناسب (حرارة، ضوء، ضوضاء).

علل : يساهم تركيب الغشاء البلازمي للعصبون مساهمة فاعلة في تكوين السیال العصبي ؟

الجواب : وذلك لوجود قنوات متخصصة في الغشاء تدعى قنوات الأيونات ، وهذه القنوات تختلف في ما بينها

من حيث طبيعة العمل حيث أن :

- بعضها يحتاج إلى منظم لفتحها واغلاقها مثل :

القنوات الحساسة للنواقل الكيميائية ، والقنوات الحساسة لفرق الجهد الكهربائي .

- وبعضها الآخر لا يحتاج إلى منظم لفتحها واغلاقها حيث أنها تفتح وتغلق تلقائيا مثل قنوات التسرب

ومن أمثلتها قنوات تسرب ايونات الصوديوم  $Na^+$  و قنوات تسرب ايونات البوتاسيوم  $K^+$  .

---

**حالة العصبون قبل وصول منبه مناسب :** انظر الشكل (2-2) ص82

**مرحلة الراحة :** عندما لا يكون العصبون معرضاً لمنبه مناسب فإن :

- أيونات الصوديوم الموجبة تتراكم في السائل بين خلوي (سائل يحيط بالخلايا) .

- وتتركز ايونات البوتاسيوم الموجبة في السيتوسول داخل العصبون (السيتوسول = السائل داخل الخلايا) .

\* \* في أثناء مرحلة الراحة ينشأ جهد يسمى **جهد الراحة** .

**كيف ينشأ جهد الراحة ؟**

- في أثناء مرحلة الراحة يكون تركيز الشحنات الموجبة مرتفعا على السطح الخارجي لغشاء العصبون،

في حين يكون تركيز الشحنات السالبة مرتفعا على سطحه الداخلي من جهة (السيتوسول).

- يقاس فرق جهد غشاء العصبون بجهاز فولتميتر حساس، وتكون وحدة قياسه ملي فولت.

- ويزداد فرق الجهد بزيادة الفرق بين الشحنات داخل العصبون وخارجه ، وتبلغ قيمته في كثير من الخلايا الحيوانية (70) ملي فولت ، ويطلق عليه إسم **جهد الراحة** .

( وتشير الاشارة السالبة إلى أن داخل الخلية سالب الشحنة مقارنة بخارجها).

يكون **جهد الراحة** نتيجة لعوامل عدة منها :

1. إحتواء الغشاء البلازمي على قنوات تسرب أيونات تسمح بنفاذ أيونات البوتاسيوم  $K^+$  إلى خارج العصبون بكمية كبيرة ، وأيونات الصوديوم  $Na^+$  إلى داخله بكمية أقل ، انظر الشكل (3-2) ص79 .  
( لأن عدد قنوات تسرب أيونات البوتاسيوم يزيد على عدد قنوات تسرب أيونات الصوديوم ، فإن الشحنات الموجبة (البوتاسيوم) تترافق خارج العصبون ) .

2. وجود مضخات أيونات الصوديوم - البوتاسيوم ، إذ تنقل كل مضخة ثلاثة أيونات صوديوم  $3Na^+$  إلى خارج العصبون مقابل أيوني بوتاسيوم  $2K^+$  إلى داخله بعملية نقل نشط انظر الشكل (3-2) ص79 .  
3. عدم قدرة الأيونات السالبة على النفاذ إلى خارج العصبون ، لأنها مرتبطة بمركبات كبيرة الحجم (مثل البروتينات) . انظر الشكل (2-2) ص82 .

سؤال : ما العوامل التي تجعل داخل العصبون سالبا مقارنة مع خارجه في حالة الراحة ؟

أو فسر : يكون فرق جهد غشاء العصبون خلال مرحلة الراحة سالبا.

الجواب : العوامل الثلاثة سابقة الذكر .

## **ملاحظة هامة :**

- يبقى العصبون في مرحلة الراحة إلى أن يصل إليه منبه مناسب يحدث تغيرا سريعا في نفاذية غشاءه البلازمي ، مما يؤدي إلى وصول مقدار فرق جهد الغشاء مستوى معينا يطلق عليه اسم مستوى العتبة .
  - فمثلا يكون مستوى العتبة في بعض العصبونات (55-) ملي فولت، انظر الشكل (2-4) ص 85 .
  - وإذا لم يحدث المنبه تغيرا في جهد الغشاء البلازمي ليصل مستوى العتبة يبقى العصبون في مرحلة الراحة .
- 

**سؤال : قد يبقى العصبون في مرحلة الراحة بالرغم من وصول عدة منبهات إليه ؟**

**الجواب : إذا لم يحدث المنبه تغيرا في جهد الغشاء البلازمي ليصل مستوى العتبة .**

---

**سؤال : ما المقصود بمستوى العتبة ؟**

**الجواب : هو مقدار جهد الغشاء البلازمي للعصبون الذي ينشأ نتيجة لوصول منبه إليه حيث يتكون بعد ذلك جهد الفعل . ويبلغ مقدار جهد العتبة في بعض العصبونات ( 55 ) ملي فولت .**

---

## **حالة العصبون بعد وصول منبه مناسب :**

### **ا . إزالة الاستقطاب :**

- يؤدي تنبية العصبون بمنبه يصل بجهد الغشاء إلى مستوى العتبة أو يزيد عليه إلى فتح قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي ، مما يؤدي إلى اندفاع أيونات الصوديوم الموجودة في السائل بين خلوي إلى داخل العصبون مسببة تراكم الشحنات الموجبة ، وهذا يؤدي إلى إزالة الاستقطاب .  
( انظر الشكل (2-4) ب) ص 85 .

- يستمر دخول أيونات الصوديوم إلى داخل العصبون ، فتزيد الشحنات الموجبة داخل العصبون ، ليصل فرق الجهد إلى ( 35+ ) ملي فولت تقريبا ويستمر ذلك لمدة قصيرة ، انظر الشكل (2-4) ص 85 .

- ويؤدي هذا التغير في الجهد إلى غلق قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي .

## 2. إعادة الاستقطاب :


- تبدأ هذه العملية بفتح قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي انظر الشكل(2-4/ج) ص85 مما يؤدي إلى تدفق أيونات البوتاسيوم إلى خارج العصبون .
- يستمر فتح قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي مسبباً تدفق المزيد من أيونات البوتاسيوم إلى خارج العصبون , فتحدث زيادة استقطاب , ويصل فرق الجهد إلى (90-) ملي فولت تقريبا .  
وحين يصل فرق الجهد إلى هذا المستوى تسمى هذه الفترة **فتررة الجمود** , انظر الشكل (2-4/د) ص85 , وفيها ( فتررة الجمود ) لا يستجيب العصبون لمنبه آخر .
- ثم تغلق قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي, فتصبح كل من قنوات أيونات الصوديوم وقنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي **مغلقة تماما**.  
.....
- ولكن يعود العصبون إلى مرحلة الراحة : ما العوامل التي تعمل على إعادة العصبون إلى حالة الراحة ؟
  - 1- تنشط مضخة أيونات ( الصوديوم – البوتاسيوم ) لتتركز أيونات الصوديوم خارج العصبون ، وأيونات البوتاسيوم داخله .
  - 2- كما وتساهم قنوات تسرب أيونات كل من الصوديوم والبوتاسيوم في إعادة تكون جهد الراحة , ووصول فرق الجهد إلى - 70 ملي فولت تقريبا .  
.....

اذا فشلت في رفع أحدهم إلى مستوى أخلاقي  
فلا تدعه ينجح في إنزالك إلى مستوى أخلاقه

سؤال : ادرس الشكل التالي ثم بين سبب حدوث المراحل والفترات المرقمة من ١ - ٥ ؟

**سؤال**

ادرس الشكل (٥-٢)، ثم بين سبب حدوث المراحل والفترات المرقمة بالأرقام: (١، ٢، ٣، ٤، ٥).



الشكل (٥-٢): سؤال المراحل والفترات التي يمر بها العصبون.

المرحلة ١- مرحلة الراحة : يكون تركيز ايونات الصوديوم الموجبة مرتفعا على السطح الخارجي لغشاء العصبون ، في حين يكون تركيز الشحنات السالبة مرتفعا على سطحه الداخلي .  
ويعود ذلك للأسباب الآتية :

أ. احتواء الغشاء البلازمي على قنوات تسرب ايونات البوتاسيوم التي تسمح بنفاذ ايونات البوتاسيوم إلى خارج العصبون ، بنسبة اكبر من قنوات تسرب ايونات الصوديوم التي تسمح بنفاذ ايونات الصوديوم إلى داخل العصبون .

ب. وجود مضخات ايونات الصوديوم - البوتاسيوم ، التي تنقل كل مضخة ثلاثة ايونات صوديوم  $3\text{Na}^+$  إلى خارج العصبون مقابل ايوني بوتاسيوم  $2\text{K}^+$  إلى داخله بعملية نقل نشط

ج . عدم قدرة الايونات السالبة المرتبطة بمركبات كبيرة الحجم مثل البروتينات على النفاذ إلى خارج العصبون .

المرحلة ٢- مستوى العتبة : وصول منه مناسب يصل بفرق جهد غشاء العصبون الى مستوى العتبة .

المرحلة ٣- ازالة الاستقطاب : يسبب وصول المنبه المناسب فتح قنوات ايونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي مما يؤدي الى اندفاع ايونات الصوديوم عبرها من السائل بين خلوي الى داخل العصبون .  
وهذا يؤدي الى تراكم الشحنات الموجبة داخل العصبون .

المرحلة ٤- اعادة الاستقطاب : بعد اغلاق قنوات ايونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي وفتح قنوات ايونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي ، يتم تدفق ايونات البوتاسيوم الى خارج العصبون .

الفترة ٥- فترة الجموح : تدفق المزيد من ايونات البوتاسيوم عبر قنوات ايونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي ليصل فرق الجهد إلى (-90) ملي فولت تقريبا .


## 2- انتقال السيال العصبي :

- ينتقل السيال العصبي على طول محور العصبون حتى يصل إلى نهايته ، ثم ينتقل إلى خلية أخرى

في منطقة التشابك العصبي . فكيف يحدث كل منهما ؟


**أ - انتقال السيال العصبي على طول محور العصبون غير المحاط بغمد مليني :**

- يؤدي جهد الفعل المتولد في نقطة ما على غشاء العصبون إلى نشوء جهد فعل في المنطقة المجاورة لها، وبذلك ينتقل جهد الفعل على طول محور العصبون غير المحاط بغمد مليني ، انظر الشكل (2-6) ص 87.




أ- ازالة استقطاب  
ب و ج- راحة

- نشوء جهد فعل في المنطقة (أ) من المحور عند دخول أيونات الصوديوم بكميات كبيرة إلى داخل العصبون، تسبباً حدوث في حالة الاستقطاب.



أ- اعادة استقطاب  
ب- ازالة استقطاب  
ج- راحة

- حدوث إعادة استقطاب في المنطقة (أ)، ويزداد استقطاب في المنطقة (ب)، تسبباً نشوء جهد فعل في المنطقة (ب)، وتكون المنطقة (ج) في مرحلة الراحة.



أ- راحة  
ب- اعادة استقطاب  
ج- ازالة استقطاب

- عودة لالم منطقة (أ) بعد فترة لفجور في مرحلة الراحة، وتكون المنطقة (ب) في مرحلة إعادة الاستقطاب، والمنطقة (ج) في مرحلة إزالة الاستقطاب.

الشكل (٢-٦): انتقال السيال العصبي على طول محور عصبون غير محاط بغمد مليني.

ملحوظة : يتكرر حدوث الخطوات السابقة الواردة في الشكل (2-6) ص 87 على طول محور العصبون .

## - إنتقال السيال العصبي على طول العصبون :

لاحظ أن محور العصبون في الشكل (2-6) ص 87 غير محاط بغمد مليني ، لذا يكون إنتقال السيال العصبي على طول محور العصبون .

أما في حال وجود غمد مليني فينتقل السيال العصبي عن طريق النقل الوثبي من عقدة رانفيير إلى أخرى مجاورة على طول العصبون لاحظ الشكل (7-2) 88.

## سؤال : ما العوامل التي تعتمد عليها سرعة إنتقال السيال على طول العصبون ؟

تختلف سرعة إنتقال السيال العصبي من عصبون إلى آخر وتعتمد سرعة إنتقاله على ما يأتي :

1. وجود الغمد المليني : تزداد سرعة إنتقال السيال العصبي بوجود الغمد المليني .
2. سمك الغمد المليني (إن وجد) : تزداد سرعة إنتقال السيال العصبي بزيادة سمك الغمد المليني .
2. قطر محور العصبون : تزداد سرعة إنتقال السيال العصبي بزيادة قطر المحور .

## ب - إنتقال السيال العصبي في منطقة التشابك العصبي :

- عند وصول السيال العصبي إلى النهايات العصبية ، فإن العصبون يتواصل مع خلية أخرى تكون غالبا عصبونا آخر وقد تكون غدة أو خلية عضلية ، وتعرف منطقة الإتصال بمنطقة التشابك العصبي .

- يسمى العصبون الذي يحمل السيال العصبي نحو التشابك العصبي **العصبون قبل التشابكي** . وتحتوي الأزرار التشابكية الموجودة في نهاية محوره على **حوبيصلات تشابكية** يوجد بداخلها مواد كيميائية تسمى **النوافق العصبية** مثل: أستيل كولين، ونورأدرينالين .

- أما العصبون الذي يحمل السيال العصبي بعيدا عن منطقة التشابك العصبي فيسمى **العصبون بعد التشابكي** ويحتوي غشاوه البلازمي على مستقبلات خاصة بالنوافق العصبية .

- يفصل غشاء كل من العصبون قبل التشابكي والعصبون بعد التشابكي شق يسمى **الشق التشابكي** .

انظر الشكل (2-8) ص89 : \* سم العصيوبنين (أ ) و (ب) تبعاً لموقعهما من منطقة التشابك العصبي .

الجواب : أ - عصبون قبل تشابكي      ب- عصبون بعد تشابكي .

\*مما يطلق على المادة التي تتحرر من عصبون , وتأثير في عصبون آخر ؟

الجواب : تسمى النوائق العصبية مثل : أستيل كولين , ونورأدرينالين .

---

#### آلية وخطوات انتقال السیال العصبي في منطقة التشابك العصبي :

- يصل السیال إلى الزر التشابكي , فتفتح قنوات أیونات الکالسیوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي الموجودة

على الغشاء قبل التشابكي , مما يؤدي إلى دخول أیونات الکالسیوم من السائل بين الخلوي إلى داخل الزر التشابكي .

سؤال - متأثراً وصول السیال إلى الزر التشابكي ؟

- ترتبط أیونات الکالسیوم بالحوصلات التشابكية التي تحوي النوائق العصبية فتندفع هذه الحوصلات نحو

الغشاء قبل التشابك , و تندمج فيه فيتحرر الناقل العصبي منها نحو الشق التشابكي .

سؤال - ما دور أیونات الکالسیوم في انتقال السیال عبر مناطق التشابك العصبي ؟

- يربط الناقل العصبي بمستقبلات خاصة موجودة على قنوات أیونات حساسة للنوائق الكيميائية , توجد في غشاء

العصيوبن بعد التشابكي مسببة دخول أیونات موجبة (مثل أیونات الصوديوم) عبر الغشاء بعد التشابكي , وهو ما

يؤدي إلى إزالة الإستقطاب , وانتقال جهد الفعل في هذا الغشاء .

- ومنعاً لإستمرار تتبّيّه العصيوبن بعد التشابكي , تحدث إحدى العمليتين الآتيتين:

• تحطم الناقل العصبي في الشق التشابكي بوساطة إنزيمات معينة ثم انتشار نواتج تحطمه خلال الغشاء قبل

التشابكي في الزر التشابكي , لإستخدامها في إعادة بناء الناقل العصبي مرة أخرى .

• عودة الناقل العصبي إلى الزر التشابكي .

---

- عل : لا يدوم ارتباط جزئيات الناقل العصبي الأستيل كولين لمستقبلاته طويلا ؟ انظر الكتاب ص 109 س 4

الجواب :

استيل كولين      انزيم استيل كولين استريز      حمض الخليك ( الايثانوليك ) + كولين

---

سؤال

\* صمم مخططًا سهلياً ووضح فيه آلية انتقال السيال العصبي في منطقة التشابك العصبي .

وصول سيال عصبي إلى الزر التشابكي <>> فتح قنوات أيونات الكالسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي ودخول أيونات الكالسيوم إلى داخل الزر التشابكي <>> ارتباط أيونات الكالسيوم بالحوصلات التشابكية <>> اندفاع الحوصلات التشابكية نحو الغشاء قبل التشابكي والاندماج فيه <>> تحرر الناقل العصبي وارتباطه بمستقبلات خاصة توجد على قنوات أيونات حساسة للنواقل الكيميائية موجودة في الغشاء بعد التشابكي <>> دخول أيونات موجبة ( مثل أيونات الصوديوم ) مسببة إزالة الاستقطاب ، وانتقال جهد الفعل في الغشاء بعد تشابكي .

---

المستقبلات الحسية :

تنبه المستقبلات الحسية بوساطة منبهات خاصة بها :

إما فيزيائية مثل الضوء والصوت أو كيميائية مثل الروائح المختلفة ، بحيث تحولها إلى سيالات عصبية .

1- المستقبلات المستجيبة للمنبهات الفيزيائية :

أ - مستقبلات الضوء : ويعود الضوء منبها لها .

لمعرفة آلية الإبصار، لا بد من تعرف أجزاء العين :

تتركب العين من ثلاثة طبقات هي :

\* الطبقة الخارجية : وتعرف باسم الصلبة ، التي ترتبط بعضلات هيكيلية تعمل على تحريك العين .

- والجزء الأمامي منها يكون محدباً وشفافاً ويطلق عليه إسم القرنية .

## \* الطبقة الوسطى : وتعرف باسم المشيمية .

- تتميز المشيمية بلونها الداكن ( عل ) بسبب 1- تركز صبغة الميلانين 2- غزاره الأوعية الدموية فيها .

- تكون هذه الطبقة ( المشيمية ) في الجزء الأمامي لها تركيبين هما :

1- **الجسم الهدبي** الذي يساهم في تغيير شكل العدسة .

2- **القرحية** التي تمتاز بإختلاف ألوانها بين الأفراد , ويتوسطها فتحة البؤبؤ الذي يتحكم في

كمية الأشعة الضوئية المارة إلى داخل العين عن طريق تضيقه أو توسيعه .

**ملاحظة :** - تقع العدسة خلف البؤبؤ وتمتاز بشفافيتها , ويقع خلف العدسة تجويف مملوء بمادة شفافة

شبه جيلاتينيه تسمى السائل الزجاجي الذي يحافظ على حجم العين ثابتا.

\* **الطبقة الداخلية** : وتعرف باسم الشبكية التي تحتوي على خلايا مختلفة تنظم عملها الدقيق .

- كما وتحتوي الشبكية على نوعين من مستقبلات الضوء هما : **العصي والمخاريط** .

---

انظر الشكل (11-2) ص94

• سم الطبقات التي تتراكب منها العين .

الجواب : 1- الطبقة الخارجية : الصلبة 2- الطبقة الوسطى : المشيمية 3- الطبقة الداخلية : الشبكية

• ما إسم العصب الذي ينقل السيالات العصبية من العين إلى الدماغ ؟ الجواب : العصب البصري .

• سم مستقبلات الضوء الموجودة في الشبكية . الجواب : العصي والمخاريط .

• ما أهمية القرنية ؟ الجواب : تسمح بمرور الضوء إلى داخل العين .

• ما أهمية الجسم الهدبي في العين ؟ الجواب : يساهم في تغيير شكل عدسة العين .

• ما أهمية البؤبؤ ؟ الجواب : التحكم في كمية الأشعة الضوئية المارة إلى داخل العين عن طريق تضيقه أو توسيعه .

• ما السائل الزجاجي في العين وما أهميته ؟

الجواب : هو عبارة عن مادة شفافة شبه جيلاتينيه , تحافظ على حجم العين ثابتا .

---

## **مستقبلات الضوء ( المخاريط والعصي ) ودورها في آلية الإبصار :**

### **المخاريط :**

- توجد المخاريط في الشبكية وتتركز في بقعة تسمى **البقعة المركزية** . ( التي تخلو من العصي ) .
- تحتوي المخاريط على صبغة **فوتوبسين** , وتنبه للاضاءة الشديدة , مما يسمح بإبصار الألوان المختلفة
- يوجد ثلاثة أنواع من المخاريط , أحدها حساس للضوء الأزرق والثاني حساس للضوء الأخضر والثالث حساس للضوء الأحمر , ولكن التداخل في أطوال الأمواج الضوئية التي تمتصها هذه الأنواع يتيح لنا رؤية الألوان جميعها .

### **العصي :**

- توجد في الشبكية , وتخلو منها البقعة المركزية .
  - تحتوي على صبغة **رودوبسين** , وتنثر بالضوء الخافت ,  
لذا تمكننا من الإبصار فقط باللونين الأبيض والأسود .
- 

\* يطلق على نقطة خروج العصب البصري من العين إلى مراكز الإبصار في الدماغ إسم **البقعة العمياء** ( عل )

الجواب : وذلك لعدم وجود مستقبلات حسية ( عصي ومخاريط ) فيها .

---

### **آلية الإبصار :**

عند إعكاس الضوء عن الأشياء <>> يمر الضوء المنعكس في العين ليصل إلى العصي والمخاريط <>>  
فيتغير شكل جزيئات الصبغة ( رودوبسين وفوتوبسين ) الموجودة في كل منها <>> يتكون جهد فعل <>>  
يتنتقل بوساطة العصب البصري إلى الدماغ , حيث يتم إدراك الصورة .

---

وجه المقارنة	العصبي	المخاريط
الحساسية والإستجابة للضوء	تستجيب للضوء الخافت لذلك فإنها تتمكننا من الرؤيا ليلاً باللونين الأبيض والأسود	تستجيب للضوء العالي لذلك فإنها تتمكننا من تمييز الألوان نهارا
نوع الصبغة فيها	رودوبسين	فوتوبسين

علل : العصبي أكثر حساسية للضوء من المخاريط ؟  
 الجواب : ( لأنها تستجيب للضوء الخافت )

علل : لا نستطيع تمييز الألوان ليلا ؟  
 الجواب : لأن المخاريط التي نستطيع بواسطتها تمييز الألوان لا تعمل في الضوء الخافت .

## ب - مستقبلات الصوت :

- ينشأ الصوت عن إهتزازات الأجسام , وتحتوي الأذن على مستقبلات حسية تمكنها من التقاط هذه الإهتزازات وتحويلها إلى جهد فعل .

**تركيب الأذن :** انظر الشكل ( 2 - 12 ) ص 96

تقسم الأذن إلى ثلاثة أجزاء رئيسة هي :

**الأذن الخارجية :** تكون من

- الصيوان : ويعمل على تجميع الموجات الصوتية .

- القناة السمعية : و تنتهي بغضاء الطلبة , وتحتوي على عدد تقرز مادة شمعية تعمل على حماية الأذن من المواد الغريبة التي قد تدخلها مثل الغبار .

**الأذن الوسطى :**

- هي تجويف صغير مملوء بالهواء يفصلها عن الأذن الخارجية غشاء الطلبة .

ويفصلها عن الأذن الداخلية حاجز عظمي رقيق يحوي فتحتين صغيرتين تغطيهما أغشية رقيقة ، تدعى إدراهما النافذة البيضوية , والأخرى النافذة الدائرية .

- تتميز الأذن الوسطى بإحتواها على ثلاث عظيمات هي المطرقة والسدان والركاب وتعد هذه العظيمات الأصغر في الجسم .

**ملاحظة :** تتصل المطرقة بغضاء الطلبة . والركاب تتصل بالنافذة البيضوية .

- ويحتوي الجدار الأمامي للأذن الوسطى على فتحة تؤدي إلى قناة استاكيوس , وهي قناة تتصل بالأذن الوسطى بالجزء العلوي من البلعوم وتساهم في تساوي ضغط الهواء داخل الأذن الوسطى بضغط الهواء الجوي .

علل : يكون ضغط الهواء متساويا على جنبي غشاء الطلبة ؟

## الأذن الداخلية :

ت تكون من سلسلة معقدة من القنوات تسمى التيه وتشمل : القنوات شبه الدائرية , والدهلizi , والقوعة .

لاحظ الشكل (2-13أ) ص 97

- **القوعة** : (تركيب عظمي حلزوني الشكل) يحتوي على قنوات ثلاثة هي :-

القناة الدهليزية و القناة الطلبية و القناة القووية , وتمتلي تجاويف هذه القنوات بسائل الليمف .

انظر الشكل (2-13ب) ص 97

- و القناة القووية محصورة بين القناتين الدهليزية (إلى الأعلى منها) , و الطلبية (إلى الأسفل منها) .

- ويوج في القناة القووية **عضو كورتي** الذي يستقر على غشاء قاعدي يفصل بينه وبين القناة الطلبية .

ويكون **عضو كورتي** من :

خلايا داعمة وخلايا شعرية ترتكز على غشاء قاعدي وتلامس أهدابها من الأعلى غشاء سقفي .

• **الخلايا الشعرية** :

تعمل الخلايا الشعرية بوصفها مستقبلات للصوت , وتنمیز بوجود أهداب على أطرافها الحرة .

لاحظ الشكل (2-13ج) ص 97.

ما المستقبل الصوتي ؟

**الجواب** : عبارة عن خلايا شعرية ذات أهداب توجد على أطرافها الحرة , ترتكز هذه الخلايا على غشاء قاعدي وتلامس أهدابها من الأعلى الغشاء السقفي .

## آلية السمع :

- يعمل صيوان الأذن على تجميع الموجات الصوتية , ثم يمررها إلى القناة السمعية , فيهتز غشاء الطبقة .
  - ( تعتمد سرعة إهتزاز غشاء الطبقة على تردد الموجات الصوتية التي تصله ) .
- بعد ذلك تنتقل هذه الإهتزازات من غشاء الطبقة إلى العظيمات الثلاث : المطرقة فالسندان فالركاب ثم إلى غشاء النافذة البيضوية مسببة إهتزازه .
  - ( تعمل العظيمات الثلاث على تضخم الإهتزازات بما يزيد على 20 مرة من إهتزاز غشاء الطبقة , وتسهم مساحة سطح غشاء النافذة البيضوية الصغير في عملية التضخيم ) .
- تسبب هذه الإهتزازات **موجات ضغط** في سائل الليف الموجود في قنوات القوقة الثلاث , وهو ما يتسبب في إهتزاز منطقة محددة في الغشاء القاعدي (بحسب مقدار تردد الموجات الصوتية) فتتحرك الخلايا الشعرية المستقرة على هذه المنطقة , مما يؤدي إلى تحريك الأهداب الملامسة للغشاء السقفي وثنبيها , مسببة تكون جهد فعل ينتقل عبر العصب السمعي إلى مراكز السمع في الدماغ لإدراك الصوت .

- وبعد أن تحدث **الموجات الصوتية الأثر المطلوب** يجري التخلص من الضغط الزائد في السائل الليمفي بإهتزاز غشاء النافذة الدائرية المرن . ( فلولا وجود النافذة الدائرية وغضائها المرن لتسببت موجات الضغط الناتجة من الصوت بإنفجار القوقة ) .
- 

- في أي أجزاء الأذن تقع مستقبلات الصوت ؟  
الجواب : في القوقة الموجودة في الأذن الداخلية .
- حدد الأجزاء التي تعمل على تضخيم الموجات الصوتية ؟  
الجواب : 1- العظيمات الثلاث 2- غشاء النافذة البيضوية .

• ما مصير الموجات الصوتية بعد أن تحدث الأثر المطلوب ؟

الجواب : يتم التخلص من الضغط الزائد في السائل الليمفي بإهتزاز غشاء النافذة الدائرية المرن .  
ولولا وجود النافذة الدائرية وغضائها المرن لتسبيب موجات الضغط الناتجة من الصوت بانفجار القرقة ) .

---

## 2- المستقبلات المستجيبة للمنبهات الكيميائية :

الشم :

- يستطيع الإنسان تمييز نحو 10000 رائحة مختلفة ( عل ) ؟

وذلك لإحتواء الأنف على مستقبلات لهذه الروائح .

- توجد ( المستقبلات الشمية ) في المنطقة الطلائية الأنفية التي تقع أعلى التجويف الأنفي .

لاحظ الشكل ( 14-2 ) ص 99

تالف المنطقة الطلائية الأنفية من عدة أنواع من الخلايا أهمها :

**الخلايا الشمية** : هي عصبونات تنتهي بعدد من الأهداب التي تقع عليها مستقبلات المواد التي تتبعها .

**الخلايا الداعمة** : هي خلايا طلائية عمادية تعمل على إسناد الخلايا الشمية .

**الخلايا القاعدية** : تقع هذه الخلايا بين قواطع الخلايا الداعمة ، ويعتقد أنها تعمل على تجديد الخلايا الشمية .

كما وتحتوي هذه المنطقة على بعض الغدد مثل :-

**الغدد المخاطية** : تفرز المخاط الذي يعد مذيباً للمواد التي يجري استنشاقها .

**غدد وخلايا تفرز محتواها مائي** : يعمل هذا محلول الماء على إزالة أثر المادة الكيميائية ( المنبه )

بعد إنتهاء عملية الشم لجعل المستقبلات جاهزة للإرتباط بمادة جديدة .

---

## **كيف تحدث عملية الشم (آلية الشم)؟**

ترتبط المواد الكيميائية المتطايرة الذائبة في المخاط بمستقبلاتها البروتينية الخاصة والمناسبة لشكلها الموجودة على أهداب الخلايا الشمية، مما يؤدي إلى حدوث سلسلة من التفاعلات التي تتسبب في تكون **جهد فعل** ينتقل عبر العصب الشمي إلى مراكز الشم في الدماغ لتمييز الرائحة.

---

**سؤال - ما الشروط الواجب توافرها في المادة لكي نستطيع شمها؟**

**الجواب :**

- 1 : متطايرة .
  - 2: تذوب في المخاط الموجود داخل الانف .
  - 3 : يناسب شكلها شكل المستقبلات البروتينية الموجودة على أهداب الخلايا الشمية .
- 

**سؤال : ما المستقبل الحسي لكل من التالية ؟**

- 1 : الضوء : (العصي و المخاريط) توجد في الشبكية .
  - 2 : الألوان : (المخاريط)
  - 3 : الصوت : (خلايا شعرية ذات أهداب على اطرافها الحرمة) توجد في عضو كورتي ضمن القناة القوقعية .
  - 4 : الرائحة : (خلايا شمية ذات أهداب تقع عليها مستقبلات المواد) توجد في المنطقة الطلائية الأنفية .
- 

**سؤال : ماذا يحدث في حال تلف الغدد المخاطية؟**

**الجواب :** لن يتم إفراز المخاط الضروري لذوبان المادة التي تم استنشاقها والمراد شمها ، وبالتالي لن نتمكن من عملية الشم .

---

## **أنواع العضلات في الجسم :**

العضلات الهيكليّة و العضلات القلبية و العضلات الملساء .

### **النسيج العضلي الهيكلي :**

يؤدي وظائف مثل : تغيير تعابير الوجه و تركيز البصري شيء محدد ، بتناسق ودقة .

---

- **تركيب العضلة الهيكليّة :** ادرس الشكل (15-2) ص 100

- تتركب العضلة الهيكليّة من حزم من الألياف العضلية ( الخلايا العضلية ) .

- ويمثل كل ليف عضلي ( خلية عضلية ) متعددة النوى .

- يتكون كل ليف عضلي من عدد من الليفبات العضلية .

- يتكون الليف العضلي الواحد من نوعين من الخيوط البروتينية : هي

1- خيوط سميكة تحوي بروتين ميوسين ولها رؤوس تدعى رؤوس الميوسين .

2- خيوط رفيعة تحوي بروتين أكتين .

- تترتب خيوط الأكتين والميوسين على نحو متداخل ، مما يكسب العضلة الهيكليّة مظهراً مخططاً .

- تثبت خيوط الأكتين من نهاياتها ببروتين فيتكتون تركيب يسمى (z-line) .

- يطلق على المنطقة الواقعة بين خطي (Z) **القطعة العضلية** .

- وتثبت خيوط الميوسين في مواقعها بوساطة بروتين فيتكتون تركيب يسمى (m-line) ،

يقع في منتصف القطعة العضلية ، لاحظ الشكل (15-2) ص 100 .

---

\* مم يتكون الليف العضلي الواحد ؟  
الجواب : يتكون من الليفونات العضلية .

---

\* سم البروتينات التي يتكون منها الليف العضلي ؟  
الجواب : بروتين ميوسين وبروتين أكتين .

---

\* مادا يطلق على المنطقة المحصورة بين خطى Z ؟  
الجواب : قطعة عضلية .

---

\* علل : تبدو الخلايا العضلية تحت المجهر مخططة تخطيطا عرضيا ؟  
الجواب : وذلك لوجود نوعي الخيوط البروتينية الأكتين الرفيعة والميوسين السميكة التي تترتب على نحو متداخل .

---

#### آلية إنقباض العضلة الهيكيلية :

- يؤدي وصول سائل عصبي من عصبون حركي إلى الليف العضلي إلى نشوء جهد فعل ينتشر على طول

غشاء الليف العضلي , ويمر بأنبيبات مستعرضة تمتد بين الليفونات العضلية , مما يؤدي إلى خروج

أيونات الكالسيوم من مخازنها في الشبكة الإندوبلازمية الملساء , وإنشارها في السيتوسول بين الليفونات

العضلية . انظر الشكل (2-16) ص 101

- ثم ترتبط أيونات الكالسيوم بمستقبلات خاصة على خيوط الأكتين , فتكتشف موقع إرتباط رؤوس الميوسين بخيوط الأكتين . انظر الشكل (2-17) ص 102 .

- بعد تكشف موقع إرتباط رؤوس الميوسين بخيوط الأكتين يتم الإرتباط بينهما مكونا جسورا عرضية .

- تنتهي الجسور العرضية مما يؤدي إلى حركة خيوط الأكتين الرفيعة بإتجاه وسط القطعة العضلية فتنزلق

بين خيوط الميوسين السميكة , مسببه قصر القطعة العضلية .

---

انظر الشكل (18-2) ص 103 و تتبع آلية إنقباض العضلة بحسب نظرية الخيوط المنزلقة

ولاحظ أن :

رؤوس الميوسين هي المكان الأساسي لاستهلاك (ATP) ،

إذ إن تكوين الجسور العرضية أو فكها يتطلب طاقة .

وبوجه عام فإن الإنزلاق بين خيوط الأكتين والميوسين لا يكون كافيا لإحداث إنقباض في العضلة فتكرر الخطوات السابقة لإحداث الإنقباض المطلوب. وهذا يتطلب تكون جسور عرضية جديدة.

---

ماذا يحدث عند توقف تنبيه العضلة الهيكلية من الجهاز العصبي ؟ ( اشرح آلية الإنبساط ؟ )

عند توقف تنبيه العضلة الهيكلية من الجهاز العصبي تعود أيونات الكالسيوم إلى مخازنها في الشبكة الإندوبلازمية ، بعملية النقل النشط ، فتصبح الأماكن المخصصة لارتباط رؤوس الميوسين بالأكتين غير متكشفة ، مما يحول دون تكون جسور عرضية ، فيحدث إنبساط العضلة .

---

**الأنيبيات المستعرضة :** هي إنغمادات غشائية عرضية في الغشاء البلازمي تقع على طرفي خيوط الميوسين ، تمتد بين الليفيات العضلية وتكون محاطة بالشبكة الإندوبلازمية الملساء التي تخزن أيونات الكالسيوم .

---

سؤال :

في أي خطوات الإنقباض تحتاج الألياف العضلية إلى ATP ؟

1 : إن عملية تكوين الجسور العرضية أو فكها يتطلب طاقة .

2 : عند توقف تنبيه العضلة تحتاج الألياف العضلية إلى طاقة لإعادة ضخ أيونات الكالسيوم نحو مخازنها في الشبكة الإندوبلازمية الملساء ( نقل نشط ) .

## التنظيم الهرموني :

**الهرمونات** : هي مواد كيميائية تفرزها غدد أو خلايا متخصصة , تعمل على تنظيم أنشطة مختلفة في الجسم , ويشترك الجهاز العصبي مع الهرمونات في تنظيم هذه الأنشطة .

- يختلف التنظيم الهرموني عن التنظيم العصبي, إذ يكون التنظيم الهرموني أبطأ من التنظيم العصبي .
- وذلك لأنّقل الهرمونات بوساطة الدم إلى أجزاء الجسم , في حين يعتمد إفراز النواقل العصبية في التنظيم العصبي على انتقال السائل العصبي في محاور العصبونات , ويتم ذلك بسرعة كبيرة .
- ويختلف أيضاً في مدة تأثير كل منها إذ يستمر تأثير الجهاز العصبي مدة أقصر من تأثير الهرمونات .
- وذلك بسبب حدوث عمليات تثبيط إستمرار تباعي النواقل العصبية ( انظر ص 10 دوسيه ) , في حين لا توجد مثل هذه العمليات في التنظيم الهرموني . ونلخص ما سبق في الآتي :

التنظيم الهرموني	التنظيم العصبي	وجه المقارنة
أبطأ (عل) ، لأن الهرمونات تنتقل بواسطة تيار الدم فتصل إلى الخلايا الهدف ببطء .	أسرع (عل) ، لأن إفراز النواقل العصبية يعتمد على وصول السائل العصبي الذي ينتقل بسرعة في محاور العصبونات .	سرعة التأثير
تيار الدم .	المحاور العصبية .	وسيلة الانتقال
أطول أمداً (عل) لعدم وجود عمليات تثبيط عملها مثل تلك الموجودة في التنظيم العصبي .	أقصر أمداً (عل) نظراً لوجود عمليات تثبيط الناقل العصبية و تمنعها من العمل لفترة طويلة .	مدة التأثير

ويمكن تصنيف الهرمونات تبعاً لتركيبها الكيميائي إلى :

- هرمونات بيتيدية
- هرمونات بروتينية سكرية
- هرمونات مشتقة من الحمض الأميني .

## آلية عمل الهرمونات :

آلية عمل الهرمونات بشكل عام يوضحها الشكل (2-2) ص 106.

يرتبط الهرمون بمستقبل بروتيني خاص يوجد على غشاء الخلية أو داخلاها ، مما يسبب حدوث سلسلة من العمليات التي تختلف بإختلاف تركيب الهرمون ، والتي تؤدي إلى إستجابة الخلية .

---

آلية عمل الهرمونات الستيرويدية : انظر الشكل (2-2) ص 106 .

من الأمثلة على هذه الهرمونات التستوستيرون ، والألدوستيرون .

- تدخل هذه الهرمونات الى الخلية بسهولة ، لأنها تذوب في الليبيدات فإنها تستطيع عبور الغشاء البلازمي )

( تذكر أن الغشاء البلازمي للخلية يتكون أساساً من الليبيدات )

ثم ترتبط بمستقبل بروتيني داخل السيتوسول ، فيتكون معقد (هرمون - مستقبل) .

- ينتقل هذا المعقد من ثقب الغلاف النووي إلى داخل النواة ، ويرتبط بأحد المواقع في جزيء DNA مما يؤدي إلى تكوين m-RNA الذي يترجم لبناء بروتينات جديدة في سيتوسول الخلية الهدف ، تؤثر في أنشطتها وتحصل الإستجابة .

---

علل : التنظيم الهرموني بطيء وواسع الانتشار ؟

الجواب : لأن الهرمونات تتنقل مع الدم وبسرعته إلى مختلف أنحاء الجسم .

---

علل : التنظيم الهرموني محدد الهدف ؟

- يؤثر كل هرمون في خلايا محددة تسمى **الخلايا الهدف** ، إذ يوجد على أغشية هذه الخلايا أو داخلاها

مستقبلات خاصة لارتباط بهرمون معين ، ويؤدي ارتباط الهرمون بهذه المستقبلات إلى حدوث تغيرات داخلاها .

---

## الفصل الثاني

تبادل الغازات عند الحويصلات الهوائية ونقلها : انظر الشكل 2 - 26 ص 112

نقل  $O_2$  في الدم :

- ينقل الشريان الرئوي الدم الفقير بالأكسجين إلى الرئتين ، ويوصله إلى الشعيرات الدموية المحيطة

بالحويصلات الهوائية .

- العوامل التي تزيد من كفاءة تبادل الغازات عند الحويصلات الهوائية :

1- جدر الشعيرات الدموية رقيقة منفذة .

2- جدر الحويصلات الهوائية رقيقة منفذة ، ومساحة سطحها الواسعة تزيد من كفاءة عملية تبادل الغازات .

3- وجود كميات كبيرة من الدم في الأوعية الدموية المحيطة بالحويصلات الهوائية .

.....

ملاحظات هامة :

- ينتشر  $O_2$  عبر جدران الحويصلات الهوائية ثم ينتشر عبر جدران الشعيرات الدموية المحيطة بها وصولا إلى بلازما الدم .

- ينتقل الأكسجين خلال جدر الخلايا بعملية تدعى الإنتشار البسيط المعتمد على فرق التركيز .

- الضغط الجزيئي لأي غاز يتاسب طرديا مع تركيزه ، ( حيث أن كل غاز في خليط الغازات يساهم في جزء من الضغط الكلي الذي يعرف بالضغط الجزيئي للغاز ) .

- تنتقل المادة من المناطق التي يكون تركيزها فيها عاليا ( أي ضغطها الجزيئي فيها عاليا ) إلى المناطق التي يكون تركيزها فيها أقل ( أي ضغطها الجزيئي فيها أقل ) .

- يرمز للضغط الجزيئي للاكسجين بالرمز (  $Po_2$  ) .

- يتركب جزيء الهيموغلوبين من :

- 1 - سلسلتين الفا غلوبين
  - 2 - سلسلتين بيتا غلوبين
  - 3 - أربع مجموعات هيمن تحوي كل منها ذرة حديد.
- ترتبط ذرة الحديد بروابط ضعيفاً مع جزيء واحد أكسجين (لاحظ أن كل جزيء هيموغلوبين يرتبط بأربعة جزيئات أكسجين عند الإشباع) مكوناً أكسيهيموغلوبين.
- 

: آلية نقل O<sub>2</sub>


- عند حدوث الشهيق يدخل الهواء إلى الرئتين ويصل إلى الحويصلات الهوائية (يصبح الضغط الجزئي للاكسجين في الحويصلات عالي مقارنة مع الدم) ثم ينتشر عبر جدرها إلى بلازما الدم، وينتقل في الدم

بطريقتين هما :


- 1- جزء قليل (2%) من O<sub>2</sub> ينتقل ذاتياً في البلازما.
- نظراً لأن ذائبية O<sub>2</sub> في الماء منخفضة، فإن الكمية المنقوله منه بشكل ذاتي في بلازما الدم تكون قليلة ولا تكفي حاجة الجسم للقيام بعمليات الأيض.

- 2- لذلك فإن معظم O<sub>2</sub> (98%) ينتقل بواسطة خلايا الدم الحمراء مرتبطة مع الهيموغلوبين على شكل مركب أكسيهيموغلوبين كما يلي :-

- يرتبط O<sub>2</sub> مع مركب الهيموغلوبين Hb مكوناً مركب الأكسيهيموغلوبين.



وما أن يصل الأكسيهيموغلوبين مع تيار الدم إلى الأنسجة التي تحتاج إليه (الضغط الجزئي للاكسجين فيها يكون أقل من الدم) حيث يتفكك عندها إلى مكونيه، ويتحرر الأكسجين لينتقل إلى الخلايا للإستفادة منه.



**سؤال : ما الذي يحدد إرتباط الأكسجين بالهيموغلوبين أو تحرره منه ؟**

**الجواب :** هناك عدة عوامل ولكن أهمها **الضغط الجزئي للأكسجين** الذي يبين مدى تركيزه .

---

**سؤال :** ما العوامل التي يعتمد عليها تشبّع ( إرتباط ) الهيموغلوبين بالأكسجين ؟

1 : **الضغط الجزئي للأكسجين** ( كلما زاد تركيز الأكسجين زادت قابلية الهيموغلوبين للإرتباط به ) .

2 : **الرقم الهيدروجيني ( PH )** للدم ( الطبيعي = 7,4 ) .

3 : درجة حرارة الجسم وتساوي 37 س .

---

**سؤال :** ما العوامل التي تساعد على تحرر الأكسجين من مركب الأكسيهيموغلوبين ؟

أو ما العوامل التي تؤدي إلى تحلل وإنفصال الأكسيهيموغلوبين إلى مكونيه ؟

1 : **الضغط الجزئي للأكسجين ( Po2 )** : ( حيث يتتحرر الأكسجين عندما يصل إلى الأنسجة التي

يكون ضغطه الجزئي فيها أقل من الدم ) .

2 : **الرقم الهيدروجيني ( PH )** : حيث يزداد تحرر الأكسجين عندما تقل درجة الحموضة ويزداد

تركيز CO2 ( وهذا ما يعرف بتأثير بور ) .

3 : **درجة حرارة الجسم** : حيث يزداد تحرر الأكسجين عند ارتفاع درجة حرارة الجسم الناتجة عن

ممارسة التمارين الرياضية ، أو بعض الحالات المرضية مثل الإلتهابات .

---

**من يستحق� الإحترام :**

**هو ذلك الشخص الذي يعاملك بأدب ، حتى لو كان مزاجه سيئاً .**

\*\*\* بعد وصول الأكسجين إلى خلايا الجسم المختلفة فإنه يتم استهلاكه بعملية التنفس الخلوي ، مما يؤدي إلى إنتاج ثاني أكسيد الكربون ، ونظراً لسمية هذا الغاز فإنه لا بد من التخلص منه .

### نقل ثاني أكسيد الكربون في الدم $\text{CO}_2$

انظر الأشكال 2 - 30 - 2 / 29 - 2 ص 116 ص 117

- الدم القادم بوساطة الشريان الرئوي وفروعه إلى الحويصلات الهوائية يحمل تركيزاً عالياً من ثاني أكسيد الكربون ( $\text{PCO}_2$  عالياً) .
- ويكون ( $\text{PCO}_2$ ) في الحويصلات الهوائية أقل مما هي عليه في الدم ، لذلك ينتشر ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الحويصلات الهوائية ليخرج مع هواء الزفير .

### أشكال نقل $\text{CO}_2$ في الدم :

ينتقل  $\text{CO}_2$  في الدم بالأشكال الآتية :-


- 1- 7 % من غاز  $\text{CO}_2$  تنتقل ذائب في بلازما الدم ، عند وصولها إلى الرئتين فإنها تنتشر إلى الحويصلات الهوائية .
- (نظراً لأن ذائبة  $\text{CO}_2$  في الماء أكبر من ذائبة  $\text{O}_2$  فإن كمية  $\text{CO}_2$  المنقولة بشكل ذائب في البلازما تكون أكبر من كمية  $\text{O}_2$ )
- 2- حوالي 23 % من  $\text{CO}_2$  ترتبط مع الهيموغلوبين لتكون مركب الكاربامينوهيموغلوبين . الذي يتفكك على نحو سريع إلى هيموجلوبين و  $\text{CO}_2$  عند وصوله إلى الشعيرات الدموية المحيطة بالحويصلات الهوائية في الرئتين ، حيث ينتشر  $\text{CO}_2$  إلى الحويصلات الهوائية .




3- أما 70 % المتبقية فإنها تنتقل على هيئة أيونات الكربونات الهيدروجينية ( $\text{HCO}_3^-$ ) في بلازما الدم .

بالآلية الآتية :

- يتحد  $\text{CO}_2$  مع الماء داخل خلايا الدم الحمراء بمساعدة إنزيم كربونيكي أنهيدريز (الذي يسرع التفاعل ) لينتج



- يتحلل حمض الكربونيكي داخل خلايا الدم الحمراء إلى أيونات الهيدروجين  $\text{H}^+$  وأيونات الكربونات



- ثم ينتشر  $\text{HCO}_3^-$  من خلايا الدم الحمراء إلى البلازما وينتقل معها .

- نتيجة لخروج  $\text{HCO}_3^-$  إلى بلازما الدم يحدث خلل في التوازن الكهربائي على جنبي الغشاء البلازمي لخلية الدم الحمراء .

لذا تنتقل أيونات الكلور السالبة الموجودة بكميات كبيرة في بلازما الدم إلى داخل خلايا الدم الحمراء

لإعادة التوازن الكهربائي على جنبي الغشاء البلازمي لخلية الدم الحمراء .  
( وتسمى هذه العملية إزاحة أيونات الكلور )

- وعند وصول الدم إلى الشعيرات الدموية المحيطة بالهوبيصلات الهوائية في الرئتين فإن  $\text{HCO}_3^-$  ينتشر

إلى خلايا الدم الحمراء ويرتبط مع أيونات الهيدروجين لتكوين حمض الكربونيكي



ثم يتحلل حمض الكربونيكي إلى  $\text{CO}_2$  و  $\text{H}_2\text{O}$  حيث ينتشر  $\text{CO}_2$  من خلايا الدم الحمراء إلى بلازما الدم ومنها إلى الهوبيصلات الهوائية ليتخلص منه الجسم بعملية الزفير , كما وتنقل أيونات الكلور السالبة من خلايا الدم الحمراء إلى بلازما الدم .

سؤال :

\*\*\* بين ماذا يحدث ل  $\text{CO}_2$  عند وصوله الى الرئتين :

1 : ( 7 % ) من  $\text{CO}_2$  القادمة ذائبة مع البلازمما تنتشر الى الحويصلات الهوائية .

2 : ( 23 % ) القادمة على شكل **كاربامينو هيمو غلوبين** تتحل الى هيمو غلوبين و  $\text{CO}_2$  الذي ينتشر الى الحويصلات الهوائية .

3 : ( 70 % ) القادمة على شكل  $\bar{\text{HCO}_3}$  فإنها تنتشر الى خلايا الدم الحمراء وترتبط مع أيونات الهيدروجين لتكون حمض الكربونيكي الذي يتحلل الى  $\text{CO}_2$  و  $\text{H}_2\text{O}$  حيث ينتشر  $\text{CO}_2$  من خلايا الدم الحمراء الى بلازما الدم ومنها الى الحويصلات الهوائية ليتخلص منه الجسم بعملية الزفير .

---

سؤال : حدد اتجاه إنتقال كل من  $\bar{\text{Cl}}$  و  $\bar{\text{HCO}_3}$  عند انتقال  $\text{CO}_2$  من أنسجة الجسم الى الدم ؟

الجواب :

$\bar{\text{HCO}_3}$  من خلايا الدم الحمراء الى بلازما الدم ( فيحدث خلل في التوازن الكهربائي ) .

$\bar{\text{Cl}}$  من بلازما الدم الى خلايا الدم الحمراء ( لإعادة التوازن الكهربائي ) .

---

سؤال : حدد اتجاه إنتقال كل من  $\bar{\text{Cl}}$  و  $\bar{\text{HCO}_3}$  عند انتقال  $\text{CO}_2$  من الدم الى الرئتين ؟

الجواب :

$\bar{\text{HCO}_3}$  من بلازما الدم الى خلايا الدم الحمراء ( فيحدث خلل في التوازن الكهربائي ) .

$\bar{\text{Cl}}$  من خلايا الدم الحمراء الى البلازمما ( لإعادة التوازن الكهربائي ) .

---

ما المقصود بـأزاحة أيونات الكلور : انتقال أيونات الكلور السالبة من بلازما الدم إلى داخل خلايا الدم الحمراء  
لإعادة التوازن الكهربائي على جنبي الغشاء البلازمي لخلية الدم الحمراء .

---

سؤال :

اكتب نواتج تحلل حمض الكربونيك في : -

\*- خلايا الدم الحمراء الموجودة في منطقة الأنسجة ؟

الجواب :

- يتحلل حمض الكربونيك إلى أيونات الهيدروجين  $H^+$  وأيونات الكربونات الهيدروجينية  $\bar{HCO}_3^-$

\*- خلايا الدم الحمراء الموجودة في منطقة الرئتين حول الحويصلات الهوائية ؟

الجواب :

- يتحلل حمض الكربونيك إلى  $CO_2$  و  $H_2O$  .

---

ومن طلب العلا سهر الليالي	بقدر الكد تكتسب المعالي
اضاع العمر في طلب المحال	ومن طلب العلا من غير كد
<hr/>	
وحظك موفر وعرضك صين	إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى
فكلك عورات وللناس السن	لسانك لا تذكر به عورة أمرىء

## **دور الكلية في تكوين البول :**

- الكلية جزء من الجهاز البولي المسؤول عن طرح الفضلات النيتروجينية والمواد غير العضوية الزائدة عن حاجة الجسم على شكل بول .
  - وللكلية دور في المحافظة على الإتزان الداخلي للجسم .
  - تحتوي الكلية على حوالي ( 1,3 مليون من الوحدات الأنبوبية الكلوية المجهريّة ) والتي تعتبر الوحدة الأساسية المكونة للكلية وتعمل على ( ترشيح ) إستخلاص المواد السامة والفضلات من الدم ، حيث يرشح الدم في الكبة عدة مرات يومياً ويشكل البول حوالي 1،5 لتر تقريباً يومياً .
- 

## **سؤال : ما وظائف الكلية ؟**

وعمل الكلية يعتبر مجموع عمل الوحدات الأنبوبية الكلوية حيث يتم

- 1- إستخلاص المواد السامة والفضلات من الدم لتكوين البول .
  - 2- المحافظة على إتزان الماء والأملاح في الجسم .
  - 3- ضبط درجة حموضة الدم .
  - 4- ضبط ضغط الدم وحجمه .
- 

يَا نَفْسٌ لَا تَقْنطِي مِنْ زَلَةٍ عَظَمَتْ  
إِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفرَانِ كَالْلَّمَمِ

**تركيب الوحدة الأنبوبية الكلوية :** انظر الشكل 2 - 32 ص 118

**1 : محفظة بومان :**

- يوجد داخل المحفظة الكبة ( وهي شبكة من الشعيرات الدموية عالية النفاذية ) .
- يتم في الكبة عملية الإرتشاح .

**2 : الأنبوبة الملتوية القريبة :**

- سميت بهذا الإسم لقربها من محفظة بومان ويتم فيها :
  - أ- إعادة إمتصاص المواد التي يحتاجها الجسم من السائل الراسح .
  - ب- الإفراز الأنبوبي للمواد السامة والضارة ونواتج أيض بعض العقاقير الضارة .

**3 : التواء هنلي :**

- . ويكون على شكل U ، ويتم فيه إعادة إمتصاص المواد التي يحتاجها الجسم من السائل الراسح .

**4 : الأنبوبة الملتوية البعيدة :**

- سميت بهذا الإسم لبعدها عن محفظة بومان ، ويتم فيها :
  - أ- إعادة إمتصاص المواد التي يحتاجها الجسم من السائل الراسح .
  - ب- الإفراز الأنبوبي للمواد السامة والضارة ونواتج أيض بعض العقاقير الضارة .

**5 : القناة الجامعة :**

- ويتم فيها :
  - أ- إعادة إمتصاص المواد التي يحتاجها الجسم من السائل الراسح .
  - ب- الإفراز الأنبوبي للمواد السامة والضارة ونواتج أيض بعض العقاقير الضارة .

## عمليات تكوين البول :

تتم عملية تكوين البول بثلاث عمليات هي : الشكل 2-33 ص 120

1 : الإرتشاح      2 : إعادة الإمتصاص      3 : الإفراز الأنبوبي

---

### 1- الإرتشاح :

- تتم عملية الإرتشاح في الكبة ( عل ) .

الجواب : لأن الكبة عبارة شبكة من الشعيرات الدموية ذات النفاذية العالية .

- توجد الكبة في محفظة بومان حيث تشكل ( محفظة بومان والكبة ) تركيبا يسمى **الحوصلة الكلوية** .

عند وصول الدم بوساطة الشريان الوارد إلى الكبة فإنه يتم ترشيح المواد صغيرة الحجم مثل أيونات الصوديوم وأيونات الكلور وأيونات البوتاسيوم وجزيئات الغلوكوز والحموض الأمينية بالإضافة إلى الفضلات النيتروجينية الذائبة في بلازما الدم ، ( فيما يسمى بالسائل الراشح ) .

ولا يتم ترشيح خلايا الدم الحمراء والمواد  **ذات الحجم الجزيئي الكبير** مثل بروتينات البلازما .

وما تبقى من الدم فإنه ينتقل في الشريان الصادر إلى الشعيرات الدموية المحيطة بالأأنابيب الملتوية .

---

عل : عدم إحتواء السائل الراشح على بروتينات بلازما الدم ؟

الجواب : لأنها ذات حجم جزيئي كبير ولا يمكنها النفاذ من خلال جدران الكبة .

---

سؤال : ما العوامل التي تعمل على ضبط معدل عملية الإرتشاح ؟

الجواب :

- **الجهاز العصبي الذاتي** , حيث أن الأعصاب الودية تتحكم في العضلات الملساء المكونة للشريان الوارد .

- **الهرمونات** , ولها دور هام في تنظيم عمل الكلية .

## - إعادة الإمتصاص :

- تتم عملية إعادة الإمتصاص في جميع أجزاء الوحدة الأنبوية الكلوية ( الأنبوبة الملتوية القربيّة والتواء هنلي والأنبوبة الملتوية البعيدة والقناة الجامعية ) ما عدا محفظة بومان ( الكبة ) .
  - يعاد إمتصاص 99 % من السائل الراشح إلى الدم ، أما الـ 1 % المتبقية فتخرج على شكل بول .
  - يعاد إمتصاص الغلوكوز والحموض الأمينية وأيونات الصوديوم وأيونات البوتاسيوم ومثل هذه المواد لا يمكن للجسم الاستغناء عنها .
  - تتم إعادة الإمتصاص إما بالنقل النشط أو الانتشار إلى السائل بين خلوي ثم إلى الشعيرات الدموية المحيطة بأجزاء الوحدة الأنبوية الكلوية ، أما الماء فيعاد امتصاصه بالخاصية الإسموزية .
- 
- علل : تعد عملية إعادة الإمتصاص من العمليات المهمة جداً لجسم الإنسان ؟  
الجواب :  
لو لا هذه العملية لأصبح الإنسان مضطراً لشرب كميات كبيرة من الماء لتعويض ما يفقده عن طريق عملية الإرتشاح والا فإن خلايا جسمه ستتجفف ويعرض لخطر الموت .  
وكذلك هناك الكثير من المواد لا يمكن للجسم الاستغناء عنها مثل الغلوكوز والحموض الأمينية وأيونات الصوديوم وأيونات البوتاسيوم لذلك لا بد من إعادة امتصاصها نحو الدم .
- 

## - الإفراز الأنبوبي :

- هناك بعض المواد لم يتم ترشيحها عن طريق الكبة في محفظة بومان مثل المواد السامة والضارّة ونواتج بعض العقاقير وتجنباً لخطر هذه المواد فإنه يتم إنتقالها من شبكة الأوعية الدموية المحيطة بالوحدة الأنبوية الكلوية إلى تجاويف كل من الأنبوبة الملتوية القربيّة والأنبوبة الملتوية البعيدة والقناة الجامعية لتضاف إلى السائل الراشح وذلك بغير عملية الإرتشاح .
  - ملاحظة - تتم عملية الإفراز الأنبوبي بالنقل النشط أو الانتشار .
-

سؤال :- ما أهمية الإفراز الأنبوبي ؟

أو ما دور الإفراز الأنبوبي في تنظيم درجة الحموضة في الجسم ؟

أو فسر " تعد عملية الإفراز الأنبوبي من العمليات المهمة التي تقوم بها الوحدة الأنبوبية الكلوية ؟ "

الجواب :

يساهم الإفراز الأنبوبي في تنظيم درجة الحموضة في الجسم عن طريق :-

طرح أيونات الهيدروجين الزائدة خارج الجسم , وإعادة إمتصاص أيونات الكربونات الهيدروجينية ,  
وهذا يعرف بالتوازن الحمضي القاعدي .

---

#### دور الهرمونات في ضبط عمل الكلية

للهرمونات دور في المحافظة على الإتزان الداخلي للجسم وضبط عمل الكلية .

١) **الهرمون المانع لإدرار البول ( ADH )** الذي يصنع في تحت المهاد ويخزن في النهايات العصبية في  
النخامية الخلفية ويفرز منها عند زيادة الضغط الإسموزي للدم .

ب) **هرمون الدوستيرون** الذي يفرز من قشرة الغدة الكظرية عند نقص حجم الدم ونقص ضغطه.

ج) **عامل الأذيني المدر للصوديوم ( ANF )** الذي يفرز من الأذينان في القلب عند زيادة حجم الدم وضغطه.

---

من بني لنا في الروح مقاما      بنينا له في القلب جنة

**أ) الهرمون المانع لإدرار البول : ADH :**

- تساهم الكلية وتحت المهد والنخامية الخلفية في المحافظة على إتزان الماء في الجسم عن طريق الهرمون المانع لإدرار البول **ADH**.

**آلية عمل الهرمون المانع لإدرار البول : ADH :**

**عند زيادة الضغط الإسموزي للدم** (نتيجة لزيادة تركيز المواد الذائبة في الدم) يتم تنبيه المستقبلات الإسموزية في تحت المهد لتعمل على تحفيز النخامية الخلفية لتفرز **ADH** إلى الدم، ثم يصل هذا الهرمون إلى الجزء الأخير من الأنابيب الملتوية البعيدة والقتوات الجامعه في الكلية ليزيد من نفاذيتها للماء، مما يؤدي إلى زيادة إعادة إمتصاص الماء نحو السائل بين خلوي ثم إلى الشعيرات الدموية .  
لتصبح البول أكثر تركيزا وأقل حجما، والدم أقل تركيزا وأكثر حجما.

- ومن ناحية أخرى فإن **زيادة الضغط الإسموزي للدم** (زيادة تركيز المواد الذائبة في الدم) تعمل على

تنبيه مراكز العطش في تحت المهد (عل) **الجواب** : وذلك لتحفيز الإنسان على شرب كميات أكبر من الماء لإعادة تركيز المواد الذائبة في الدم إلى الوضع الطبيعي و تقليل الضغط الإسموزي للدم .

---

ب ) نظام رنين- إنجيوتنسين - الستيرون : الشكل 2-34 ص 122

- عندما تقل كمية الدم الواردة إلى الكبد فإن ضغط الدم فيها ينخفض ويقل تركيز أيونات الصوديوم مما يحفز الخلايا قرب الكبيبة الموجودة في جدران الشريين الوارد على إفراز إنزيم رنين .

- يعمل إنزيم رنين على تحويل بروتين مولد إنجيوتنسين ( ينتجه الكبد ويفرزه في البلازمما ) إلى بروتين إنجيوتنسين I الذي يتحول بواسطة إنزيم محول الإنجيوتنسين ( ACE ) إلى إنجيوتنسين II في بلازما الدم في الشعيرات الدموية المحيطة بالحويصلات الهوائية .

ملاحظة : إنزيم محول الإنجيوتنسين ( ACE ) يفرز من الخلايا الطلائية المبطنة للحويصلات الهوائية في الرئتين .

- يعمل إنجيوتنسين II على :- ١) تصييق الشريينات .

ب ) حث قشرة الغدة الكظرية على إفراز هرمون الستيرون .

- يعمل الستيرون على زيادة إعادة امتصاص أيونات الصوديوم في الدم مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم .  
- نتيجة لارتفاع مستوى أيونات الصوديوم في الدم فإن الضغط الإسموزي للدم يزداد ، مما يؤدي إلى انتقال الماء بالخاصية الإسموزية من الأنوية الملتوية البعيدة والقناة الجامحة إلى السائل بين خلوي ومنه إلى الدم ، وبهذا يزداد حجم الدم وضغطه ويعودان إلى المستوى الطبيعي .

---

ج ) العامل الأذيني المدر للصوديوم : ANF

عند زيادة حجم الدم وضغطه تفرز خلايا متخصصة في الأذينين في القلب هذا العامل ( ANF ) الذي يرتبط بإفراز إنزيم رنين مما يؤدي إلى تثبيط إفراز هرمون الستيرون وبالتالي تثبيط إعادة امتصاص الصوديوم والماء نحو الدم ، فيقل حجم الدم وضغطه .

نلاحظ : أن العامل الأذيني المدر للصوديوم يعمل ضد هرمون الستيرون في تنظيم عمل الكلية .

---

سؤال : ما تأثير زيادة ANF في حجم البول ؟

الجواب : إن زيادة ANF تؤدي إلى زيادة حجم البول .

---

سؤال : ما تأثير إنجيوتنسين II في كل من :

- ا ) الشريين الصادر : يعمل على تضيقه , فيرفع ضغط الدم في الكمة .
  - ب ) قشرة الغدة الكظرية : يحثها على إفراز هرمون الدوستيرون .
- 

سؤال : ما الذي يسبب افراز العامل الأذيني المدر للصوديوم ؟

ج : زيادة حجم الدم وزيادة ضغطه .

---

سؤال : ما تأثير الهرمون المانع لإدرار البول على كل من حجم وتركيز كل من الدم والبول ؟

الدم : يعمل على زيادة حجمه ونقصان تركيزه .

البول : يعمل على نقصان حجمه وزيادة تركيزه .

---

سؤال : متى يزداد الضغط الإسموزي للسائل ؟

ج : يزداد الضغط الإسموزي للسائل عند زيادة تركيز المواد الذائبة فيه .

---

## الإستجابة المناعية :

- عل لابد من وجود جهاز مناعة في جسم الانسان ؟
  - لأنه يتعرض إلى دخول كثير من الأجسام الغريبة ، لذلك لا بد من وجود جهاز لحماية الجسم من مسببات الأمراض و مقاومتها والقضاء عليها وعلى الخلايا السرطانية والخلايا المصابة بالفيروسات .
  - وكذلك تزويد الجسم بالقدرة على تذكرها إذا دخلت الى الجسم مرة أخرى وذلك عن طريق تكوين خلايا ذاكرة .
- 

- يتكون جهاز المناعة بشكل عام من :

- 1- مجموعة من الحاجز الفيزيائية والكيميائية .
- 2- وخلايا دم بيضاء قادرة على ابتلاع مسببات الأمراض وتحليلها أو منع تكاثرها .

أنواع المناعة : الشكل 2-35 ص 124

- 1- المناعة الطبيعية ( وهي إستجابة مناعية غير متخصصة )
- 2- المناعة المكتسبة ( وهي إستجابة مناعية متخصصة )

A : المناعة الطبيعية غير المتخصصة :

- تعتبر المناعة الطبيعية :

مناعة فطرية حيث أنها تتكون في جسم الإنسان منذ ولادته .  
وهي غير متخصصة لأنها لا تستهدف نوع محدد من مسببات الأمراض ، بل تتصدى لجميع الأجسام الغريبة حال دخولها الى الجسم .

- ومهماها الأساسية : 1- منع دخول مسببات الأمراض الى الجسم .

2- القضاء على مسببات الأمراض فور دخولها الى الجسم .

3- التخلص من الخلايا المصابة بمبسبات الأمراض .

وتشتمل المناعة الطبيعية (المناعة غير المتخصصة) على :-

١ : خط الدفاع الأول : ويتمثل في :

أ ) حاجز الجلد ( حاجز فيزيائي ) : وعندما يكون سليما فإنه يمنع مرور مسببات المرض إلى الجسم .

كما ويفرز الجلد العرق الذي يوفر PH منخفضة وهذا يقلل من نمو الكثير من أنواع البكتيريا على الجلد .

ب ) الأغشية المخاطية ( حاجز فيزيائي ) : تفرز الأغشية المبطنة للقناة الهضمية والقناة التنفسية والجهاز

البولي والتالسي المخاط الذي يمنع دخول مسببات الأمراض إلى خلايا الجسم .

ج ) الإفرازات ( حاجز كيميائي ) : مثل دموع العين واللعاب وتحتوي على إنزيمات تحل الأجسام الغريبة

وتمنعها من الوصول إلى داخل الجسم . كما وأن حمض الهيدروكلوريك ( HCL ) الموجود في المعدة

يقتل الكثير من مسببات الأمراض الموجودة في الطعام .

د) البكتيريا الساكنة طبيعيا في الجسم : هي بكتيريا نافعة توجد على سطح الجلد والقناة الهضمية .

وتعمل على :

- إنتاج مواد قد تقتل البكتيريا الضارة بشكل مباشر .

- إفراز مواد تغير من درجة حرارة الوسط الذي توجد فيه لجعله غير ملائم لعيش البكتيريا الضارة .

- إستنفاد ( إستهلاك ) المواد الغذائية المتوفرة في الوسط الذي توجد فيه ، وبذلك تمنع حصول البكتيريا

الضارة على الغذاء مما قد يؤدي إلى موتها .

ولدي إعلم أن  
الشعر الأبيض الذي على رأس أبيك  
يروي قصه النعيم التي تعيش أنت بها .

## 2 : خط الدفاع الثاني :

عندما تتجاوز بعض مسببات المرض خط الدفاع الأول فإن خط الدفاع الثاني يتصدى لها من خلال :

- أ - خلايا مناعية غير متخصصة .
  - ب - بروتينات وقائية مثل البروتينات المتممة التي تساهم في إتمام عمل الخلايا المناعية حيث تعمل على تحليل مسببات الأمراض التي تدخل إلى الجسم مما يسهل من عملية بلعمتها .
- 

ويكون خط الدفاع الثاني من :-

- أ . الخلايا الدفاعية : وتشتمل على
  - 1- خلايا الدم البيضاء الأكولة : لها القدرة على بلعمة مسببات المرض وتحليلها . ومنها \* الخلايا المتعادلة :

توجد في خلايا الدم وفي الكبد والطحال والرئتين واللوزتين .

وهي خلايا نهمة في إبتلاع مسببات الأمراض البكتيرية .

لكنها لا تعيش مدة طويلة .

\* الخلايا الأكولة الكبيرة :

هي خلايا وحيدة النواة .

وقد توجد حرة تتجلو من نسيج إلى آخر ،

أو مستقرة في أعضاء معينة مثل الطحال والكبد .

2- **الخلايا القاتلة الطبيعية** : خلايا ليمفية غير متخصصة توجد في الطحال والعقد الليمفية ونخاع العظم والدم . ويمكنها تمييز الخلايا المصابة بالفيروسات والخلايا السرطانية وقتلها .

آلية عمل الخلايا القاتلة الطبيعية :- الشكل 2-36 ص 127

- ترتبط الخلية القاتلة الطبيعية مع الخلية المصابة .
  - تفرز مادة كيميائية تدعى بروفورين تعمل على إحداث ثقوب في غشاء الخلية المصابة .
  - كما وتفرز إنزيمات حببية تدخل من خلال الثقوب إلى داخل الخلية المصابة لتحلل بروتيناتها مسببة موتها .
  - ثم تقوم الخلايا الأكولة الكبيرة ببلعمة الخلية الميتة والتخلص منها .
- 

#### ب – البروتينات الوقائية : وتشمل

- 1- **البروتينات المتممة** : ( سبق ذكرها ) .
  - 2- **الإنترفيرونات** :
  - وهي بروتينات تفرزها الخلايا المصابة بالفيروسات .
  - ترتبط هذه البروتينات بالخلايا المجاورة السليمة لتحفظها على إنتاج بروتينات مضادة للفيروسات .
  - تعمل هذه البروتينات على منع تضاعف أعداد الفيروسات المهاجمة .
- 

#### ج - الاستجابة إلا لتهابية : يفرز مسبب المرض و خلايا الجسم المصابة ، مواد كيميائية تعمل على :

- زيادة تدفق الدم نحو المنطقة المصابة .
- زيادة أعداد خلايا الدم البيضاء في المنطقة المصابة .
- جذب الخلايا الأكولة إلى المنطقة المصابة .
- توسيع الأوعية الدموية وزيادة نفاذيتها في المنطقة المصابة .

أعراض الإستجابة الإنهاية :-

- 1- الإحمرار : بسبب توسيع الأوعية الدموية .
  - 2- الإنفاس : بسبب خروج البلازم من الدم .
  - 3- الإحساس بالألم : نتيجة لتهيج النهايات العصبية , وارتفاع درجة حرارة النسج المصابة .
- 

B : المناعة المكتسبة المتخصصة :

- يمكن لبعض مسببات المرض تخطي خط الدفاع الثاني , وعندما يتصدى لها الجسم عن طريق الإستجابة المناعية المكتسبة التي تعتمد على الجهاز الليمفاوي .

علل : الإستجابة المناعية المكتسبة متخصصة؟

- لأنّه يتم إنتاج ( أجسام مضادة ) تتفاعل مع مسبب المرض ( مولد الضد ) الذي سبب إنتاجها دون غيره .
  - يوجد على السطح الخارجي لخلايا جسم الإنسان الكثير من البروتينات التي يرتبط بعضها بمواد سكرية , وبإمكان جهاز المناعة تمييز هذه البروتينات السكرية بوصفها ذاتية ( أي تخصه ) فلا يهاجمها , ولكنه يهاجم البروتينات والأجسام الغريبة بوصفها مولدات ضد .
- 

\* **مولد الضد** : هو المادة أو الجسم الغريب الذي يحفز الإستجابة المناعية المتخصصة من قبل الجهاز المناعي لإحداث الإستجابة المناعية .

- **الجسم المضاد** : هو بروتين تنتجه الخلايا البلازمية إستجابة لوجود مولد ضد معين بهدف تثبيطه .

---

علمتني الحياة أنه :  
في العتمة تستطيع رؤية النجوم

\* مكونات الجهاز الليمفاوي : الشكل 37-2 ص 128

1- **الأوعية الليمفية** : وتعمل على إعادة الزائد من السائل بين خلوي (الليمف) إلى الدورة الدموية .

2- **الأعضاء الليمفية** : وهي نوعان

أ- **الأعضاء الليمفية الرئيسية** : وتشمل

\* **نخاع العظم** : يعمل على تكوين جميع أنواع خلايا الدم والخلايا الليمفية ، وفيه يتم نضج وتمايز الخلايا الليمفية B .

\* **الغدة الزعترية (الثيموسية)** : وفيها يتم نضج وتمايز الخلايا الليمفية T .

ب- **الأعضاء الليمفية الثانوية** : وتشمل

\* **الطحال** : أكبر تجمع للخلايا الليمفية وي العمل على تنقية الدم .

\* **العقد الليمفية** : تحتوي على خلايا ليمفية T و B تهاجم مسببات الأمراض ، وبذلك فهي تعمل على تنقية السائل الليمفي .

.....

خلايا لها دور في المناعة المتخصصة : مثل

أ- **الخلايا الأكولة المشهرة** .

ب- **الخلايا T المساعدة** .

ج- **الخلايا T القاتلة** .

د- **الخلايا الليمفية B** .

## **أ - الخلايا الأكولة المشهورة : انظر الشكل 2-38 ص 129**

هي خلايا أكولة كبيرة تعمل على بلعمة وإشهار مولد الضد الغريب على سطحها . آلية عملها :

- 1- تعمل على بلعمة مولد الضد الغريب ، ثم يتم إتحاد الأجسام الحالة مع الجسم الذي تم بلعنته .
  - 2- تفرز الأجسام الحالة إنزيمات محللة تعمل على تحليل مولد الضد الغريب وتحطيمه إلى أجزاء صغيرة .
  - 3- التخلص من الفضلات الناتجة بوساطة الإخراج الخلوي .
  - 4- إشهار أجزاء من مولد الضد الغريب على سطح الخلية الأكولة .
  - 5- ثم تتحرك الخلايا الأكولة بعد إشهارها لمولد الضد الغريب للبحث عن الخلايا T المساعدة التي تحمل مستقبل خاص ليرتبط بمولد الضد الذي تم إشهاره .
- 

## **ب- الخلايا T المساعدة : انظر الاشكال 2-39 و 2-40 ص 130 و ص 131**

- T المساعدة عبارة عن خلايا ليمفية تساعد على إتمام عمل الخلايا المناعية الأخرى .

- تعد عملية إرتباط الخلايا T المساعدة بمولد الضد الذي تم إشهاره عملية منشطة لعملها .

آلية عملها :

- 1- إرتباط الخلايا T المساعدة بمولد الضد الذي تم إشهاره يحفز الخلايا الأكولة المشهورة على إفراز **السيتيوكاينات** التي تحفز الخلايا T المساعدة على الانقسام والتمايز إلى خلايا T مساعدة نشطة و خلايا T مساعدة ذاكرة .

2- تفرز الخلايا T المساعدة النشطة **سيتيوكاينات** تعمل على :

\* تشفيط الخلايا T القاتلة وتحفيزها على الانقسام والتمايز إلى خلايا T القاتلة نشطة و خلايا T القاتلة ذاكرة .

\* تشفيط الخلايا B وتحفيزها على الانقسام والتمايز إلى خلايا B ذاكرة و خلايا بلازمية تنتج الأجسام المضادة .

**ج - الخلايا T القاتلة :** انظر الشكل 2-41 ص 132

هي خلايا ليمفية تهاجم الخلايا المصابة .

**آلية عملها :**

تتعرف T القاتلة النشطة على مولد الضد الذي تم اشهاره على سطح الخلايا المصابة ، وترتبط معه ثم تفرز :

- بروتينين بروفوريين الذي يحدث ثقب في الغشاء البلازمي للخلية المصابة بالمرض .

- انزيمات حببية خاصة محلله تدخل خلال الثقب تعمل على تحليل بروتينات الخلية المصابة مسببة موتها .

ملاحظة : الاستجابة المناعية الناتجة عن عمل الخلايا الليمفية T تعرف بالاستجابة الخلوية .

---

**د- الخلايا الليمفية B :** انظر الشكل 2-42 ص 133

تعمل السايتوكاينات التي تفرزها T المساعدة النشطة على تنشيط الخلايا B على الإنقسام لتكوين أعداد

كبيرة من خلايا النوع نفسه والتي تتمايز الى خلايا B ذاكرة و خلايا بلازمية تنتج الأجسام المضادة .

ملاحظة : الاستجابة المناعية التي تعتمد على انتاج الأجسام المضادة من الخلايا البلازمية **بالاستجابة السائلة** .

---

تذكر أن : 1- الاستجابة المناعية الناتجة عن عمل الخلايا الليمفية T , تعرف بالاستجابة الخلوية

2- الاستجابة المناعية التي تعتمد على انتاج الأجسام المضادة من الخلايا البلازمية تعرف **بالاستجابة السائلة** .

---

**علل : تمتاز الاستجابة المناعية المكتسبة (المتخصصة) بأنها موجهة ؟**

**الجواب :**

لأنها قادرة على تمييز مولد الضد الغريب فقط . وقدرة على تكوين خلايا ذاكرة تستطيع تمييزه والتعرف

عليه بسرعة اذا دخل الى الجسم مرة ثانية , حيث أنها تتعامل معه على نحو اسرع من تعاملها معه عندما دخل الى الجسم في المرة الأولى .

## ملاحظات : الشكل 2-44 ص 135

- تسمى الإستجابة المناعية عندما يدخل مولد الضد إلى الجسم في المرة لأولى **بالإستجابة المناعية الأولية** ،  
وعندما يدخل مولد الضد إلى الجسم في المرة الثانية تسمى **بالإستجابة المناعية الثانوية** .
  - تركيز الأجسام المضادة في الإستجابة المناعية الثانية يكون أكثر من تركيزها في الإستجابة المناعية الأولية .
  - الإستجابة المناعية الثانية تستغرق وقت أقل لبدء إنتاج الأجسام المضادة ، لأنها تكون قد كونت خلايا ذاكرة تتعرف على مولد الضد الغريب بسرعة .
- 

## إختلالات الجهاز المناعي

### أ - تفاعل الحساسية : الشكل 2-45 ص 136

علل : يعتبر تفاعل الحساسية إختلالاً مناعياً ؟

الجواب : وذلك لأن جهاز المناعة يهاجم مواد غير ضارة تدخل إلى الجسم تعرف بالمواد المسببة للحساسية .  
ومن أمثلتها : حبوب اللقاح ، أبواغ بعض الفطريات ، بعض أنواع الأغذية .

---

### تفاعل الحساسية الأنفية :

- يحدث هذا التفاعل على مرحلتين :

الأولى : عندما يتعرض الشخص لمولد الحساسية أول مرة فإن هذا المولد يرتبط مع الخلايا الليمفية B ،  
فيحفزها على الإنقسام لتكون خلايا بلازمية تنتج كميات كبيرة من أحد أنواع الأجسام المضادة  
المسمى بـ ( IgE ) ، الذي يرتبط بمستقبلات خاصة توجد على الخلايا الصاربة والخلايا  
القاعدية الموجودة في الأنسجة .

**الثانية :** عند تعرض الجسم لمولد الحساسية نفسه مرة اخرى فإنه يرتبط بالجسم المضاد ( IgE ) محفزاً الحبيبات الموجودة داخل الخلايا الصاربة والخلايا القاعدية لتفرز مادة **الهستامين** التي تعمل على :

- أ- توسيع الأوعية الدموية لتصبح أكثر نفاذية للسوائل .
  - ب- احمرار وانتفاخ المنطقة المصابة .
  - ج- زيادة افراز المخاط .
- 

#### **علاج حالات الحساسية :**

يتم ذلك باستخدام ادوية تسمى **مضادات الهستامين** , التي تعمل على ابطاء او منع وصول الهستامين الى الخلايا الهدف مثل **الخلايا المفرزة للمخاط و خلايا الأوعية الدموية** .

---

#### **ب - متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) ( AIDS )**

يسبب هذا المرض فيروس HIV الذي يهاجم الخلايا الليمفية T المساعدة مما يسبب فشل الجهاز المناعي . حيث يتکاثر الفيروس داخل الخلايا T المساعدة المصابة منتجا فيروسوتات جديدة وكثيرة تصيب خلايا T المساعدة اخرى وهكذا حتى يتم القضاء على اغلب خلايا T المساعدة فتصبح اعدادها قليلة جدا ، فتنخفض قدرة الشخص المصاب على مقاومة الأمراض المختلفة .

**علل :** انخفاض قدرة الشخص المصاب بفيروس HIV على مقاومة الأمراض المختلفة .

---

## الرفض المناعي :

علل : عند اجراء عملية نقل عضو او نقل دم يتبرع به شخص لآخر يتم اجراء الكثير من الفحوص لكل من المتبرع والمستقبل .

### الجواب :

للتأكد من أنهم متوافقان مناعيا وذلك تجنباً لحدوث الرفض المناعي او أية مضاعفات في جسم المستقبل

للعضو او الدم المنقول , مما قد يعرض حياة المستقبل للخطر الشديد .

### من الأمثلة على الرفض المناعي عملية نقل الدم :

والجدول التالي يبين فصائل الدم وانواع مولدات الضد والاجسام المضادة حسب نظام ABO :


الجسم المضاد في البلازما	مولد الضد على خلايا الدم الحمراء	فصيلة الدم
Anti - B	A	A
Anti - A	B	B
--	A و B	AB
Anti - A + Anti - B	--	O

### ملاحظات


- يعتمد نظام ABO لفصائل الدم عند الإنسان على وجود او عدم وجود أحد مولدي الضد A أو B أو كلاهما معاً على سطح الغشاء البلازمي لخلايا الدم الحمراء .
- مولدات الضد توجد على سطح الغشاء البلازمي لخلايا الدم الحمراء .
- أما الأجسام المضادة فتوجد في بلازما الدم .
- يقصد بنقل الدمأخذ بعض مكونات الدم أو الدم بكماته من شخص متبرع ، وحقنها في شخص آخر مستقبل .

- الأمور التي يهتم بها الأطباء عند نقل الدم من شخص لآخر؟
- 1- نوع مولد الضد الموجود على سطح خلايا الدم الحمراء لدم المتبرع.
  - 2- نوع الأجسام المضادة في بلازما دم المستقبل.
  - 3- وجود أو عدم وجود العامل الريزيسي .
- 

**ملاحظة :** أثناء نقل الدم من الشخص العاطي إلى الشخص المستقبل يجب أن لا يجتمع مولد ضد دم العاطي مع الجسم المضاد له في دم الشخص المستقبل . فمثلا



والمخطط التالي يوضح عمليات نقل الدم من شخص لآخر:



علل : O معطي عام ؟  
الجواب :

.....  
علل : AB مستقبل عام ؟  
الجواب :

.....  
علل :

1- لا يجوز نقل دم من شخص فصيلة دمه A لآخر فصيلة دمه B.

الإجابة:

عند نقل الدم من شخص فصيلة دمه A لآخر فصيلة دمه B فإن الأجسام المضادة Anti-A في دم المستقبل ترتبط مع مولد الضد A من دم العاطي مما يؤدي إلى : تحل خلايا الدم الحمراء المنقوله ، وارتفاع درجة حرارة المستقبل ، وحدوث ارتعاش في جسمه واحياناً فشل كلوي ، وقد يؤدي ذلك بحياته ان كانت كمية الدم المنقوله كبيرة .

2- لا يجوز نقل دم من شخص فصيلة دمه AB لآخر فصيلة دمه A.

الإجابة:

3- لا يجوز نقل دم من شخص فصيلة دمه A لآخر فصيلة دمه O.

الإجابة:

4- يجوز نقل دم من شخص فصيلة دمه B لآخر فصيلة دمه AB.

الإجابة: لعدم وجود أجسام مضادة في دم المستقبل وبالتالي عدم حدوث تفاعل تختثر.....

5- يجوز نقل دم من شخص فصيلة دمه O لآخر فصيلة دمه A.

الإجابة: لأن دم العاطي (O) لا يحتوي على مولد ضد A أو B، وبالتالي لن يحدث تفاعل تختثر.....

### النظام الريزيسي: Rh

- يقسم أفراد الجنس البشري من حيث وجود مولد الضد الريزيسي أو عدم وجوده في دمهم إلى قسمين:

- موجبوا العامل الريزيسي ( $Rh^+$ ): يحتوي دمهم على مولد الضد D على سطوح خلايا الدم الحمراء .

- سالبوا العامل الريزيسي ( $Rh^-$ ): لا يحتوي دمهم على مولد الضد D ، ويعبر عن عدم وجوده بالرمز d .

\*- سالبوا العامل الريزيسي لا يحتوي دمهم على أجسام مضادة لمولد الضد الريزيسي في الحالة الطبيعية

ولكن الأجسام المضادة Anti-D تتكون في دمهم عندما يتعرضوا لمولد الضد D ( استجابة مناعية ).

\*- لا يجوز نقل دم من شخص موجب العامل الريزيسي ( $Rh^+$ ) إلى شخص سالب العامل الريزيسي ( $Rh^-$ ) حتى لو تشابهت فصائل الدم ولكن يجوز نقل دم من شخص سالب العامل الريزيسي لآخر موجب العامل الريزيسي.

التعليق: لأن دم العاطي ( $Rh^+$ ) يحتوي على مولد الضد D الذي يحتوي دم المستقبل ( $Rh^-$ ) على تكوين أجسام مضادة له Anti-D ، فيحدث تفاعل بين مولد الضد D والأجسام المضادة له Anti-D التي تكونت في دم الشخص المستقبل مما يؤدي إلى تحلل خلايا الدم الحمراء المنقوله ، وهذا قد يهدد حياة الشخص المستقبل.

سؤال : ماذا يحدث عند اجتماع مولد الضد D مع الأجسام المضادة له Anti-D في دم المستقبل ؟

الجواب : يحدث تفاعل بين مولد الضد D والأجسام المضادة له Anti-D مما يؤدي إلى تحلل خلايا الدم الحمراء المنقوله ، وهذا قد يهدد حياة الشخص المستقبل.

سؤال : كم عدد مولدات الضد في كل من :-

	AB+		A+
	AB-		A-
	O+		B+
	O-		B-

سؤال : ضع اشارة ( صح ) عندما يجوز النقل و اشارة ( خطأ ) عندما لا يجوز في الشكل الآتي :

المستقبل

O-	O+	AB-	AB+	B-	B+	A-	A+	المعطى
								A+
								A-
								B+
								B-
								AB+
								AB-
								O+
								O-

لاحظ أن : AB+ يأخذ من الجميع ولا يعطي الا نفسه . أما O- فيعطي الجميع ولا يأخذ الا من نفسه .

علل : لا يجوز نقل دم  $A^+$  الى شخص دمه  $B^-$  ؟

الإجابة

### **الفصل الثالث**

#### \* عمليات في التكاثر وتكوين الجنين عند الانسان \*

- تتم عملية التكاثر في الكائنات الحية بطريقتين هما : 1 - جنسية 2 - لا جنسية .
  - أهمية التكاثر الجنسي : يعتبر التكاثر الجنسي مصدر لتتنوع خصائص الكائنات الحية التي تتکاثر جنسيا .
  - في الانسان يشترك كل من الذكر والانثى في انتاج النسل ، وذلك باتحاد الجاميت الذكري ( n ) مع الجاميت الانثوي ( n ) لتكوين البويضة المخصبة (  $2n = 46$  كروموسوم ) .
  - يتكون الفرد الجديد نتيجة الانقسام المتساوي للبويضة المخصبة ، ونمو الخلايا المتكونة منها وتمايزها .
- 

#### **تكوين الجاميات**

##### **1 : مراحل تكوين الحيوانات المنوية ( الجاميات الذكرية ) :**

- يبدأ تكوين الحيوانات المنوية في الأنبيبات المنوية في الخصيتين عند الوصول إلى مرحلة البلوغ ويستمر مدى الحياة ، وقد تتطابق عملية انتاجها مع تقدم العمر .

##### **المرحلة الأولى :**

##### **مرحلة تضاعف الخلايا التناسلية ونموها .**

- تنقسم الخلايا المنوية الأم (2n) عدة انقسامات متساوية ، لتكوين مخزون كبير منها بوصفها مصدرا للخلايا الجنسية الجديدة ، ثم تدخل في مرحلة النمو والتمايز حيث يزداد حجمها ، وتسمى عندها خلايا منوية أولية (2n)

## المرحلة الثانية :

### مرحلة النضج والتمايز .

- تمر الخلية المنوية الأولية في المرحلة الاولى من الانقسام المنصف ، فتكون خلتين منويتين ثانويتين (ن).
- بعد مرور الخلايا المنوية الثانوية بالمرحلة الثانية من الإنقسام المنصف فإنها تعطي 4 طلائع منوية (ن) .
- تمر الطلائع المنوية بعملية نضج وتمايز حيث أن الهرمون المنشط للجسم الأصفر الذكري ( male LH ) ( تقرزه النخامية الامامية ) يعمل على تحفيز خلايا لایدج ( التي توجد بين الانبيبات المنوية ) لتفرز هرمون تستوستيرون الذي يعمل على تحويل الطلائع المنوية الى حيوانات منوية .

ملاحظة : تفرز خلايا سيرتولي ( وهي خلايا مستطيلة ) افرازات تعمل على

- 1- تزويد الطلائع المنوية بالغذاء اللازم لعملية التمايز .


- 2- دفع الحيوانات المنوية نحو البربخ .

ملاحظة : تستغرق عملية تكوين الحيوانات المنوية مدة تتراوح بين ( 64 – 73 ) يوم .

---

## دور الغدد في نشاط الحيوانات المنوية :

- 1- الحوصلتين المنويتين : تحوي افرازاتها على الفركتوز الذي يزود الحيوانات المنوية بالطاقة اللازمة لحركتها
  - 2- غدة البروستات : تساهم افرازاتها في تسهيل حركة الحيوانات المنوية .
  - 3- غدي كوبر : تعمل افرازاتها على معادلة حموضة الاحليل الناتجة عن بقايا البول ، وبذلك فإنها تساهم فيبقاء الحيوانات المنوية حية .
-



سؤال : عدد أجزاء الحيوان المنوي ؟ انظر الشكل 2 - 48 ب (ص44)

الاجابة :

أ : الرأس : يحتوي في مقدمته على الجسم القمي الذي يفرز إنزيمات تعمل على :-

1- تسهل عملية اختراف الحيوان المنوي لطبقة الخلايا الحوصلية والمنطقة الشفافة المحيطة بالخلية

البيضية الثانوية .

2- تحفيز الخلية البيضية الثانوية على استكمال المرحلة الثانية من الإنقسام المنصف اذا تمت عملية التاقير .

ب : القطعة الوسطى وتحتوي على الميتوكندريا كمصدر للطاقة .

ج : الذيل : الذي يساعد في حركة الحيوان المنوي .

• لاحظ الشكل السابق وأجب عن الأسئلة الآتية :

س1 : أين تتكون الحيوانات المنوية ؟

الاجابة : في الأنبيبات المنوية داخل الخصيتين .

س2 : ما عدد المجموعات الكروموسومية في الخلية المنوية الأم ؟

الاجابة : ثنائية المجموعة الكروموسومية ( 2 ن ) .

س3 : ماذا ينتج عن كل مما يأتي :

أ : الانقسام المتساوي للخلية الأم .

الاجابة : خلايا منوية أولية .

ب : المرحلة الأولى من الانقسام المنصف للخلية المنوية الأولية .

الاجابة : خلية منوية أولية واثنتين ثانويتين .

ج : المرحلة الثانية من الانقسام المنصف للخلية المنوية الثانوية .

الاجابة : طلائع منوية .

س4 : كم عدد الحيوانات المنوية الناتجة من انقسام خلية منوية أولية واحدة ، خلية منوية ثانوية واحدة ؟

الاجابة :

خلية منوية أولية واحدة تعطي 4 حيوانات منوية

خلية منوية ثانوية واحدة تعطي 2 حيوان منوي

## 2 : مراحل تكوين البوopiesات ( الجاميات الأنثوية )

- يبدأ تكوين البوopiesات في المبيضين منذ المراحل الجنينية الأولى للأنثى .

### المرحلة الأولى :

مرحلة تضاعف الخلايا التناسلية ونموها .

- تنقسم **الخلايا التناسلية الأولية** (2n) ( وهي خلايا جذعية غير متمايزة ) في الجنين الأنثوي عدة انقسامات متساوية لتكوين **خلايا بيضية أم** (2n) يزداد عددها بالانقسام المتساوي .

- تنمو بعض **الخلايا البيضية الأم** ويزداد حجمها وتتحول إلى **خلايا بيضية أولية** (2n) تدخل هذه الخلايا في المرحلة الأولى من الانقسام المنصف وتتوقف في الطور التمهيدي الأول حيث أنها تدخل في مرحلة كمون داخل المبيض .

- تبقى **الخلايا البيضية الأولية** في الطور التمهيدي الأول من الانقسام المنصف طيلة فترة الطفولة ولغاية سن البلوغ .

---

### المرحلة الثانية :

مرحلة النضج .

- عند سن البلوغ يكمل عدد من **الخلايا البيضية الأولية** المرحلة الأولى من الانقسام المنصف وذلك بتأثير **الهرمونات الأنثوية** ، فينتج خلتين احدهما خلية كبيرة تسمى **خلية بيضية ثانوية** (n) تدخل المرحلة الثانية من الانقسام المنصف وتتوقف عند الطور الاستوائي الثاني . والأخرى صغيرة الحجم تسمى **الجسم القطبي الأول** (n) الذي ينقسم إلى جسمين قطبيين صغيرين .

- تتم عملية الإباضة في اليوم 14 من الدورة الشهرية للأثني حيث تنتقل الخلية البيضية الثانوية إلى قناة


البيض وهناك حالتين :

أ - اذا لم يتم تلقيحها بحيوان منوي فإنها غالباً تتحلل .

ب- اما اذا تم تلقيحها بحيوان منوي فإن ذلك يؤدي الى تحفظها على استكمال المرحلة الثانية من الإنقسام المنصف لتكوين خلتين احداهما كبيرة الحجم وتسمى **البوبيضة الناضجة (ن)** ، والأخرى صغيرة الحجم وتسمى **جسم قطبي ثانٍ (ن)** .

**علل : الاجسام القطبية تض محل وتتحلل ؟**

لأنها تحتوي على كمية قليلة من السيتوبلازم ، وقلة ما يحويه من مواد غذائية .



\* لاحظ الشكل السابق وأجب عن الأسئلة الآتية : انظر الشكل 2 ص 49-50

س 1 : ما عدد المجموعة الكروموسومية في :

- الخلية البيضية الأم ؟

الإجابة : ثنائية المجموعة الكروموسومية (2n) .

- الخلية البيضية الأولية ؟

الإجابة : ثنائية المجموعة الكروموسومية (2n) .

س 2 : ماذًا ينتج عن كل مما يأتي :

1 : المرحلة الأولى من الانقسام المنصف للخلية البيضية الأم

الإجابة : خلية بيضية ثانوية وجسم قطبي أول .

2 : المرحلة الثانية من الانقسام المنصف للخلية البيضية الأم .

الإجابة : بويضة ناضجة وجسم قطبي ثاني .

س 3 : ما الشرط الواجب توافره حتى تستمل المرحلة الثانية من الانقسام المنصف ؟

الإجابة : التحفيز بعملية تلقيح للخلية البيضية الثانوية بحيوان منوي , بمساعدة إنزيمات الجسم القمي .

س 4 : كم عدد البويضات الناضجة الناتجة من انقسام خلية بيضية أولية ؟

الإجابة : بويضة ناضجة واحدة .

الجدول التالي يبين مقارنة بين عملية تكوين الحيوانات المنوية وعملية تكوين البويلضات .

البويلضات	الحيوانات المنوية	وجه المقارنة
المبيض	الأنبيبات المنوية في الخصية	مكان الإنتاج
في المراحل الجنينية	عند الوصول الى سن البلوغ	وقت بدء الإنتاج
تحتاج	لا تحتاج	الحاجة الى تنبيه لاستكمال المرحلة الثانية من الإنقسام المنصف
تلقيح الخلية البيضية الثانوية بحيوان منوي بمساعدة انزيمات الجسم القمي	- تمر الطلائع المنوية بعملية نضج وتمايز حيث أن الهرمون المنشط للجسم الأصفر الذكري يعمل على تحفيز خلايا لایدج لتفريز هرمون تستوستيرون الذي يعمل على تحويل الطلائع المنوية الى حيوانات منوية . بمساعدة خلايا سيرتولي التي تزودها بالغذاء اللازم لعملية التمايز	كيفية التحول الى جاميات
كل شهر بوبيضة وليس محددة	مستمرة منذ البلوغ الى الوفاة	إستمرارية الإنتاج
بوبيضة واحدة	أربع حيوانات منوية	عدد الجاميات الناتجة عن خلية أولية
يُنتج	لا يُنتج	إنتاج الأجسام القطبية
غير قادرة	قادرة بمساعدة الذيل	القدرة على الحركة ذاتيا
أكبر حجما	أصغر حجما	الحجم
محدود	غير محدود	العدد

## **التغيرات الدورية في نشاط الجهاز التناسلي الأنثوي :**

- تحدث تغيرات دورية وغالباً منتظمة في كل من الرحم والمبيض كل (28-30) يوماً في الأنثى البالغة يتم خلالها تكوين البوopies وتجهيز الرحم للحمل . وتستمر هذه التغيرات طوال فترة الخصوبة الممتدة من سن البلوغ إلى سن الخمسين تقريباً .

وتنتمي هذه التغيرات دورتين هما : **دورة المبيض ، ودورة الرحم .**

**أولاً ) دورة المبيض :** انظر الشكل 2 - 50 ج ( ص148)

وتقسم إلى ثلاثة أطوار هي :

أ- طور الحوصلة      ب- طور الإباضة      ج- طور الجسم الأصفر .

**أ : طور الحوصلة :**

- يعمل الهرمون المنشط للحoscلة (FSH) الذي تفرزه الغدة النخامية الامامية على تحفيز المبيض حيث ينمو حوالي 20 حوصلة أولية كل شهر ، ولكن واحدة منها (الاسرع نمواً) تتضخم في أحد المبيضين كل شهر .

- تفرز الحوصلة الأولية أثناء نموها هرمون الإستروجين الذي يرتفع مستوى ببطء حيث يكون مستواه في هذه المرحلة منخفضاً لذلك فإنه يعمل على تثبيط إفراز الهرمون المنشط للحoscلة (FSH) وذلك لمنع الإفراط في تحفيز المبيضين ونضج أكثر من حوصلة .

---

**ملاحظة :**

من المعروف أن المبيضين لا يعملان معاً ، لكنهما يتبادلان العمل ، فالمبيض الذي ينتج البويبة هذا الشهر ، يكون في الشهر التالي في فترة راحة ، وهكذا .

---

### **ب : طور الإباضة :**

- تحدث الإباضة في اليوم الرابع عشر للدورة تقريباً ، حيث تنطلق الخلية البيضية الثانوية باتجاه قناة البيض ، ويشكل ما تبقى من الحوصلة الجسم الأصفر .
- يحفز ارتفاع مستوى الاستروجين في الدم غدة تحت المهاد لتفرز كميات من الهرمون المحفز لإفراز هرمونات الغدد التناسلية ( GnRH ) مما يؤدي إلى زيادة إفراز الهرمون المنشط للجسم الأصفر الأنثوي من النخامية الإمامية ، حيث يعمل هذا الهرمون على اتمام نضج الحوصلة لتكوين حوصلة غراف .

**ملاحظة :**

يكون أعلى مستوى للهرمون المنشط للحosalة ( FSH ) والهرمون المنشط للجسم الأصفر الأنثوي قبل عملية الإباضة .

---

### **ج : طور الجسم الأصفر:**

- بعد لحظة الإباضة مباشرة وخروج الخلية البيضية الثانوية ، فإن الأجزاء المتبقية من الحوصلة تحول إلى الجسم الأصفر .
  - يفرز الجسم الأصفر كميات كبيرة من هرمون بروجسترون ، وكمية قليلة من هرمون استروجين .
  - يثبط الهرمونين السابقين إفراز الهرمون المنشط للحosalة ( FSH ) لذلك لا تتضخم حوصلة جديدة ما دام الجسم الأصفر نشطاً .
  - إذا لم يتم اخصاب الخلية البيضية الثانوية يقل إفراز الهرمون المنشط للجسم الأصفر الأنثوي فيبدأ الجسم الأصفر بالضمور .
-

**ثانيا ) دورة الرحم :** انظر الشكل 2 - 50 هـ ( ص148)

هي سلسلة من التغيرات الدورية التي تحدث في بطانة الرحم استجابة للتغيرات في مستوى هرموني البروجسترون والاستروجين .

وتقسم دورة الرحم إلى ثلاثة أطوار هي :

أ- طور تدفق الطمث      ب- طور نمو بطانة الرحم      ج- طور الإفراز .

**أ : طور تدفق الطمث :**

- يستمر هذا الطور مدة تتراوح بين 5-7 أيام من بداية الدورة .

في حالة عدم حدوث الحمل :

- يقل افراز الهرمون المنشط للجسم الأصفر الأنثوي ( female LH ) فيبدأ الجسم الأصفر بالضمور ،

فينخفض مستوى هرموني البروجسترون والاستروجين في الدم ، فيحدث اضطراب في بطانة الرحم مما يؤدي إلى موتها ، وانقباض الأوعية الدموية الحلazonية ، فتنقل كمية الدم الواسعة إلى بطانة الرحم ويحتقن فيها الدم ، ثم تنفصل مناطق من الطبقة الوظيفية ( الداخلية ) على صورة قطع يتبعها نزف ، ثم ت镀锌 الغدد محتوياتها من المخاط والانزيمات دافعة البطانة إلى الخارج فيما يسمى بالطمث .

---

**ب : طور نمو بطانة الرحم :**

- يستمر هذا الطور مدة تتراوح بين 7-9 أيام بعد انقطاع الدم في طور تدفق الطمث .

- ثم تحدث زيادة في افراز هرمون الاستروجين فيعمل على بناء بطانة الرحم الداخلية وزيادة سمكها بما تحويه من أوعية دموية وغدد ، وذلك تمهيدا واستعدادا لاستقبال جنين وانزراعة فيما اذا حدث حمل .

---

### ج : طور الإفراز :

- يستمر هذا الطور من مرحلة ما بعد الإباضة مباشرةً إلى نهاية دورة الرحم .
  - يزداد إفراز هرموني البروجسترون والاستروجين من الجسم الأصفر ، حيث يعمل هذان الهرمونان على زيادة سمك بطانة الرحم ، كما ويحفزان عدد الرحم على إفراز مواد مخاطية غنية بالغلايكوجين وذلك للمحافظة على بطانة الرحم وتوفير بيئة مناسبة لنمو الجنين فيما إذا تمت عملية حمل .
- 

### أسئلة هامة :

سؤال 1 : ما التغيرات التي تحصل لأنثى إنسان حامل توقف عندها إفراز هرمون البروجسترون ؟

نتيجةً لإنخفاض مستوى هرمون البروجسترون في الدم ، يحدث اضطراب في بطانة الرحم يؤدي إلى موتها وانقباض الأوعية الدموية الحلزونية ، فتقل كمية الدم الوالصله إلى بطانة الرحم ويحتفظ فيها الدم ، ثم تنفصل مناطق من الطبقة الوظيفية ( الداخلية ) فيحدث الاجهاض .

---

سؤال 2 : علل : لا تتضمن حوصلة جديدة في المبيض ، ما دام الجسم الأصفر نشيطاً .

ج : لأن الجسم الأصفر يستمر في إفراز هرمون البروجسترون وكمية قليلة من هرمون الاستروجين اللذان يبطنان إفراز الهرمون المنشط للحوصلة الأنثوي ، وبالتالي لا تتضمن حوصلة جديدة .

---

سؤال 3 : علل : يعمل هرموني بروجسترون والاستروجين على زيادة سمك بطانة الرحم ، كما ويحفزان عدد الرحم على إفراز مواد مخاطية غنية بالغلايكوجين ؟

ج : وذلك للمحافظة على بطانة الرحم وتوفير بيئة مناسبة لنمو الجنين فيما إذا تمت عملية حمل .

سؤال 4 :

وضح دور كل من هرمون البروجسترون والاستروجين في كل من دورتي المبيض والرحم ؟

1- في طور الجسم الاصفر : يمنع الهرمونان افراز الهرمون المنشط للحوصلة ،

لذا لا تُنضج حوصلة جديدة ما دام الجسم الاصفر نشيطاً .

2- في طور تدفق الطمث : انخفاض نسبة الهرمونين في الدم يؤدي إلى حدوث اضطراب في

بطانة الرحم مما يؤدي إلى موتها تدريجياً وانفصالها وحدوث الطمث .

3- في طور نمو بطانة الرحم : زيادة افراز الاستروجين تؤدي إلى زيادة سمك الطبقة الداخلية لبطانة الرحم .

4- في طور الافراز : زيادة افراز الهرمونين تؤدي إلى زيادة سمك بطانة الرحم ،

وتحفيز الغدد على افراز مواد مخاطية غنية بالغلايكوجين .

---

سؤال 5 :

وضح اثر هرمون الاستروجين في افراز الهرمون المنشط للحوصلة وما اهمية ذلك ؟

ج : عند ارتفاع مستوى الاستروجين في طور الحوصلة فإنه يعمل على تثبيط افراز الهرمون المنشط للحوصلة

واهمية ذلك تكمن في منع الافراط في تحفيز المبيضان وذلك لمنع نضوج اكثر من حوصلة .

---

سؤال 6 :

وضح اثر هرمون الاستروجين في افراز الهرمون المنشط للجسم الاصفر الأنثوي . وما اهمية ذلك ؟

ج : يحفز ارتفاع مستوى الاستروجين في الدم غدة تحت المهاد لتفرز كميات من الهرمون المحفز لافراز

هرمونات الغدد التناسلية ( GnRH ) مما يؤدي إلى زيادة افراز الهرمون المنشط للجسم الاصفر الانثوي من

النخامية الامامية ، حيث يعمل هذا الهرمون على اتمام نضج الحوصلة لتكوين حوصلة غراف .

**تنظيم النسل : والهدف من المباعدة بين الأحمال هو :**

- 1- تقليل اعباء الحمل على الأم , والمحافظة على صحتها .
  - 2- الحفاظ على صحة المواليد بحيث ينالون حقهم في الرضاعة الطبيعية , والرعاية الضرورية صحيا واجتماعيا ونفسيا .
- 

**وسائل تنظيم النسل ومن أهمها :**

**1- الوسائل الطبيعية :**

مثل الرضاعة الطبيعية التي غالباً تمنع عملية الحمل , وهذه الطريقة لا تؤثر في صحة الأم ولا يوجد لها أية مضاعفات جانبية .

---

**2- الوسائل الميكانيكية :**

ومن امثلتها : أ- العازل الذكري      ب- الواقي الانثوي .

حيث يعملان على منع وصول الحيوانات المنوية إلى الخلية البيضية الثانوية .

ج - اللولب ( يتكون من مواد خاملة غير قابلة للتفاعل ) .

يزرع اللولب داخل الرحم فيمنع انزراع الكبسولة البلاستولية في بطانة الرحم .

---

**3- الوسائل الهرمونية :**

ولها اشكال وتركيبات عددة تعمل على منع الحمل حيث تعمل على :-

أ- تثبيط افراز الهرمونات المنشطة لحوصلات المبيض وبالتالي عدم نضج خلايا بيضية ثانوية مما يؤدي إلى عدم حدوث الإباضة .

ب- زيادة لزوجة المادة المخاطية في عنق الرحم مما يعيق دخول الحيوانات المنوية إلى الرحم .

ومن الامثلة على الوسائل الهرمونية :

- أ- حبوب منع الحمل : التي تمتاز بفاعليتها الفائقة في منع الحمل اذا اخذت بانتظام ، وهي نوعان : 1- حبوب منع الحمل المركبة وتحتوي على هرموني البروجسترون والاستروجين . 2- حبوب منع الحمل المصغرة وتحتوي على هرمون البروجسترون فقط .
- ب- حقن منع الحمل : تحتوي على البروجسترون وتعطى بإشراف طبي ، وفاعليتها تستمر 3 اشهر .
- ج- الكبسولات الصغيرة التي تزرع تحت الجلد : تحتوي على البروجسترون ، وفاعليتها تستمرة 5 سنوات .
- د- لصقات منع الحمل : تحتوي على البروجسترون والاستروجين ، وتفرز كل يوم جرعة محددة من الهرمونين ، وتدوم كل لصقة مدة 7 ايام تقريبا .

سؤال :

صنف وسائل الحمل الآتية الى هرمونية , طبيعية , ميكانيكية :

- ارضاع الطفل طبيعيا ..... طبيعية  
- تناول حبوب منع الحمل ..... هرمونية  
- استخدام اللولب ..... ميكانيكية  
- وضع لصقات منع الحمل ..... هرمونية

ابا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا  
بأننا نورد الرأيات بيضا ونصرهن حمرا قد روينا  
إذا بلغ الطعام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدينا  
عمرو بن كلثوم

## \* تقنيات في عمليتي الإخصاب والحمل \*

يعالج كثير من حالات العقم حالياً بتقنيات متنوعة منها ما يأتي :

### 1) التقنية التقليدية للإخصاب الخارجي (أطفال الأنابيب) :

سؤال : اذكر الحالات التي تستخدم فيها هذه التقنية ؟ يمكن استخدام هذه التقنية عند :

أ : إنسداد قناتي الببış أو تلفهما .

ب : الضعف المتوسط للحيوانات المنوية .

ج : حالات عدم الحمل غير معروفة السبب .

---

سؤال : كيف تتم هذه التقنية ؟

1 : ينشط المبيضان لإنتاج العدد الكافي من الخلايا البيضية الثانوية ، والتقاطها بإستخدام منظار خاص .

2 : تحضير الخلايا البيضية الثانوية والحيوانات المنوية وتقديمها ، ثم توضع في اطباق خاصة داخل حاضنة مدة تتراوح بين ( 24-72 ) ساعة لتنتمي عملية الإخصاب وتكون الأجنة .

3 : تنقل الأجنة الناتجة إلى رحم الأم في اليوم الثاني او الثالث من سحب الخلايا البيضية الثانوية .

---

### 2) الحقن المجهرى للخلية البيضية الثانوية :

- تتم هذه الطريقة بإستخدام حيوان منوي واحد فقط . ( وهذا ما يميزها )

الطريقة : - يتم إدخال رأس حيوان منوي واحد أو احدى الطلائع المنوية إلى داخل الخلية البيضية الثانوية بوساطة إبرة مجهرية خاصة متصلة بمجهر ذي قوة تكبيرية عالية ، ثم تتم إعادة الأجنة الناتجة إلى رحم الأم .

- يتم اللجوء لمثل هذه التقنية في حالة الضعف الشديد في الحيوانات المنوية .

---

### (3) استخلاص الحيوانات المنوية من الخصية أو البربخ :

متى يتم اللجوء الى هذه التقنية ؟

الإجابة : في حال عدم وجود حيوانات منوية في السائل المنوي , الناتج عن انسداد الوعاء الناقل للحيوانات المنوية بسبب الالتهابات . حيث يتم الحصول على الحيوانات المنوية بسحبها من البربخ او الخصية بوساطة ابرة رفيعة , ثم يتم حقنها مجهريا في الخلية البيضية الثانية .

---

### (4) التشخيص الوراثي للأجنحة :

ويتم اللجوء الى هذه التقنية لتشخيص اسباب حدوث الاجهاض المتكرر للأجنحة بسبب وجود طفرات وراثية , وذلك بفحص الأجنحة ومعرفة فيما اذا كانت حاملة لمرض وراثي ما .

---

سؤال :

ما اهمية فحص كل من الخلايا البيضية الثانية و الحيوانات المنوية المستخدمة في تقنية الاخشاب الخارجي ؟

ج- للتأكد من سلامتها وراثياً تجنبًا لحدوث اختلالات وراثية عند الأجنحة .

سؤال :

قارن بين التقنية التقليدية للاخشاب الخارجي وتقنية الحقن المجهرى للبوopies من حيث الاجراءات .

ج - شرح كل طريقة على حدا .

اي التقنيتين السابقتين يفضل استخدامها بعد سحب الحيوانات المنوية من الخصية ؟

ج - لأن عدد الحيوانات المنوية المسحوب يكون عادة قليل , لذلك يفضل استخدام تقنية الحقن المجهرى , وذلك للتأكد من اختراق الحيوان المنوي للخلية البيضية الثانية لضمان حدوث عملية الاخشاب .

---

انتهت بحمد الله