


بسم الله الرحمن الرحيم



الجمهورية الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
إدارة الإحصائيات والإعلام
قسم الإحصائيات العامة



امتحان شهادة الدراسات الثانوية العامة لعام ٢٠١٨ / الدورة الشتوية

(وثيقة محمية/محدودة) $\frac{د}{س}$

المبحث : الرياضيات / المستوى الرابع+الرياضيات الإضافية (نفس الورقة الامتحانية) مدة الامتحان : ٣٠ : ١
الفرع : الأدبي والشرعي والإدارة المعلوماتية والتعليم الصحي+الصناعي والفندقي والسياحي اليوم والتاريخ : الاثنين ٢٠١٨/٠١/٠٨

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٥) ، علماً بأن عدد الصفحات (٤) .
السؤال الأول : (١٧ علامة)

أ) يتكون هذا الفرع من فقرتين من نوع الاختيار من متعدد، يلي كل فقرة (٤) بدائل، واحد منها فقط صحيح، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة وبجانبه رمز البديل الصحيح لها: (٤ علامات)

(١) إذا كان ق اقتراناً متصلًا، وكان $\left[\begin{matrix} ق(س) دس = س^3 + س^2 \\ فإن ق(س) تساوي: \end{matrix} \right.$

(أ) $س^3 + س^2$ (ب) $س^3 + س^2$ (ج) $س^6 + ٢$ (د) $س^٦$

(٢) إذا كان ق اقتراناً متصلًا، وكان $\left[\begin{matrix} ٢ ق(س) دس = ٦ ، فإن ق(س) دس يساوي: \\ ٢- \end{matrix} \right.$

(أ) $٣-$ (ب) ٣ (ج) $٦-$ (د) ٦

ب) جد التكاملات الآتية:

(١) $\left[\begin{matrix} ٢ هـ - س + س^٦ - ٥ + \frac{١}{س} \\ دس \end{matrix} \right]$ (٤ علامات)

(٢) $\left[\begin{matrix} س^٢ جا(س^٣ + ٧) دس \end{matrix} \right]$ (٤ علامات)

(ج) إذا كان $\left[\begin{matrix} ق(س) دس = ٨ ، ق(س) دس = ١٥ ، \\ ١ ٣ \end{matrix} \right]$ (٥ علامات)


فجد $\left[\begin{matrix} ق(س) دس. \\ ١ ٣ \end{matrix} \right]$

يتبع الصفحة الثانية ،،،،،

الصفحة الثانيةالسؤال الثاني: (١٤ علامة)

أ) يتكون هذا الفرع من فترتين من نوع الاختيار من متعدد، يلي كل فقرة (٤) بدائل، واحد منها فقط صحيح، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة وجانبه رمز البديل الصحيح لها:

١) معتمدًا الشكل المجاور الذي يمثل منحنى الاقتران ق(س)،



إذا كان $\int_0^3 C(S) dS = 3$ ، $\int_0^5 C(S) dS = -5$ ،

فما قيمة $\int_0^1 C(S) dS$:

(أ) -٢ (ب) ٨ (ج) ٢ (د) -٨

٢) قيمة: $\int_8^{24} 4 dS$ يساوي:

(أ) ٢٤ (ب) -٢٤ (ج) صفر (د) -١٦

ب) إذا كان ميل المماس لمنحنى الاقتران ق(س) عند النقطة (س، ص) يساوي $3س + ٤$ ، فجد قاعدة الاقتران ق، علمًا بأن منحناه يمر بالنقطة (١، ٥).

ج) جد مساحة المنطقة المغلقة المحصورة بين منحنىي الاقترانين: ق(س) = $3س^2$ ، ه(س) = $٦س$

(٥ علامات)

السؤال الثالث: (١٩ علامة)

أ) إذا كان اقتران (السعر - الطلب) لمنتج معين هو $ع = ق(س) = ٢٠ - ٢س$ ، حيث (ع) السعر بالدينارين، (س) عدد الوحدات المنتجة، وكان السعر ثابتًا عند $ع = ١٠$ ، فجد قيمة فائض المستهلك. (٦ علامات)

ب) تتحرك نقطة مادية في خط مستقيم بتسارع ثابت مقدارته $١٤ م/ث^2$ ، جد سرعتها بعد مرور ثانيتين من بدء الحركة، علمًا بأن سرعتها الابتدائية $ع(٠) = ٥ م/ث$.

(٥ علامات)

يتبع الصفحة الثالثة /،،،،

الصفحة الثانية

ج) يتكون هذا الفرع من (٤) فقرات من نوع الاختيار من متعدد، يلي كل فقرة (٤) بدائل، واحد منها فقط صحيح، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة وبجانبه رمز البديل الصحيح لها:

(٨ علامات)

(١) بكم طريقة يمكن اختيار رئيس ونائب الرئيس من مجموعة تتكون من ٥ أفراد؟

- (أ) ١٥ (ب) $\binom{5}{2}$ (ج) $(5, 2)$ (د) 15×14

(٢) قيمة: $\binom{5}{3}$ تساوي:

- (أ) $\frac{!(3-5)}{13}$ (ب) $\frac{!3 \times !(3-5)}{!5}$ (ج) $\frac{!(3, 5)}{!5}$ (د) $\frac{!(3, 5)}{!3}$

(٣) إذا كان التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي (ع) معطى بالمجموعة الآتية:

$\{(0, 2, 0), (0, 4, 1), (2, 2, 0)\}$ ، فما قيمة الثابت ب؟

- (أ) ٠,٠٤ (ب) ٠,٤ (ج) ٠,٦ (د) ٠,٠٦

(٤) معتمداً شكل الانتشار المجاور الذي يبين العلاقة بين

المتغيرين س ، ص ، ما قيمة معامل الارتباط (ر)

بين المتغيرين س ، ص ؟



- (أ) ١ (ب) ١- (ج) ٠,١- (د) ٠,١

السؤال الرابع: (١٦ علامة)

أ) حل المعادلة الآتية:

$(3, n) = 5 \times (2, n) \times \left(\frac{4}{3}\right)$ ، حيث ن عدد صحيح موجب. (٥ علامات)

ب) بكم طريقة يمكن اختيار (٤) معلمين وطالبين اثنين لتشكيل لجنة من بين (٦) معلمين و (٩) طلاب؟

(٥ علامات)

ج) إذا كان س متغيراً عشوائياً ذا الحدين، معاملاته $n = 2$ ، $\mu = 0,9$ ، فاكتب جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير

العشوائي س . (٦ علامات)

يتبع الصفحة الرابعة / ،،،،

الصفحة الرابعةالسؤال الخامس: (١٤ علامة)

أ) إذا كانت أوزان ١٠٠٠٠ طالب تتخذ شكل التوزيع الطبيعي بوسط حسابي (٥٠) كغ، وانحراف معياري (٦) ، فما عدد الطلبة الذين تتحصر أوزانهم بين (٤٧) كغ و (٥٦) كغ؟ (٨ علامات)
ملاحظة: يمكنك الاستفادة من الجدول الآتي والذي يُمثل جزءاً من جدول التوزيع الطبيعي المعياري.

ز	٠	٠,٥	١	١,٥	٢
ل (ز ≥ ١)	٠,٥٠٠٠	٠,٦٩١٥	٠,٨٤١٣	٠,٩٣٣٢	٠,٩٧٧٢

ب) إذا كان س ، ص متغيرين عدد قيم كل منهما (٦) ، وكان $\sum_{k=1}^6 (س_k - \bar{س})(ص_k - \bar{ص}) = ١٢$ ،
 $\sum_{k=1}^6 (س_k - \bar{س})^2 = ٩$ ، $\sum_{k=1}^6 (ص_k - \bar{ص})^2 = ١٦$ ، فاحسب معامل ارتباط بيرسون الخطي (ر) بين المتغيرين س ، ص . (٣ علامات)

تم تحميل هذا الملف من موقع الأوائل التعليمي

www.awa2el.net

ج) إذا كانت معادلة الانحدار الخطي البسيط للعلاقة بين معامل الذكاء (س) ومعدل التحصيل (ص) هي:
ص = ١,٤ س - ٨١ ، فتنبأ بالمعدل التحصيلي لطالب معامل ذكائه ١١٠ (٣ علامات)

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

صفحة رقم (١)

المبحث: الرياضيات / المستوى الرابع + الرياضيات الإضافية (نفس لورقة)
 الفرع: الأدبي والشرعي والإدارة المعلوماتية والتعليم (لصانعي ولقنن في الرياضيات)
 مدة الامتحان: ٣٠ دقيقة
 التاريخ: ٨ / ١ / ٢٠١٨

رقم الصفحة
 في الكتاب

الإجابة النموذجية:

السؤال الأول: (٧ علامة)

١٥٢

رقم الفترة	١	٢
من الإجابة	٥	٩
الإجابة	٦٥	٣٠

٥ ٥

١٣٧

(١) $\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right)$
 $= \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^5} + \frac{1}{x^6} + \frac{1}{x^5} + \frac{1}{x^6} + \frac{1}{x^7} + \frac{1}{x^6} + \frac{1}{x^7} + \frac{1}{x^8}$
 $= \frac{1}{x^4} + \frac{2}{x^5} + \frac{2}{x^6} + \frac{2}{x^7} + \frac{1}{x^8}$

١٥٩

١٦١

(٢) $\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right)$
 نفرض $x = \frac{1}{t}$
 $\frac{1}{x} = t$
 $\frac{1}{x^2} = t^2$
 $\frac{1}{x^3} = t^3$
 $\left(t + t^2 + t^3 \right) \cdot \left(t + t^2 + t^3 \right)$
 $= t^2 + t^3 + t^4 + t^3 + t^4 + t^5 + t^4 + t^5 + t^6$
 $= t^2 + 2t^3 + 2t^4 + 2t^5 + t^6$

١٥٣

١٥٥

(٣) $\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right)$
 $= \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^5} + \frac{1}{x^6} + \frac{1}{x^5} + \frac{1}{x^6} + \frac{1}{x^7} + \frac{1}{x^6} + \frac{1}{x^7} + \frac{1}{x^8}$
 $= \frac{1}{x^4} + \frac{2}{x^5} + \frac{2}{x^6} + \frac{2}{x^7} + \frac{1}{x^8}$
 $= \frac{1}{x^4} + \frac{2}{x^5} + \frac{2}{x^6} + \frac{2}{x^7} + \frac{1}{x^8}$
 $= \frac{1}{x^4} + \frac{2}{x^5} + \frac{2}{x^6} + \frac{2}{x^7} + \frac{1}{x^8}$

السؤال الثاني: (١٤ علامة)

رقم الصفحة في الكتاب		٢	٣	(٢)
١٤٥		٢	١	رقم الفقرة
١٧٠		ب	٢	رمز الإجابة
		٢٤-	٢-	الإجابة

ب) قد $(س) = ٣ - س (س + ٤)$ ①
 ١٤١ $س (س) = س (س + ٤) - ٣ = س (س + ٤) - ٣$ ①
 $س (س) = س (س + ٤) - ٣$ ①

١٨١ $س (س) = س (س + ٤) - ٣$ ①
 لكن النقطة (٥، ١) تقع على القطر الآخر من أي أنه

١ $٥ = (١) س$ ①
 $٥ = س (١) = س (١) + ٤ - ٣ = س (١) + ١ - ٣ = س (١) - ٢$ ①
 $٥ = س (١) - ٢$ ① إذن $س (س) = س (س) + ٤ - ٣ = س (س) + ١ - ٣ = س (س) - ٢$ ①

١٦٨ $س (س) = س (س) + ٤ - ٣ = س (س) + ١ - ٣ = س (س) - ٢$ ①

١٦٩ $س (س) = س (س) + ٤ - ٣ = س (س) + ١ - ٣ = س (س) - ٢$ ①
 $س (س) = س (س) + ٤ - ٣ = س (س) + ١ - ٣ = س (س) - ٢$ ①

① $س (س) = س (س) + ٤ - ٣ = س (س) + ١ - ٣ = س (س) - ٢$ ①

① $س (س) = س (س) + ٤ - ٣ = س (س) + ١ - ٣ = س (س) - ٢$ ①

① $س (س) = س (س) + ٤ - ٣ = س (س) + ١ - ٣ = س (س) - ٢$ ①

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثالث : (١٩ علامة)

١٧٤

$$٥) ع = ح (س) = ٢٠ - ٢٠٠ = ١٠٠ \text{ ع} = ١٠$$

للإيجاد س، (لمبة التوازن)

$$٦) بضع ع = ١٠ \leftarrow ١٠ = ٢٠ - ٢٠٠ = ١٠٠$$

$$① ٥ = ١٠ - ٢٠٠ = ١٠٠ - ٢٠٠ = ١٠٠$$

$$① \text{ خاضع المستطيل فنل } = \left\{ \begin{array}{l} ١٠٠ - ٢٠٠ = ١٠٠ \\ ١٠٠ - ٢٠٠ = ١٠٠ \end{array} \right.$$

$$\text{فنل} = \left\{ \begin{array}{l} ١٠٠ - ٢٠٠ = ١٠٠ \\ ١٠٠ - ٢٠٠ = ١٠٠ \end{array} \right.$$

$$① ٥٠ - (٠ - ٠) - (٠ - ٠) = ٥٠ - ٠ - ٠ = ٥٠$$

$$٢٥ = ٥٠ - ٧٥ = ٥٠ - ٢٥ - ١٠٠ = ٢٥ \text{ ديناراً}$$

١٤٢

$$٥) د (س) = ١٤ \text{ م / ث}$$

$$① ع (ن) = \left\{ \begin{array}{l} ١٤ \text{ م / ث} \\ ١٤ \text{ م / ث} \end{array} \right.$$

$$① ١٤ \text{ م / ث} = ١٤ \text{ م / ث} + ٠ = ١٤ \text{ م / ث}$$

$$\text{لكن ع (٠) = ٠ = ١٤ + ٠ \times ١٤ = ١٤}$$

$$\text{اذن ع (ن) = ١٤ + ٠ = ١٤}$$

$$\text{ومنه ع (٢) = ١٤ + ٢ \times ١٤ = ٤٢ = ٤٢ \text{ م / ث}}$$

(٨)

٢٠٣	٤	٣	٢	١	متر المربعة	٨
١٩٩	٩	٦	٥	٤	متر المربعة	
٢٠٦	١	٤	٣ (٣٠٥)	٢ (٢٠٥)	الاجابة	
٢٣٢	٢	٢	٢	٢		

• • •

① $CC = NA$

9

①

$$54. = 37 \times 10 =$$

⑤



11

ΔΙΣ

①

س	م	ا	ع
ل (س)	ا. م	ا. ا	ا. ع

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الخامس : (٤٤ علامة)

٢٢٤

(٢) احتمال أن ينحصر الوزن بينه (٤٧) كغ و (٥٦) كغ يساوي :

٢٢٥

① ② ③

$$P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56)$$

$$= P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56)$$

①

$$P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56)$$

$$= P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56)$$

$$= P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56)$$

①

$$= P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56)$$

اذن عدد الطلبة الذين تنحصر اوزانهم بين

(٤٧) كغ و (٥٦) كغ يساوي

$$\text{العدد الذي لا احتمال} = 0.328 \times 1000 = 328 \text{ طالباً}$$

٢٣١

①

$$P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56)$$

$$= P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56)$$

①

$$= \frac{12}{17 \times 9} = \frac{12}{153} = \frac{4}{51}$$

٢٣٩

$$P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56)$$

①

$$= P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56)$$

$$= P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56) = P(47 \leq x \leq 56)$$

①

①