



بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة التربية والتعليم  
إدارة الإحصائيات والإعلاميات  
قسم الإحصائيات العامة



## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٨ / الدورة الشتوية

(وثيقة محمية/محمود)  
مدة الامتحان : ٢ : ٠٠ : ٠٠

المبحث : الكيمياء

الفرع : العلمي والزراعي والاقتصاد المنزلي (مسار الجامعات) اليوم والتاريخ: الخميس ٢٠١٨/٠١/١١

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٥)، علماً بأن عدد الصفحات (٤).

السؤال الأول: (٣١ علامة)

أ) يُبين الجدول المجاور أربعة محاليل لحموض ضعيفة افتراضية بتركيز متساوية (١) مول/لتر ومعلومات عنها، (نو٢ = ٣,٠،  $K_w = 10^{-14}$ ) ادرسه ثم أجب عن الأسئلة الآتية: (١٤ علامة)

المعلومات	الحمض
$[A^-] = 2 \times 10^{-4}$ مول/لتر	HA
pH = ٤	HB
$K_a = 5,0 \times 10^{-4}$	HC
$K_a = 6 \times 10^{-6}$	HD

١- أي الحموض هو الأضعف؟

٢- ما صيغة القاعدة المرافقة للأضعف؟

٣- اكتب معادلة تفاعل HA مع القاعدة (D<sup>-</sup>) ثم حدّد

الأزواج المترافقة من الحمض والقاعدة.

٤- احسب قيمة pH للحمض HA.

٥- احسب قيمة  $K_a$  للحمض HB.

٦- أي المحاليل يكون فيه تركيز OH<sup>-</sup> أقل ما يمكن؟

ب) فسّر التأثير القاعدي لمحلول الملح NaCN .

ج) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والإجابة الصحيحة لها:

١- إحدى الآتية تُعد مادة أمفوتيرية:

أ) HCOO<sup>-</sup> (ب) SO<sub>3</sub><sup>2-</sup> (ج) HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> (د) CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub><sup>+</sup>

٢- إحدى الآتية تسلك سلوكاً حمضياً وفق مفهوم لويس فقط:

أ) NH<sub>4</sub><sup>+</sup> (ب) OH<sup>-</sup> (ج) NF<sub>3</sub> (د) Ni<sup>2+</sup>

٣- إذا أراد مزارع الحصول على أزهار نبات القرطاسيا بلون أزرق فإنه:

أ) يستخدم تربة حمضية (ب) يُضيف كربونات الكالسيوم للتربة

ج) يستخدم تربة قاعدية (د) يزيد الرقم الهيدروجيني للتربة

د) اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية: (٤ علامات)

١- قدرة أيونات الملح على التفاعل مع الماء وإنتاج أيونات H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> أو OH<sup>-</sup> أو كليهما.

٢- المحلول الذي يحتوي على حمض ضعيف وأحد أملاحه من قاعدة قوية.

هـ) فسّر آلية عمل الدم كمحلول منظم عند زيادة تركيز أيونات H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>. (٣ علامات)

يتبع الصفحة الثانية/،،،،،

الصفحة الثانيةالسؤال الثاني: (٢٩ علامة)

أ ( محلول منظم حجمه (١) لتر يتكوّن من القاعدة  $C_5H_5N$  وملحها  $C_5H_5NHBr$  لهما نفس التركيز (٠,٣) مول/لتر، فإذا علمت أن  $K_b = 2 \times 10^{-9}$ ، أجب عن الأسئلة الآتية: (٧ علامات)

١- ما صيغة الأيون المشترك؟

٢- احسب تركيز  $H_3O^+$  عند إضافة (٠,٢) مول  $HCl$  إلى لتر من المحلول (أهمل تغيّر الحجم).  
ب) وازن المعادلة الآتية بطريقة نصف التفاعل في وسط قاعدي، وما العامل المؤكسد في التفاعل: (١٢ علامة)



ج) يُستخدم سخّان الطعام عديم اللهب في تسخين الوجبات الجاهزة لرواد الفضاء، اكتب المعادلة التي توضح مبدأ عمله. (علمان)

د ( خلية تحليل كهربائي تحتوي مصهور  $MgCl_2$  فإذا علمت أن قيم جهود الاختزال المعيارية  $(Mg^{2+} = -2,37$  فولت ،  $Cl_2 = 1,36$  فولت ) أجب عن الأسئلة الآتية: (٨ علامات)

١- اكتب معادلة نصف التفاعل / المصعد.

٢- اكتب معادلة نصف التفاعل / المهبط.

٣- ما مقدار جهد البطارية اللازم لحدوث التفاعل؟

٤- ما شحنة قطب المصعد في الخلية؟

السؤال الثالث: (٣٠ علامة)

أ ( يُبين الجدول المجاور بيانات للخلايا الغلفانية لفلزات افتراضية (A ، B ، C) بالإضافة إلى قطب الهيدروجين المعياري  $H_2$  والذي قيمة جهد اختزاله (صفر). ادرسه ثم أجب عن الأسئلة التي تليه: (١٦ علامة)

١- حدّد العامل المختزل الأقوى.

٢- حدّد اتجاه حركة الإلكترونات في الخلية رقم (٤).

٣- أي القطبين تقل كتلته في الخلية الغلفانية رقم (١)؟

٤- أيّ الفلزات لا يُحرّر غاز  $H_2$  عند وضعه في محلول

$HCl$  المخفف؟

٥- أيّ الوعائين (B أم C) يمكن حفظ محلول أحد

أملاح (A) فيه؟

٦- حدّد الفلزين اللذين يكوّنان خلية غلفانية لها أقل فرق جهد.

٧- ما قيمة جهد الخلية رقم (٥)؟

٨- أيّ القطبين هو المصعد في الخلية المكونة من قطبي (C ، B)؟

رقم الخلية	الخلية الغلفانية	جهد الخلية $E^\circ$ (فولت)	المهبط
١	A - B	٠,٧٨	B
٢	A - C	١,٢٢	A
٣	$H_2 - A$	٠,٤٤	$H_2$
٤	$H_2 - B$	؟	؟
٥	B - C	؟	؟

يتبع الصفحة الثالثة/،،،،

الصفحة الثالثة

(٤ علامات)

(ب) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والإجابة الصحيحة لها:

١- عدد تأكسد الأكسجين ( -١ ) يكون في المركب :

( أ )  $F_2O$       ( ب )  $Cl_2O$       ( ج )  $H_2O_2$       ( د )  $MgO$

٢- إحدى الآتية يُعتبر الأيون الرئيس في تحضير الأدوية التي تعالج أمراض الغدة الدرقية:

( أ )  $K^+$       ( ب )  $I_3^-$       ( ج )  $I_2$       ( د )  $I^-$

(١٠ علامات)

(ج) يُبين الجدول المجاور بيانات التفاعل الافتراضي الآتي عند درجة حرارة معينة:

نواتج  $A + B + C \longrightarrow$  ، ادرسه جيداً ثم أجب عن الأسئلة الآتية:

١- ما رتبة التفاعل للمادة (A) ؟

٢- ما رتبة التفاعل للمادة (B) ؟

٣- ما رتبة التفاعل للمادة (C) ؟

٤- اكتب قانون السرعة لهذا التفاعل.

٥- احسب قيمة ثابت سرعة التفاعل (k) ؟

رقم التجربة	[A] مول/لتر	[B] مول/لتر	[C] مول/لتر	السرعة الابتدائية للتفاعل مول/لتر.ث
١	٠,١	٠,٠٢	٠,١	$10^{-2}$
٢	٠,١	٠,٠٤	٠,١	$10^{-4}$
٣	٠,٢	٠,٠٢	٠,١	$10^{-8}$
٤	٠,٢	٠,٠٢	٠,٢	$10^{-8}$

تم تحميل هذا الملف من موقع الأوائل التعليمي

السؤال الرابع: (٣٠ علامة)

( أ ) في تفاعل افتراضي كانت طاقة وضع المواد الناتجة (٢٠) كيلوجول، وطاقة تنشيط التفاعل الأمامي بوجود

العامل المساعد (١٥) كيلوجول، وطاقة وضع المعقد المنشط (١٥٠) كيلوجول، وعند استخدام عامل مساعد

انخفضت قيمة طاقة المعقد المنشط بمقدار (٢٥) كيلوجول. أجب عن الأسئلة الآتية: (١٤ علامة)

١- ما قيمة طاقة وضع المواد المتفاعلة ؟

٢- ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود العامل المساعد ؟

٣- ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بدون العامل المساعد ؟

٤- ما قيمة طاقة التنشيط للتفاعل الأمامي بدون العامل المساعد ؟

٥- ما التغير في المحتوى الحراري للتفاعل (  $H\Delta$  ) ؟

٦- هل التفاعل ماص أم طارد للحرارة ؟

٧- إذا كانت كتلة العامل المساعد عند بدء التفاعل (٢) غ، ما كتلته عند نهاية التفاعل ؟

يتبع الصفحة الرابعة/،،،،

الصفحة الرابعة

(ب) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والإجابة الصحيحة لها: (٦ علامات)

١- تعمل الانزيمات في أجسام الكائنات الحية على :

- ( أ ) خفض طاقة وضع المتفاعلات  
 ( ب ) زيادة طاقة وضع المتفاعلات  
 ( ج ) زيادة طاقة التنشيط للتعاملات  
 ( د ) خفض طاقة التنشيط للتعاملات

٢- إذا كان معدل سرعة استهلاك A في التفاعل الافتراضي  $3A \rightarrow B + 2C$  يساوي (٠,٦٠) مول/لتر.ث فإن معدل سرعة إنتاج C (مول/لتر.ث) يساوي:

- ( أ ) ٠,٤٠ ( ب ) ٠,٦٠ ( ج ) ٠,٨٠ ( د ) ٠,٢٠

٣- إذا كانت قيمة ثابت سرعة تفاعل عند درجة حرارة ما (٠,١) لتر/مول.ث ، فإن رتبة التفاعل:

- ( أ ) ١ ( ب ) ٢ ( ج ) ٣ ( د ) ٤

(ج) أكمل المعادلات الآتية وذلك بكتابة الناتج العضوي فقط: (١٠ علامات)

- 1-  $CH_2=CH_2 + Br_2 \xrightarrow{CCl_4}$   
 2-  $CH_3CH_2CHBrCH_2CH_3 + KOH \xrightarrow{\text{تسخين}}$   
 3-  $CH_3CH_2OH \xrightarrow{PCC}$   
 4-  $CH_3CH_2NH_2 + HBr \xrightarrow{\quad}$   
 5-  $CH_3CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{\text{ضوء}}$

السؤال الخامس: (٣٠ علامة)

( أ ) يتم الكشف مخبرياً عن البروبانال  $CH_3CH_2CHO$  باستخدام محلول تولينز:


١- ما المواد التي يتكوّن منها محلول تولينز؟

٢- اكتب معادلة كيميائية تُبين التفاعل الحادث.

(ب) علّل: تتميز الالكينات بقدرتها على القيام بتفاعلات الإضافة. (علّمان)

(ج) باستخدام المركّب العضوي  $CH_3C(=O)OCH_2CH_2CH_3$  وأية مواد غير عضوية اكتب معادلات

(١١ علامة) كيميائية تُبين تحضير المركبات الآتية:



( د ) ما وحدة البناء الأساسية في كل من:

- ١- الأميلوز      ٢- السليلوز      ٣- السكروز      ٤- الدهون

(هـ) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والإجابة الصحيحة لها: (٤ علامات)

١- سلسلة بروتين تحتوي (١٢) رابطة ببتيدية، فإن عدد الحموض الأمينية في السلسلة :

- ( أ ) ١٤ ( ب ) ١٣ ( ج ) ١٢ ( د ) ١١

٢- عدد روابط سيغما  $\sigma$  في المركّب  $CH_3CH=CH_2$  هو:

- ( أ ) ٦ ( ب ) ٧ ( ج ) ٨ ( د ) ٩

﴿ انتهت الأسئلة ﴾



الإجابة النموذجية

صفحة رقم (١).

مدة الامتحان:  $\frac{٤}{١٧}$   
 التاريخ: ١١/١/٢٠١٨

المبحث: الكيمياء  
 الفرع: اعصاب + المرسين (ماد الحامضات) الزراني الاقتصادي المركزي

الإجابة النموذجية:

رقم الصفحة في الكتاب	العلاصة	السؤال الأول (العلاصة)
٤٨	٢	١- HB
٤٨	٢	٢- $C^-$
٤٨	٤	٣- $HA + D^- \rightleftharpoons HD + A^-$
		٤- $pH = -\log[H_3O^+]$
١	١	$3 \times 10^{-4} \times 0.1 = [H_3O^+] = [A^-]$
١	١	$pH = -\log 3 \times 10^{-4} = 3.5 = 3 - 0.5$
١	١	٥- $[H_3O^+] = 1 \times 10^{-4}$ مول/لتر
١	١	$K_a = (1 \times 10^{-4})^2 / 0.1 = 10^{-8}$
	٢	٦- HC
٣٧	٤	٧- الملح في الماء يتفكك $Na^+$ و $CN^-$
١	١	$Na^+$ لا يتفاعل مع الماء ويتفكك في المحلول على شكل أيونات، فلا يؤثر في تركيز $H_3O^+$ أو $OH^-$ .
		$CN^-$ تتفاعل مع الماء فتقوم بقبول بروتون $H^+$ لتتفاعل مع الماء لتشكل $H_2CN$ و $OH^-$ فتزيد تركيز $OH^-$ فيزيد $pH$ المحلول وتزيد قايديته و يصبغ $pH$ الكبريتون ل.
١٣	٢	٨- ا. ج. أو $(HCO_3^-)$
١٥	٢	٩- ا. د. أو $(Ni^{2+})$
٤٩	٢	١٠- ا. د. (استخدمت في العلاصة)

رقم الصفحة في الكتاب	العلاصة	نماذج السؤال الأول
٣٦	٢	١- اذ الـ $\text{HCO}_3^-$
٤٤	٢	٢- اذ الـ $\text{HCO}_3^-$ ينظم $\text{pH}$ الدم
٥١	٣	٣- زيادة تركيز $\text{HCO}_3^-$ في الدم يتفاعل مع الأيون $\text{H}^+$ <sup>١</sup> فيتكون الحمض $\text{H}_2\text{CO}_3$ <sup>١</sup> والذي يتفكك في الرئتين مكوناً الماء وثاني أكسيد الكربون <sup>١</sup> الذي يتم التخلص منه عن طريق نفاذ التنفس (الرئتين)

رقم الصفحة في الكتاب	العلامة	السؤال الثاني (٢٩ علامة)
٤٤	٢	٢) $C_5H_5NH^+$
٤٧	٢	٢) $[HCl + OH^-] [OH^-] = K_b$
٤٩	٢	٢) $\frac{[HCl + OH^-] [OH^-]}{[HCl - القاعدة]} = K_b$
	٢	١) $(2.5 + 2.3) [OH^-] = 9 \times 10^{-5}$
	٢	١) $(2.5 - 2.3)$
	٢	١) $\frac{10^{-10} \times 6 = 10^{-10} \times 5}{0} = [OH^-]$
	١	١) $\frac{10^{-10} \times 10}{10^{-10} \times 2} = [H_3O^+]$
٧٥	٣	٢) $4H_2O + Zn \rightarrow Zn(OH)_4^{2-} + 4H^+ + 2e^-$
٧٧	٣	١) $8e^- + 9H^+ + NO_3^- \rightarrow NH_3 + 3H_2O$
	١	١) $4e^-$ العامل المؤكسد
	٢	٢) $2OH^- + 13H_2O + 4Zn + NO_3^- \rightarrow 4Zn(OH)_4^{2-} + NH_3 + 2H^+ + 2OH^-$
	١	١) $2OH^- + 6H_2O + 4Zn + NO_3^- \rightarrow 4Zn(OH)_4^{2-} + NH_3$
٧٨	٢	٢) العامل المؤكسد $NO_3^-$
٧٧	٢	٢) $Mg + 2H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 + H_2 + 2e^-$
٩٦	٢	٢) $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$
٩٧	٢	٢) $Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$
	٢	٣) أكبر سرعة ٣، ١، ٣ فوالد
	٢	٤) سرعة ٣، ١، ٣

رقم الصفحة في الكتاب	العلامة	السؤال الثالث (٣٠ علامة)
٨١-	٢	Ⓐ د ج
٩٥	٢	١- ا ب
	٢	٣- تقار كلاً A
	٢	٤- B
	٢	٥- B
	٢	٦- A و B
	٢	٧- $E^0 = E^0$ قولي
	٢	٨- C
٦١	٢	Ⓐ د (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )
١٠١	٢	١ ب (I <sub>3</sub> <sup>-</sup> )
١١٨-	٢	Ⓐ ا ب ج د = A
١٢٤	٢	١ ا ب = B
	٢	٣ ا ب ج = C
	٢	٤ سرعة التفاعل = $[B]^2 [A] K$
	٢	$1 \times 10^{-1} = \frac{5 \times 10^{-1} \times 5 \times 10^{-1}}{4 \times 10^{-1} \times 5}$

رقم الصفحة في الكتاب	العلاوة	السؤال الرابع (3.3 علاوة)
132	٢	١. 11 كيلوجول (3)
134	٢	٢. 1.5 كيلوجول
134	٢	٣. 13 كيلوجول
	٢	٤. 6 كيلوجول
	٢	٥. 9 كيلوجول
	٢	٦. طارد
	٢	٧. ٤ غ (لا تتغير)
	٢	٨. ٤ (مفضل طافه، لا يتغير)
	٢	٩. ٤ (٤ ر)
	٢	١٠. ٤ (٤ ر)
158	٢	1) $\text{CH}_2\text{Br}-\text{CH}_2\text{Br}$ (4)
160	٢	2) $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_3$
162	٢	3) $\text{CH}_3\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{H}$
167	٢	4) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2\text{Br}$
167	٢	5) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$

