



الكيمياء

الصف العاشر - كتاب الأنشطة والتجارب العملية

الفصل الدراسي الثاني

10

فريق التأليف

موسى عطا الله الطراونة (رئيساً)

تيسير عبد المالك الصبيحات

بلال فارس محمود

إضافة إلى جهود فريق التأليف، فقد جاء هذا الكتاب ثمرة جهود وطنية مشتركة من لجان مراجعة وتقدير علمية وتربوية ولغوية، ومجموعات مركزة من المعلّمين والمشرفين التربويين، وملحوظات مجتمعية من وسائل التواصل الاجتماعي، وإسهامات أساسية دقيقة من اللجنة الاستشارية والمجلس التنفيذي والمجلس الأعلى في المركز، ومجلس التربية والتعليم ولجانه المتخصصة.

الناشر

المركز الوطني لتطوير المناهج

يس المرکز الوطّاني لتطویر المناهج، وزارۃ التربية والتعلیم - إدارة المناهج والكتب المدرسية، استقبال آرائكم وملحوظاتکم على هذا الكتاب

عن طریق العناوین الآتیة: هاتف: 4617304-5/8، فاکس: 4637569، ص. ب: 1930، الرمز البريدي: 11118،

أو بوساطة البريد الإلكتروني: scientific.division@moe.gov.jo

قرّرت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (7/2020)، تاريخ 1/12/2020 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (2020/172) تاريخ 17/12/2020 م بدءاً من العام الدراسي 2020 / 2021 م.



© Harper Collins Publishers Limited 2020.

-Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

-Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

ISBN: 978 - 9923 - 41 - 048 - 6

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
(2020/8/2984)

373,19

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

الكيمياء: كتاب التمارين (الصف العاشر) / المركز الوطني لتطوير المناهج. - عمان: المركز ، 2020

ج 2(26) ص.

ر.إ.: 2020/8/2984

الواصفات: / الكيمياء / / العلوم الطبيعية / / التعليم الإعدادي / / المناهج /

يتتحمل المؤلف كامل المسؤلية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise , without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

م 1442 هـ - 2020

الطبعة الأولى (التجريبية)

قائمة المحتويات



AWA2EL
LEARN 2 BE

رقم الصفحة	الموضوع
	الوحدة الرابعة: التفاعلات والحسابات الكيميائية
4	تجربة استهلالية: المعادلة الكيميائية الموزونة
6	تجربة: تفاعل الاتحاد
8	تجربة: تفاعل التحلل
10	تجربة: تفاعل الإحلال الأحادي
12	تجربة إثرائية: النسبة المئوية بالكتلة لعنصر في مركب
14	محاكاة لأسئلة الاختبارات الدولية
	الوحدة الخامسة: الطاقة الكيميائية
15	تجربة استهلالية: الطاقة المرافقة للتفاعل
17	تجربة: التفاعل الطارد والتفاعل الماصل للطاقة
20	تجربة: قياس الحرارة النوعية للنحاس
22	تجربة إثرائية: حرارة التعادل
25	محاكاة لأسئلة الاختبارات الدولية

تجربة استهلاكية

المعادلة الكيميائية الموزونة

الخلفية العلمية:

عند وصف التفاعل الكيميائي فإنه يجب معرفة أنواع المواد المتفاعلة والنتاج وحالاتها الفيزيائية، وكذلك معرفة صيغها الكيميائية، وعدد مولاتها والنسب التي تتفاعل بها، والشروط الالزامية أثناء التفاعل، مثل: الضغط، ودرجة الحرارة، والعوامل المحفزة للتفاعل. ولهذا يلخص الكيميائيون إلى التعبير عن التفاعلات بصورة وصفية وكمية عن طريق المعادلة الموزونة التي تعد الركيزة الأولى للحسابات الكيميائية.

الهدف:

التعبير عن التفاعل بمعادلة كيميائية موزونة

المواد والأدوات:

محلول نترات الرصاص (II) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ ، محلول يوديد البوتاسيوم (KI)، ميزان حساس، مخبر مدرج، كأسان زجاجيتان سعة كل منها (100ml).

إرشادات السلامة:

أحذر عند التعامل مع الأدوات الزجاجية والمواد الكيميائية، وأرتدي القفازات والنظارات الواقية، ومعطف المختبر.

خطوات العمل:

1. أضع كأسين زجاجيتين على الميزان الحساس، وأضبطه للحصول على قراءة مؤشر صفر.



2. أقيس: أضع (10ml) من محلول يوديد البوتاسيوم في إحدى الكأسين، وأضع (10ml) من محلول نترات الرصاص في الكأس الآخر. ثم أسجل قراءة الميزان.

3. لاحظ. أضيف محتويات الكأس الأولى إلى الكأس الثانية، وأبقي الكأسين على الميزان. ماذا يحصل؟ أسجل قراءة الميزان.

4. أنظف مكان عملي وأغسل يديّ جيداً بعد الانتهاء من العمل.



التحليلُ والاستنتاجُ:

1. أقارنُ التغييرُ في قراءةِ الميزانِ قبلَ خلطِ المادتينِ وبعدَها.

2. ألاحظُ ما الذي أرشدَني إلى حدوثِ التفاعلِ؟

3. أعبرُ عن التفاعلِ الحاصلِ بمعادلةٍ كيميائيةٍ موزونةٍ متضمنًا الحالةَ الفيزيائيةَ للموادِ المتفاعلةِ والناتجةِ.

التجربة ١

الخلفية العلمية:

عندما يتفاعل عنصر مع عنصر، أو مركب مع مركب، أو عنصر مع مركب يتكون عادةً مركب جديد، ويسمى هذا النوع من التفاعلات تفاعلات الاتحاد. لهذه التفاعلات أهمية في تحضير كثير من المركبات الكيميائية. ويمكن التعبير عن هذه التفاعلات كما يأتي: $(\text{عنصر} + \text{عنصر}) \rightarrow \text{مركب}$ ، أو $(\text{مركب} + \text{مركب}) \rightarrow \text{مركب}$



الهدف:

تعرّفُ تفاعلِ الاتحاد.

المواد والأدوات:

برادة الحديد (Fe)، مسحوق الكبريت ، جفنة تسخين، لهب بنسن، ملعة، ميزان حساس، منصب ثلاثي، مغناطيس.

إرشادات السلامة:

أحذر عند التعامل مع اللهب. أرتدي معطف المختبر، وألبس القفازين، وأضع النظارات الواقية.



خطوات العمل:

- أزن (6g) من برادة الحديد و (3g) من الكبريت وأخلطهما معًا في جفنة التسخين.
- أقرب طرف المغناطيس من الخليط، وألاحظ: أي المادتين تنجدب إليه؟
- أضع المادتين مرة أخرى في الجفنة، وأخلطهما خلطًا جيدًا، وأسخن الجفنة على اللهب أربع دقائق، ثم أترك الجفنة حتى تبرد، وألاحظ التغير الحاصل.
- أقرب طرف المغناطيس من المادة الموجودة في الجفنة، وألاحظ: هل تنجدب إليه؟
- الاحظ وأسجل ملاحظاتي.





التحليلُ والاستنتاجُ:

1. أصفُ التغييرُ الذي حدثَ على كُلٍّ منَ الحديدِ والكبيريتِ بعدَ تسخينِ مخلوطِهما.




2. أكتبُ معادلةً كيميائيةً موزونةً للتفاعلِ.


التجربة 2

الخلفية العلمية:

عندما يتحلل مركب واحد بالحرارة أو الكهرباء فإنه تتجزء مادتان أو أكثر على شكل عناصر أو مركبات، ومن الأمثلة على هذه التفاعلات تحلل كربونات الفلزات بالحرارة؛ ما يؤدي إلى تكوين أكسيد الفلز وغاز ثاني أكسيد الكربون، كما يأتي:



وكذلك تحلل كربونات الفلز الهيدروجينية بالحرارة منتجةً كربونات الفلز وغاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، كما يأتي:



الهدف:

تعرّفُ تفاعل التحلل.

المواد والأدوات:



هيدروكسيد النحاس₍₂₎ (Cu(OH)₂)، جفنة تسخين، لهب بنسن، ملعقة، منصب ثلاثي.

إرشادات السلامة:



- أحذر عند التعامل مع اللهب.

- أرتدي معطف المختبر، وألبس القفازين، وأضع النظارات الواقية.

خطوات العمل:



- أضع ملعقةً من هيدروكسيد النحاس في الجفنة.
- أسخن الجفنة على اللهب خمس دقائق، ثم أترك الجفنة حتى تبرد.
- لاحظ التغيير الذي حدث على هيدروكسيد النحاس، ثم أسجل ملاحظاتي.



التحليلُ والاستنتاجُ:

1. أصفُ التغييرُ الذي حدثَ على المادِةِ المتفاعلةِ قبلَ التسخينِ وبعدهُ.



2. أكتبُ معادلةً كيميائيةً موزونةً للتفاعلِ.

التجربة 3

الخلفية العلمية:

تعتمد هذه التفاعلات على النشاط الكيميائي للعناصر، حيث يحل فيها عنصر نشط محل عنصر آخر أقل نشاطاً منه في أحد محليل أملاكه. ومن التطبيقات العملية على هذه التفاعلات استخلاص بعض العناصر من محليلها، ومن الأمثلة الشائعة تحضير غاز الهيدروجين في المختبر كـ ما في معاذه التفاعل الآتي:



الهدف:

تعرّف تفاعلاً إلحاقياً.

المواد والأدوات:

كبريتات النحاس ($\text{CuSO}_4(\text{II})$)، ماء مقطر، كأس زجاجية بسعة (250 ml)، ملعقة، صفيحة خارصين، سلك نحاسي.

إرشادات السلامة:

أرتدي معطف المختبر، وألبس القفازين، وأضع النظارات الواقية.



خطوات العمل:

- أضع ملعقة من كبريتات النحاس في الكأس الزجاجية، وأضيف إليها (30 ml) من الماء المقطر، ثم أحرك الخليط جيداً حتى يذوب تماماً.
- أغمس صفيحة الخارصين في محلول من خمس دقائق إلى عشر دقائق.
- الاحظ التغير الذي حدث على صفيحة الخارصين والمحلول، وأسجل ملاحظاتي.





التحليلُ والاستنتاجُ:

1. ماذا حدثَ للونِ صفيحةِ الخارصينِ ولوِنِ المحلولِ في الكأسِ الزجاجيَّةِ؟



2. أكتب معاَدلةً كيميائيَّةً موزونةً لتفاعلٍ.

تجربة اثرائية

النسبة المئوية بالكتلة لعنصر في مركب

الخلفية العلمية:

يحاول العلماء تعرّف تركيب المواد وتحديد صيغها الكيميائية، وذلك بتحليل المواد إلى مكوناتها الأساسية لمعرفة العناصر الداخلة في تركيبها، وكذلك لمعرفة الصيغة الجزئية للمركب من خلال معرفة النسب المئوية الكتلة.



الهدف:

حساب النسبة المئوية لمكونات أكسيد المغنيسيوم.

المواد والأدوات:



جفنة تسخين مع غطائهما، شبكة تسخين، منصب ثلاثي، ملقط خشبي، لهب بنسن، ميزان حساس، شريط مغنيسيوم، ماء، ورق صنفرة.

إرشادات السلامة:



أحذر عند التعامل مع اللهب.



خطوات العمل:

- أقيس: أزن كتلة الجفنة وغطائها.
- أقيس: أنظر شريط المغنيسيوم بورق الصنفرة، ثم أزن (6g) منه.
- أضع كتلة المغنيسيوم في الجفنة، ثم أضعها وغطائها على شبكة التسخين.
- أسخن بشدة لمدة 10 دقائق حتى تشتعل جميع كتلة المغنيسيوم. وألاحظ التغيير الحادث.
- أقيس: أترك الجفنة جانبا حتى تبرد، ثم أزبها بما فيها وغطائها. (m_1)
- أنظم البيانات في الجدول الآتي:

كتلة الأكسجين في المركب الناتج $m_2 - 6g$	كتلة المركب الناتج $m_1 - 6g = m_2$	كتلة الجفنة بعد التسخين m_1	كتلة المغنيسيوم	كتلة الجفنة وغطائها
			6 g	



التحليلُ والاستنتاجُ:



1. أصفُ التغييرُ الحادثَ على شريطِ المغنيسيومِ بعدَ التسخينِ.

2. أتوقعُ الصيغةَ الكيميائيةَ للمركبِ الناتجِ.




3. أكتبُ معادلةً كيميائيةً موزونةً للتفاعلِ.

4. أحسبُ النسبةَ المئويةَ بالكتلةِ لكلٍّ من عنصريِّ المغنيسيومِ والأكسجينِ في المركبِ.

محاكاة لأسئلة الاختبارات الدولية



السؤال الأول:

أتوقع التفاعلات الواردة في النماذج الآتية وأفسرُها:



السؤال الثاني:

أفسرُ قانونَ حفظِ الكتلةِ منْ خلالِ التفاعلِ الآتي:



السؤال الثالث:

يحتوي الهواءُ الذي يدخلُ حجرةً محرِّكِ السيارةِ على الكثيرِ منَ الغازاتِ وبخارِ الوقودِ، وكذلكَ يُحدِثُ الاحتراقَ داخِلَ المحركِ.

أ - ما اسمُ الغازِ الذي يتفاعلُ معَ بخارِ الوقودِ لتكوينِ غازٍ ثانٍ أكسيدِ الكربونِ؟

ب - ما اسمُ الغازاتِ التي تتفاعلُ لتكوينِ غازٍ أكسيدِ النيتروجينِ؟

تجربة استهلاكية

الطاقةُ المرافقَةُ لِلتفاعلِ

الخلفيةُ العلميَّةُ:

عندَ حدوثِ التفاعلاتِ الكيميائيَّة تحدثُ تغييراتٌ في تركيبِ الموادِ؛ حيثُ تتكسرُ روابطُ و تتكونُ روابطٌ جديدةٌ لتكوينِ موادٍ تختلفُ في تركيَّتها و خصائصها عنِ الموادِ التي نتجتْ عنها، ويرافقُ ذلكَ امتصاصُ الموادِ للطاقةِ عندَ تكسيرِ الروابطِ بينَ ذراتِها، وابعاثُ للطاقةِ عندَ تكوينِ الروابطِ في الموادِ الجديدةِ، وهذا يعني أنَّ التفاعلَ الكيميائيَّ يرافقُ حدوثَ تغييراتٍ في الطاقةِ ملازمةً للتغييراتِ الكيميائيَّةِ التي تطرأُ على تركيبِ الموادِ، لذاً، يعتقدُ كثيرونَ منَ العلماءِ أنَّ التفاعلاتِ الكيميائيَّةَ تُعدُّ منَ المصادرِ الأساسيةِ للطاقةِ في الكونِ؛ إذ إنَّ كلَّ تفاعلٍ لابدَّ أنْ يصاحبهُ ابتعاثُ للطاقةِ أو امتصاصٌ لها.

الهدفُ:

استكشافُ الطاقةِ المرافقَةِ لإذابةِ الحمضِ في الماءِ.

الموادُ والأدواتُ:


كأسٌ زجاجيَّةٌ، ميزانٌ حراريٌّ، مخبرانِ مدرجانِ، ماءٌ مقطرٌ، محلولٌ حمضِ الكبريتيكِ المركزِ (H_2SO_4) تركيزهُ (96 %).

إرشاداتُ السلامةُ:

- أتبعُ إرشاداتِ السلامةِ العامةِ في المختبرِ.
- أرتدي معطفَ المختبرِ والنظاراتِ الواقيةِ والقفازاتِ.
- أحذرُ منْ تذوقِ محلولِ حمضِ الكبريتيكِ المركزِ، أو لمسِهِ بيديَّ.

خطواتُ العملِ:

1. أقيسُ: أضعُ في الكأسِ الزجاجيَّةِ (20 ml) منَ الماءِ المقطرِ باستخدامِ المخبرِ المدرجِ. وأقيسُ درجةَ حرارتهِ، وأسجلُها.
2. أقيسُ: أضعُ (5 ml) منْ محلولِ حمضِ الكبريتيكِ المركزِ في المخبرِ المدرجِ. وأقيسُ درجةَ حرارتهِ، وأسجلُها.
3. أضيفُ ببطءٍ محلولَ حمضِ الكبريتيكِ المركزَ إلى الكأسِ الزجاجيَّةِ المحتويةِ على الماءِ المقطرِ، وأحركُ محلولَ ببطءٍ.



4. أقيسْ: انتظرْ دقيقةً ثُمَّ أقيسْ درجة حرارة محلولِ الجديد، وأسجلها.

5. الاحظْ درجة حرارة الماء بعد إضافة محلول حمضِ الكبريتيك: هل ارتفعتْ أم انخفضتْ؟



6. أنظمُ البياناتِ والقياساتِ في جدولٍ:

النوعِ في درجة حرارة الماء	درجة حرارة الماء بعد إضافة الحمضِ	درجة حرارة الماء قبل إضافة الحمضِ

التحليلُ والاستنتاجُ:

1. أصفُ التغييرَ الذي يحدثُ لدرجة حرارة الماء بعد إضافة محلول حمضِ الكبريتيك.


2. ماذا أستنتجُ؟

التجربة 1

التفاعلُ الطارِدُ والتفاعلُ الماَصُ للطاقة

الخلفية العلمية:

يهتمُّ الكيميائيون بدراسة تغيرات الطاقة التي ترافق حدوث التفاعلات؛ ذلك أنها تُعدُّ جزءاً أساسياً من التغيرات التي تحدث خلال التفاعلات الكيميائية، حيث تتبادل الموادُ الطاقة مع الوسط المحيط؛ ما يسبب تغييراً في درجة حرارة الوسط، فعند امتصاص الموادُ المتفاعلة كميةً من الطاقة أكبر من تلك المنشعة عن تكوين المواد الناتجة، ويكون المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة أقل من الحراري للمواد الناتجة؛ الأمر الذي يسبب انخفاضاً في درجة حرارة الوسط المحيط، ويوصف التفاعل عندئذ بأنه ماصٌ للطاقة.



بينما عندما تكون الطاقة المنشعة عن تكوين المواد الناتجة أكبر من الطاقة الممتصة عند تكسير الروابط بين ذرات المواد المتفاعلة، فإن المحتوى الحراري للمواد الناتجة يكون أقل من المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الوسط المحيط، ويوصف التفاعل بأنه طارد للطاقة.

الهدف:

تمييز التفاعل الماَص للطاقة، والتفاعل طارد لها.

المواد والأدوات:

ثلاث كؤوس زجاجية، ميزان حرارة، ملعقة، ميزان حساس، قضيب زجاجي، مخبر مدرج، محلول حمض الهيدروكلوريك (HCl) تركيزه (0.5 mol\l)، هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) تركيزه (0.5 mol\l)، بلورات كلوريد الأمونيوم (NH_4Cl)، شريط من المغنسيوم (2cm)، ماء مقطر.



إرشادات السلامة:

- أتبع إرشادات السلامة العامة في المختبر.

- أرتدي معطف المختبر والنظارات الواقية والقفازات.

- أحذر من تذوق محلول حمض الهيدروكلوريك (HCl)، أو استنشاق بخاره.

- أحذر من لمس محلول هيدروكسيد الصوديوم أو كلوريد الأمونيوم أو تذوق أيٌّ منهما.



خطوات العمل:


1. أقيس: أضع في الكأس الأولى (20ml) من محلول حمض الهيدروكلوريك باستخدام المخارِ المدرج. وأقيس درجة حرارة محلول في الكأس، وأسجلها.

2. أقيس: أضيف شريطاً من المغنيسيوم طوله (2cm)، أحرك محلول بيطرء، وأقيس درجة حرارته، وأسجلها.

3. الاحظ درجة حرارة محلول بعد إضافة شريط المغنيسيوم؛ هل ارتفعت أم انخفضت؟

4. أقيس: أضع في الكأس الثانية (20ml) من الماء باستخدام المخارِ المدرج. وأقيس درجة حرارة الماء، وأسجلها.

انخفاض درجة حرارة محلول



ارتفاع درجة حرارة محلول





5. أزن: باستخدام الميزان الحساس أزن (5g) من كلوريد الأمونيوم، وأضيفها إلى الكأس، وأحرك المحلول ببطء، وأقيس درجة حرارة المحلول، وأسجلها.

6. ألاحظ درجة حرارة الماء بعد إضافة كلوريد الأمونيوم؛ هل ارتفعت أم انخفضت؟

7. أقيس: أضع في الكأس الثالثة (20ml) من محلول حمض الهيدروكلوريك باستخدام المطبخ، وأقيس درجة حرارته وأسجلها.

8. أقيس: أضيف إلى الكأس (20ml) من محلول هيدروكسيد الصوديوم، وأحرك المحلول ببطء، وأقيس درجة حرارته وأسجلها.

9. ألاحظ درجة حرارة المحلول بعد إضافة هيدروكسيد الصوديوم؛ هل ارتفعت أم انخفضت؟

10. أنظم البيانات والقياسات في جدول.



التحليل والاستنتاج:

1. أصف التغيير الذي يحدث لدرجة حرارة محلول حمض الهيدروكلوريك بعد تفاعله مع شريط المعنيسيوم. ماذا أستنتج؟

2. أصف التغيير الذي يحدث لدرجة حرارة الماء بعد إضافة كلوريد الأمونيوم. ماذا أستنتج؟

3. أصف التغيير الذي يحدث لدرجة حرارة محلول حمض الهيدروكلوريك بعد إضافة هيدروكسيد الصوديوم. ماذا أستنتج؟

4. أفسر التغيير الذي يحصل على درجة الحرارة في كل حالة.

التجربة 2

قياس الحرارة النوعية للنحاس

الخلفية العلمية:

تُعرَّفُ الحرارة النوعية للمادة بأنَّها: كمية الحرارة اللازمَة لرفع درجة حرارة غرام واحدٍ من المادة درجةً سيليزيَّةً واحدةً، ويمكن تعرِيفُها بأنَّها السعة الحراريَّة لغرام واحدٍ من المادة، ووحدة قياسها (C°). ويُستفاد منها في معرفة مدى تأثُّرِ المادة بالحرارة ومقارنتها بموادٍ أخرى؛ حيث إنَّ كلَّما زادت الحرارة النوعية للمادة قلَّ تأثُّرُها بالحرارة، إذ يمكن للمادة أنْ تمتص كمياتٍ كبيرةٍ من الحرارة دون أنْ تزداد درجة حرارتها بشكلٍ ملحوظٍ، مثل الماء السائل، وكلَّما قلَّت الحرارة النوعية فإنَّ امتصاص المادة لكمياتٍ قليلةٍ من الحرارة يؤدي إلى ازدياد ملحوظٍ في درجة حرارتها، يتضخَّ ذلك من الانخفاض الملحوظ في الحرارة النوعية للفلزات، مثل: النحاس والحديد والألمنيوم؛ مقارنةً بالحرارة النوعية للماء السائل.

الهدف:

قياس الحرارة النوعية للنحاس.

المواد والأدوات:

كأسان زجاجيتان بسعة (300 ml)، كأس بوليسترین، ميزان حرارة كحولي، ماسكٌ معدني (ملقط)، ميزان حساسٌ، ماءٌ مقطرٌ، كرة نحاسية، منصبٌ، لهبٌ بنسن أو سخانٌ كهربائيٌّ.

إرشادات السلامة:

أحذر من لمس الكأس الساخنة أو الكرة النحاسية الساخنة بيديك، أو الإمساك بهما مباشرةً.

خطوات العمل:

- أزن الكرة النحاسية باستخدام الميزان الحساس، وأسجل كتلتها.
- أضيف إلى الكأس الزجاجية (100 ml) من الماء، وأضيف إليها الكرة النحاسية، وأضعُها على اللهب أو السخان الكهربائي.
- أقيس: أضيف إلى كأس البوليسترین (100 ml) من الماء، وأضعُها في الكأس الزجاجية الفارغة، وأقيس درجة حرارة الماء (t_1) وأسجلها.
- الاحظ غليان الماء في الكأس، وعندَها أقيس درجة حرارة الماء والكرة النحاسية (t_2)، وأسجلها.



5. أستخرج الكرة النحاسية من الماء باستخدام الملقط، وأضعُها في كأس البوليسترين، وأسجل أعلى درجة حرارة يصل إليها الماء (t_3).

6. **الاحظ:** هل ارتفعت درجة حرارة الماء بعد وضع الكرة النحاسية فيه؟ أم انخفضت؟

7. أنظم البيانات والقياسات في جدول.



AWA2EL
LEARN 2 BE

المعلومات

	كتلة الكرة الفلزية
	درجة حرارة الماء الساخن مع الكرة النحاسية (t_2)
	درجة حرارة الماء في كأس البوليسترين (t_1)
	درجة حرارة الماء في كأس البوليسترين مع الكرة النحاسية (t_3)

التحليل والاستنتاج:

1. أحدد التغيير في درجة حرارة الماء في كأس البوليسترين بعد إضافة الكرة النحاسية إليه. ماذا أستنتج؟

.....

2. أحدد التغيير في درجة حرارة الكرة النحاسية بعد وضعها في كأس البوليسترين؟ ماذا أستنتج؟

.....

3. أبين العلاقة بين كمية الحرارة في الحالتين السابقتين.

.....

4. أستنتج الحرارة النوعية للنحاس.

.....

5. أقارن: أطابق النتيجة التي حصلت عليها مع القيمة المسجلة في الجدول، أفسر سبب الاختلاف إن وجد.

.....

تجربة اثرائية



حرارة التعادل



الخلفية العلمية:

تُعرَّف حرارة التعادل بأنَّها كمية الحرارة الناتجة من تفاعل مولٍ من أيونات الهيدروجين (H^+) مع مولٍ من الهيدروكسيد (OH^-) لتكوين مولٍ واحدٍ من الماء، وذلك عند تفاعل محليل مخففة من الحمض والقاعدة.



وقد وجدَ أنَّ حرارة التعادل للحمض والقواعد القوية تساوي مقدارًا ثابتاً (57.5 kJ) بغضِّ النظر عن نوع الحمض والقاعدة؛ لأنَّها فعلًا تساوي حرارة التكوير القياسية للماء.

الهدف:

قياس حرارة تفاعل حمض قوي مع قاعدة قوية عملياً.

المواد والأدوات:



كأسان زجاجيتان سعة كلٌ منها (300 ml)، كأس بوليسترين، ميزان حرارة كحولي، قضيب زجاجي، محلول حمض الهيدروكلوريك (HCl) تركيزه (0.5 mol\l)، هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) تركيزه (0.5 mol\l).

إرشادات السلامة:



- أتبع إرشادات السلامة العامة في المختبر.

- أرتدي معطف المختبر والنظارات الواقية والقفازات.

- أحذر من تذوق محلول حمض الهيدروكلوريك (HCl)، أو استنشاق بخاره.

- أحذر من لمس محلول هيدروكسيد الصوديوم، أو تذوقه.

- أحذر عند التعامل مع اللهب.

خطوات العمل:



1. أقيس: أضع في كأس البوليسترين (50ml) من محلول حمض الهيدروكلوريك باستخدام المخارِ المدرج. وأقيس درجة حرارة محلول في الكأس، وأسجلها.

2. أقيس: أضع في مخارِ مدرج (50ml) من محلول هيدروكسيد الصوديوم، وأقيس درجة حرارته، وأسجلها.



3. أجد متوسط درجة حرارة محلول الحمض والقاعدة، وأسجلها.

4. أقيس: أضيف محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى محلول حمض الهيدروكلوريك ببطء، وأحرك محلول ببطء، وأقيس درجة حرارته، وأسجلها.

5. أنظم البيانات والقياسات في جدول كالآتي:

$t_1 =$	درجة حرارة محلول حمض الهيدروكلوريك (t_1)
$t_2 =$	درجة حرارة محلول هيدروكسيد الصوديوم (t_2)
$t_3 = \frac{t_1 + t_2}{2} =$	متوسط درجة حرارة محلول الحمض والقاعدة (t_3)
$t_4 =$	درجة حرارة محلول في كأس البوليسترين (t_4)
$\Delta t = t_4 - t_3$	التغير في درجة حرارة محلول



التحليلُ والاستنتاجُ:

1. أكتب معادلة تفاعل محلول حمض الهيدروكلوريك مع محلول هيدروكسيد الصوديوم. ماذا ينتج؟



2. أكتب معادلة التعادل. ماذا أستنتج؟

3. أجذر كمية الحرارة المرافقة لتفاعل.

4. أجذر عدد مولات الحمض المستخدمة.

5. أجذر حرارة تفاعل التعادل. ماذا أستنتج؟

6. أقارن: أطابق النتيجة التي حصلت عليها مع القيمة المحسوبة لحرارة التكوين القياسية للماء. أفسر سبب الاختلاف.

محاكاة لأسئلة الاختبارات الدولية

السؤال الأول:

وُضِعَتْ مجموَّعةٌ مِنْ قصباً معدنيّةٍ لها الكتلةُ نفسُها داخِلَ وعاءٍ يحتوي على كميةٍ منَ الماءِ، وعندَ غليانِ الماءِ استُخراجَتِ القصباً مِنَ الوعاءِ، وغُرِستِ على لوحٍ مِنَ البرافينِ (الشمع)، كما في الشكلِ؛ بناءً على ما سبقَ أجبْ عما يأتي:

- أيُّها اكتسبَ أكبَرَ كميةٍ منَ الحرارةِ خلالَ التسخينِ؟
- أيُّها له أعلى حرارةٍ نوعيَّةٍ؟
- أيُّها سوفَ يبردُ بسرعةٍ أكبرَ مِنْ غيره مِنَ القصباً؟ ادعُمْ إجابتَكَ بالبراهينِ.



السؤال الثاني:

يمثُّلُ الشكلُ المجاورُ مخططَ تكوينِ المركبِ SnCl_4 ، ادرسِ المخططَ وأجبْ عنِ الأسئلةِ الآتيةِ:

أ - اقترُحْ معادلَتِي تكوينِ المركبِ؛ تبعًا لقانونِ هييس ، والمحتوى الحراريِّ لـكُلِّ مِنْهُما.

ب- اكتبِ المعادلة النهائيةَ للتفاعلِ.

ج - كمْ تتوقعُ أنْ يكونَ المحتوى الحراريُّ للتفاعلِ الكلِّيِّ،
ادعمْ إجابتَكَ بالمعادلاتِ.

