



الرياضيات

الفصل الدراسي الأول

كتاب الطالب

6

فريق التأليف

إضافة إلى جهود فريق التأليف، فقد جاء هذا الكتاب ثمرة جهود وطنية مشتركة من لجان مراجعة وتقدير علمية وتربيوية ولغوية، وجموعات مركزة من المعلمين والمشرفين التربويين، وملاحظات مجتمعية من وسائل التواصل الاجتماعي، وإسهامات أساسية دقيقة من المجلس التنفيذي والمجلس الأعلى في المركز، ومجلس التربية والتعليم وبخانه المتخصصة.

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العنوانين الآتية:

📞 06-5376262 / 237 📞 06-5376266 📧 P.O.Box: 2088 Amman 11941

🌐 @nccdjor 🌐 feedback@nccd.gov.jo 🌐 www.nccd.gov.jo



المقدمة

انطلاقاً من إيمان المملكة الأردنية الهاشمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات الإنسان الأردني، وتسليمه بالعلم والمعرفة؛ سعى المركز الوطني لتطوير المناهج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إلى تحديث المناهج الدراسية وتطويرها، لتكون معيناً للطلبة على الارتقاء بمستواهم المعرفي، ومجاراة أقرانهم في الدول المتقدمة. ولما كانت الرياضيات إحدى أهم المواد الدراسية التي تنمّي لدى الطلبة مهارات التفكير وحلّ المشكلات، فقد أُولى المركز هذا المبحث عنايةً كبيرةً، وحرص على إعداد كتب الرياضيات وفق أفضل طرائق المُتَبَعة عالمياً على يد خبراء أردنيين؛ لضمان انسجامها مع القيم الوطنية الراسخة، وتلبية لاحتياجات أبنائنا الطلبة والمعلّمين.

روعي في إعداد كتب الرياضيات تقديم المحتوى بصورة سلسة، ضمن سياقات حياتية شائقة، تزيد رغبة الطلبة في التعلم، ووظفت فيها التكنولوجيا لتسهيّم في جعل الطلبة أكثر تفاعلاً مع المفاهيم المقدمة لهم. كما عُني بإبراز خطة حلّ المسألة، فأفردت لها دروساً مستقلة تتبع للطلبة التدرُّب على أنواع مختلفة من هذه الخطط وتطبيقاتها في مسائل متعددة. لقد احتوت الكتب على مشروع لكل وحدة؛ لتعزيز تعلم الطلبة المفاهيم والمهارات الواردة فيها وإثرائها. ولأنَّ التدرُّب المكثّف على حلّ المسائل يُعدُّ إحدى أهم طرائق ترسّيخ المفاهيم الرياضية وزيادة الطلاقة الإجرائية لدى الطلبة؛ فقد أُعدَّ كتاب التمارين على نحوٍ يُقدّم للطلبة ورقة عمل في كل درس، تُحلُّ بوصفها واجباً منزليًّا، أو داخل الغرفة الصحفية إن توافر الوقت الكافي. ولأنَّنا ندرك جيداً حرص المعلم الأردني على تقديم أفضل ما لديه للطلبة؛ فقد جاء كتاب التمارين أداةً مساعدةً تُوفّر عليه جهد إعداد أوراق العمل وطباعتها.

من المعلوم أنَّ الأرقام العربية تُستخدم في معظم مصادر تعليم الرياضيات العالمية، ولا سيّما على شبكة الإنترنت، التي أصبحت أداةً تعليميةً مهمّةً؛ لما تزخر به من صفحات تقدّم محتوى تعليمياً تفاعلياً ذا فائدة كبيرة. وحرصاً منا على ألا يفوّت أبناءنا الطلبة أيُّ فرصة، فقد استعملنا في هذا الكتاب الأرقام العربية؛ لجسر الهُوّة بين طلبتنا والمحتوى الرقمي العلمي، الذي ينمو بتسارع في عالَم يخطو نحو التعليم الرقمي بوتيرة متتسارعة.

ونحن إذ نقدّم الطبعة الأولى (التجريبية) من هذا الكتاب، نأمل أن تناول إعجاب أبنائنا الطلبة ومعلميهم، وتجعل تعليم الرياضيات وتعلّمها أكثر متعةً وسهولةً، ونعدّهم بأن نستمرّ في تحسين هذا الكتاب في ضوء ما يصلنا من ملاحظات.

المركز الوطني لتطوير المناهج

قائمة المحتويات

الوحدة ② الكسر والعمليات عليها	42
مشروع الوحدة: السجاد والكسور	43
نشاط مفاهيمي: جمُع كسرٍ مع كسرٍ	44
الدرس 1 جمُع الكسر وطرحها	45
الدرس 2 جمُع الأعداد الكسرية وطرحها	49
نشاط مفاهيمي: ضرب كسرٍ في كسرٍ	55
الدرس 3 ضرب الكسور	56
نشاط مفاهيمي: ضرب كسرٍ في عددٍ كسريٍّ	60
الدرس 4 ضرب الأعداد الكسرية	61
نشاط مفاهيمي: قسمة كسرٍ على كسرٍ	65
الدرس 5 قسمة الكسور	66
الدرس 6 قسمة الأعداد الكسرية	70
اختبار الوحدة	74
الوحدة ① الأعداد الصحيحة والعمليات عليها	6
مشروع الوحدة: أصْنَع ميزان حرارة	7
الدرس 1 الأعداد الصحيحة والقيمة المطلقة	8
الدرس 2 مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها	13
نشاط مفاهيمي: جمُع الأعداد الصحيحة	18
الدرس 3 جمُع الأعداد الصحيحة	20
نشاط مفاهيمي: طرح الأعداد الصحيحة	26
الدرس 4 طرح الأعداد الصحيحة	28
الدرس 5 ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها	33
اختبار الوحدة	40

قائمة المحتويات

الوحدة ④ التحويلات والإنشاءات الهندسية ..	102
مشروع الوحدة: الرياضيات والجغرافيا ..	103
الدرس 1 المستوى الإحداثي ..	104
مشروع الوحدة: البسيكويت ..	77
الدرس 2 الانسحاب ..	109
نشاط مفاهيمي: ضرب الكسور العشرية ..	78
الدرس 3 الانعكاس ..	115
نشاط مفاهيمي: قسمة الكسور العشرية ..	79
معلم برمجية جيوجبرا: خصائص الانعكاس ..	124
الدرس 4 الدائرة وأجزاؤها ..	126
نشاط مفاهيمي: قسمة الكسور العشرية ..	85
الدرس 5 إنشاءات هندسية ..	133
الدرس 6 رسم المثلث ..	141
الدرس 3 القياس: تطبيقات العمليات على الكسور العشرية ..	93
اختبار الوحدة ..	148
الدرس 4 خطة حل المسألة (حل مسألة أبسط) ..	98
اختبار الوحدة ..	100

الأعداد الصحيحة والعمليات عليها

ما أهمية هذه الوحدة؟

تُعد الأعداد الصحيحة والعمليات عليها من الموضوعات المهمة في الرياضيات والعلوم الأخرى. فمثلاً، تُستعمل الأعداد الصحيحة السالبة للتعبير عن الواقع المُنْخَفَضَة عن سطح الأرض، ودرجات الحرارة التي هي أقل من درجة تجمد الماء.



سأتعلم في هذه الوحدة:

- تعرّف الأعداد السالبة، وتمثيلها.
- إيجاد القيمة المطلقة لعدد صحيح.
- جمع الأعداد الصحيحة، وطرحها.
- ضرب الأعداد الصحيحة، وقسمتها.
- مقارنة الأعداد الصحيحة، وترتيبها.

تعلّمت سابقاً:

- ✓ تمييز الأعداد السالبة.
- ✓ جمّع الأعداد الكلية، وطرحها.
- ✓ ضرب الأعداد الكلية، وقسمتها.
- ✓ تمثيل الأعداد الكلية على خط الأعداد.
- ✓ مقارنة الأعداد الكلية، وترتيبها.

مشروع الوحدة: أصنّع ميزان حرارةً



• أَصْنِع كِلا المِيزانِيْن فِي ثَلَّجٍ مُنْصَهِرٍ مُدَّةً 30 دَقِيقَةً، بِحَيْثُ أَكْتَب قِرَاءَةَ دَرَجَةِ الْحَرَارَةِ لِلمِيزانِ الدَّقِيقِ عَلَى قِطْعَةِ الْوَرَق فِي مِيزانِيْ بِعِنْدِ مُسْتَوَى السَّائِلِ فِي الْمَاصَةِ.

- LEARN 2 BE
- أَكْرِرُ الْخُطُوَّةَ السَّابِقَةَ فِي مَاءٍ سَاخِنٍ.
 - أَسْتَعْمِلُ الْمِسْطَرَةَ لِعَمَلِ تَدْرِيجٍ عَلَى الْوَرَقَةِ بِنَاءً عَلَى الْقِيَاسِيْنِ السَّابِقِيْنِ.

أَسْتَعْمِلُ مِيزانِي لِقِيَاسِ دَرَجاتِ الْحَرَارَةِ فِي أُوساطٍ مُخْتَلِفَةٍ، مِثْلِ: الْمَاءِ الْبَارِدِ، وَالْمَاءِ السَّاخِنِ، وَالثَّلَّجِ الْمُنْصَهِرِ، وَالثَّلَّجِ غَيْرِ الْمُنْصَهِرِ مُدَّةً نِصْفِ سَاعَةٍ، وَذَلِكَ بِوَضْعِ الْمِيزانِ فِي إِناءٍ يَحْوِي الْمَادَةَ الَّتِي يُرَادُ قِيَاسُهَا.

6

أُمِّلِّ دَرَجاتِ الْحَرَارَةِ عَلَى خَطٍّ الْأَعْدَادِ.

7

أَرْتُبُ دَرَجاتِ الْحَرَارَةِ تَصَاعِدِيًّا.

8

أُجْرِي الْعَمَلِيَّاتِ الْأَرْبَعَ عَلَى دَرَجاتِ الْحَرَارَةِ الْمَقِيسَةِ فِي الْجَدْوَلِ.

9

عرض النتائج:

1 أَعْرِض مِيزانَ الْحَرَارَةِ الَّذِي صَنَعْتُهُ أَمَامَ زُمَلَائيِّ فِي الصَّفَّ.

2

أَكْتُبُ تَقْرِيرًا عَنِ الْمِيزانِ يَضْمَمُنْ خُطُوَّاتِ صُنْعِ الْمِيزانِ.

أَسْتَعِدُ وَزُمَلَائيِّ لِتَفْعِيلِ مَشْرُوعِنَا الْخَاصِّ الَّذِي نُطبِّقُ فِيهِ مَا سَتَتَعَلَّمُهُ فِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ لصُنْعِ مِيزانِ حَرَارَة.

المَوَادُ وَالآدَواتُ:



مِيزانِ حَرَارَةٍ، مَحْلُولُ كُحُولٍ، قَارُورَةٌ شَفَافَةٌ، مُلَوْنٌ طَعَامٌ، مَاصَةٌ شَفَافَةٌ، مَعْجُونَةٌ، شَرِيطٌ لاصقٌ.

خطوات تنفيذ المشروع:

1 أَصْنِعُ فِي الْقَارُورَةِ مِقدَارَيْنِ مُتَسَاوِيْنِ مِنَ الْكُحُولِ وَالْمَاءِ، ثُمَّ أُضِيفُ قَطْرَاتٍ مِنْ مُلَوْنِ الطَّعَامِ، وَأَخْرُوكَ الْخَلِيلِ.

2 أَفْصُّ قِطْعَةً مِنَ الْوَرَقِ، ثُمَّ أَثْبِتها عَلَى الْمَاصَةِ.

3 أُدْخِلُ الْمَاصَةَ فِي الْقَارُورَةِ بِحَيْثُ تَنْعَسُ فِي السَّائِلِ، وَلَا تَلْمِسُ الْقَاعَ، وَأَسْتَعْمِلُ الْمَعْجُونَةَ لِتَشْبِيَّهَا وَإِغْلَاقِ فُوَّهَةِ الْقَارُورَةِ.

4 أَلْاحِظُ تَغَيِّرَ ارْتِفَاعِ السَّائِلِ فِي الْمَاصَةِ إِلَى الْأَعْلَى أَوْ إِلَى الْأَسْفَلِ بِحَسْبِ درَجَةِ حَرَارَةِ الْوَسْطِ الْمَحيطِ بِالْقَارُورَةِ.

5 لِأَسْتَعْمِلِ مِيزانَ الْحَرَارَةِ الَّذِي صَنَعْتُهُ لِقِيَاسِ دَرَجاتِ الْحَرَارَةِ عَلَى تَحْوِيْدَقِيقَةِ، أَصْنِعُ التَّدْرِيجَاتِ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي:

- أَضْبِطُ الْمِيزانَ بِاسْتَعْمَالِ مِيزانِ حَرَارَةِ دَقِيقَةِ مُحْتَبِرِ الْمَدْرَسَةِ.

1

الدرس

أستكشفُ



تَسْكُنُ لَانَا فِي الطَّابِقِ التَّالِي، فِي
حِينَ تَسْكُنُ غَادَةً فِي الطَّابِقِ الْأَوَّلِ
تَحْتَ الْأَرْضِيِّ مِنَ الْعِمَارَةِ نَفْسِهَا.
كَمْ طَابِقًا تَبْعُدُ كُلُّ مِنْهُمَا عَنْ مُسْتَوِي
سَطْحِ الْأَرْضِ؟

فكرةُ الدرس

أُمِيزُ الْأَعْدَادِ الصَّحِيحَةَ وَمَعْكُوسَاتِهَا.
أَجِدُ القيمةَ الْمُطْلَقَةَ لِعَدَدٍ صَحِيحٍ.


المطلقات

عَدَدٌ صَحِيحٌ، عَدَدٌ صَحِيحٌ مُوجِّبٌ، عَدَدٌ
صَحِيحٌ سَالِبٌ، مَعْكُوسٌ، القيمةُ الْمُطْلَقَةُ.

الْأَعْدَادُ ... , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 , -1 , -2 , -3 , -4 , ... تُسَمَّى الأَعْدَادُ الصَّحِيحَةُ (integers)، وَتَتَضَمَّنُ:

- أَعْدَادًا صَحِيحَةً مُوجِّبَةً 1 , 2 , 3 , (positive integers)
- أَعْدَادًا صَحِيحَةً سَالِبَةً ... , -4 , -3 , -2 , -1 (negative integers)
- الصَّفَرَ.


وَيُمْكِنُ تَمثِيلُهَا بِيَانِيًّا عَلَى خَطٍّ أَعْدَادٍ أَفْقَيٍّ أو رَأْسِيٍّ.



مثال 1

أُمِّلِّي الْأَعْدَادَ: 5 , 0 , 5 , -3 - عَلَى خَطٍّ الْأَعْدَادِ.


أَرْسُمُ خَطًّا لِلْأَعْدَادِ، ثُمَّ أَرْسُمُ نُقطَةً عِنْدَ مَوْقِعِ كُلِّ عَدَدٍ صَحِيحٍ.



اتحقُّ من فهمي:

أُمِّلِّي الْعَدَدَيْنِ: 6 , 7 - عَلَى خَطٍّ الْأَعْدَادِ.

الوحدة 1



يكون العددان متعاكسيين إذا كانا لهما البعد نفسه عن الصفر، ولكن على جهتين مختلفتين منه على خط الأعداد. فمثلاً كما في خط الأعداد الرأسي المجاور، كلا العددتين 2 و -2 هُوَ مَعْكُوسُ (opposite) لِلآخر. وبما أن العددة 0 ليس قيمةً موجبةً أو سالبةً، فإنَّهُ يُعَدُّ معكوساً لنفسه.

مثال 2


أَنْتَ تَعْلَمُ

يُمْكِنُ كِتابَةُ الْعَدَدِ 5+ في صورة 5 من دون إشارة +، ولا يُمْكِنُ ذلك لِلْأَعْدَادِ السَّالِيَةِ.

أَمْثُلْ كُلَّا مِنَ الْعَدَدِ 5- وَمَعْكُوسِهِ عَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ.

1

إِشَارَةُ الْعَدَدِ 5- سالبةٌ، وَمَعْكُوسُ الإِشَارَةِ السَّالِيَةِ هُوَ الإِشَارَةُ الْمَوْجِبَةُ؛ لِذَلِكَ الْعَدَدِ 5- هُوَ الْعَدَدُ 5+ أو 5 وَلِتَمْثِيلِهِمَا عَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ، أَرْسُمْ خَطَّ أَعْدَادٍ، ثُمَّ أَرْسُمْ نُقْطَةً عِنْدَ مَوْقِعِ كُلِّ مِنْهُمَا.




إذن، العدد 5- هو مَعْكُوسُ الْعَدَدِ 5.

أَمْثُلْ كُلَّا مِنَ الْعَدَدِ 4 وَمَعْكُوسِهِ عَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ.

2

مَعْكُوسُ الْعَدَدِ 4 هُوَ -4



أي إنَّ مَعْكُوسَ الْعَدَدِ 4 هُوَ الْعَدَدِ 4-

اتحقق من فهمي:



أَمْثُلْ كُلَّا مِنَ الْعَدَدِ 1- وَمَعْكُوسِهِ عَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ.

3

أَمْثُلْ كُلَّا مِنَ الْعَدَدِ 7 وَمَعْكُوسِهِ عَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ.

4

مفهوم أساسٍ



القيمة المطلقة

- **بالكلمات** القيمة المطلقة (absolute value) للعدد هي المسافة بين ذلك العدد والصفر على خط الأعداد.




يُرمز إلى القيمة المطلقة بالرمز $| \cdot |$. فمثلاً، القيمة المطلقة للعدد x هي $|x|$.

$$|-4| = 4, |4| = 4$$

- **بالرموز**

- **مثال**




العدد -4 والعدد 4 يبعدان 4 وحدات عن الصفر، وإن كانوا على جانبيِّن مُتَعَاكِسِيْن من الصفر.

مثال 3

أجِد القيمة المطلقة لكل عدد مما يأتي، ثُمَّ أُمَثِّلُها على خط الأعداد.

1


العدد 2



بما إن المسافة بين العدد 2 والصفر هي 2 ، فإن $2 = |2|$.

2

العدد -3



بما إن المسافة بين العدد -3 والصفر هي 3 ، فإن $3 = |-3|$.

3

تحقق من فهمي:

أجِد القيمة المطلقة لكل من الأعداد $0, 8, 9, -8$ ، ثُمَّ أُمَثِّلُها على خط الأعداد.

تستعمل القيمة المطلقة في الكثير من المسائل الحياتية والعملية لتمثيل المسافات في اتجاهات مختلفة.

الوحدة 1

مثال 4: من الحياة



LEARN 2 BE

يحلق طائر على ارتفاع 8 m فوق مستوى سطح البحر، وتسبح سمكة على عمق 6 m تحت مستوى سطح البحر كما في الشكل المجاور. ما المسافة بين الطائر والسمكة عندما يكونان على خط عمودي واحد؟

يشير المقدار $|8|$ إلى المسافة العمودية التي يعلو بها الطائر عن مستوى سطح البحر، ويشير المقدار $-|6|$ إلى عمق السمكة تحت مستوى سطح البحر.

لإيجاد المسافة العمودية بين الطائر والسمكة، أجمع القيمتين: $|8| + |-6|$

$$|8| + |-6| = 8 + |-6|$$

القيمة المطلقة للعدد 8 هي 8

$$= 8 + 6$$

القيمة المطلقة للعدد -6 هي 6

$$= 14$$

أجمع

أي إن المسافة الإجمالية بين السمكة والطائر هي 14 m

تحقق من فهمي:



في مجمع تجاري مصعدان متجاوران. صعد أحمد إلى الطابق الخامس، في حين نزل سعيد إلى الطابق الثالث تحت الأرض حيث المراقب. ما المسافة العمودية بينهما بالطوابق عند وصول المصعدين؟

أتدرّب وأحل المسائل



أمثل بيانيا كلاً من الأعداد الصحيحة الآتية على خط الأعداد:

1 $-5, 3, 9, -3$



2 $0, -2, 4$



أَجِدُ مَعْكُوسَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

3 29

4 -13

5 0

مَعْلَوْمَة

يُشترط عند إقامة الأبراج التجارية وجود مواقف لسيارات أسفلها لكي لا يتسبب زوار هذه الأبراج في إزدحامات مرورية في المنطقة.



6 $|17| =$

7 $|-32| - 10 =$

8 $4 + |12| =$

9 $3 + |-7| =$

10 $|-8| + |-22| =$

11 $|-9| - 2 =$

أَبْرَاجُ: ذَهَبَ خَالِدٌ إِلَى أَحَدِ الْأَبْرَاجِ لِلتَّسْوِيقِ، فَأَوْفَقَ سَيَارَتَهُ فِي الْمَرْأَبِ بِالْطَّابِقِ الرَّابِعِ تَحْتَ الْأَرْضِ، ثُمَّ صَعَدَ بِالْمِصْعَدِ إِلَى الطَّابِقِ الْأَرْضِيِّ. وَمَا إِنْ وَصَلَهُ حَتَّى تَذَكَّرَ أَنَّهُ نَسِيَ مَحْفَظَتَهُ فِي السَّيَارَةِ، فَنَزَلَ إِلَيْهَا مُسْتَعِمِلاً بِالْمِصْعَدِ. مَا الْمَسَافَةُ بِالْطَّابِقِ الَّتِي قَطَعَهَا خَالِدٌ فِي النُّزُولِ إِلَى السَّيَارَةِ ثُمَّ الْعُودَةِ إِلَى الطَّابِقِ الْأَرْضِيِّ؟

تَوْفِيرُ: أَوْدَعَتْ أَمَانِي 600 دِينَارٍ فِي حِسَابِهَا الْبَنِكِيِّ، ثُمَّ سَحَبَتْ مِنْهُ 420 دِينَارًا لِشَرَاءِ جِهَازٍ حاسُوبٍ. أَعْبَرَ عَنْ هَذَيْنِ الْمَبْلَغَيْنِ بِأَعْدَادٍ صَحِيحَةٍ.

مَهَارَاتُ التَّفْكِيرِ الْعُلَيَا

أَكْتَشِفُ الْمُخْتَلِفَ: أَحَدُ الْمِقْدَارَ المُخْتَلِفِ عَنِ الْمَقَادِيرِ الْثَّلَاثَةِ الْأُخْرَى، مُؤَسِّراً

14

إِجَابَتِيِّ.

$|-6|$

$4 - |-2|$

$9 - |-3|$

$|-3| + 3$

15

تَحْدِيدُ: إِذَا كَانَ $5 = |x|$ ، فَمَا قِيمَتُ x ؟

16

مَا السُّؤَالُ: أَطْرُحُ سُؤَالاً إِجَابَتُهُ: بُعْدُ الْعَدَدِ الصَّحِيحِ (-3) عَنِ الصَّفْرِ.


17

أَكْتَبُ أَشْرُحُ خُطُوَاتِ تَمْثِيلِ القيمة المطلقة لعدد صحيح سالِبٍ عَلَى خَطٍّ الْأَعْدَادِ.

استكشف

فكرة الدرس

أُقارِنُ الأَعْدَادِ الصَّحِيحةَ عَلَى خَطٍّ الأَعْدَادِ، ثُمَّ أَرْتُبُهَا.



أَرَادَتْ اُنْشِرَاحُ زِرَاعَةَ نَبْتَيْنِ، فَحَفَرَتْ لَهُمَا حُفْرَتَيْنِ، عُمُقُ كُلِّ مِنْهُمَا كَمَا فِي الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ. إِذَا أَرَادَتْ زِرَاعَةَ نَبْتَةً ثَالِثَةً عَلَى عُمُقٍ 42 cm مِنْ سَطْحِ الْأَرْضِ، فَهَلْ سَتَحْفِرُ لَهَا حُفْرَةً أَعْمَقَ مِنَ الْحُفْرَيْنِ السَّابِقَيْنِ؟

عِنْدَ تَمْثِيلِ الأَعْدَادِ الصَّحِيحةَ عَلَى خَطٍّ الأَعْدَادِ الْأَفْقيِيِّ، فَإِنَّ قِيمَتَهَا تَزَادُ كُلَّمَا اتَّجَهْنَا إِلَى الْيَمِينِ، وَتَنَاقَصُ كُلَّمَا اتَّجَهْنَا إِلَى الْيَسَارِ. أَمَّا عِنْدَ تَمْثِيلِ الأَعْدَادِ الصَّحِيحةَ عَلَى خَطٍّ الأَعْدَادِ الرَّأْسِيِّ، فَإِنَّ قِيمَتَهَا تَزَادُ كُلَّمَا اتَّجَهْنَا إِلَى الْأَعْلَى، وَتَنَاقَصُ كُلَّمَا اتَّجَهْنَا إِلَى الْأَسْفَلِ؛ مَا يَعْنِي أَنَّ الْأَعْدَادَ الْمُوْجِبَةَ أَكْبَرُ مِنَ الْأَعْدَادِ السَّالِبَةِ دَائِمًا.

كُلَّمَا اتَّجَهْنَا إِلَى الْيَمِينِ زَادَتْ قِيمَةُ الْأَعْدَادِ



كُلَّمَا اتَّجَهْنَا إِلَى الْيَسَارِ تَنَاقَصَتْ قِيمَةُ الْأَعْدَادِ.

مثال 1

أَسْتَعْمِلُ خَطَّ الْأَعْدَادِ لِلْمُقَارَنَةِ، بِوَضْعِ إِشَارَةِ <, أَوِ >, أَوِ = فِي ○ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

1 11 ○ -2


أَمْثُلُ -2, 11 عَلَى خَطٍّ الْأَعْدَادِ، ثُمَّ أُقارِنُ:



بِمَا أَنَّ الْعَدَدَ 11 يَقْعُدُ إِلَى يَمِينِ الْعَدَدِ -2، فَإِنَّ -2 > 11

2 $-7 \bigcirc -3$


أمثل $-3, -7$ على خط الأعداد، ثم أقارن:



بما أن العدد -3 يقع إلى يمين العدد -7 ، فإن $-3 > -7$.

3 $-6 \bigcirc 0$

أمثل $0, -6$ على خط الأعداد، ثم أقارن:



بما أن العدد 0 يقع إلى يمين العدد -6 ، فإن $0 > -6$.

4 $5 \bigcirc |-5|$

بما أن العدد $5 = |-5|$ ، فإن العدادين متساويان.

تحقق من فهمي:

5 $-12 \bigcirc 5$

6 $-8 \bigcirc -19$

7 $0 \bigcirc -9$

8 $7 \bigcirc |-7|$


يمكن استعمال خط الأعداد أو الإشارة والقيمة لترتيب الأعداد الصحيحة من الأصغر إلى الأكبر أو العكس.

مثال 2

أرتّب الأعداد: $-2, 1, -8, 5$ من الأصغر إلى الأكبر.

الطريقة 1: استعمال خط الأعداد.

أمثل الأعداد على خط الأعداد:



أكتب الأعداد من اليسار إلى اليمين بدءاً بالعدد الأصغر.

$-8 < -2 < 1 < 5$

كُلّما اتجهنا إلى اليمين كبرت الأعداد

$-8, -2, 1, 5$

$-8 < -2 < 1 < 5$

الوحدة 1

الطريقة 2: اسْتِعْمَالُ الإِشَارَةِ وَالْقِيمَةِ فِي الْمُقَارَنَةِ.

أقارِنُ الْأَعْدَادَ السَّالِبَةَ، ثُمَّ أقارِنُ الْأَعْدَادَ الْمُوْجِبةَ: الْأَعْدَادُ السَّالِبَةُ هِيَ: $-2, -8$; أَيْ إِنَّ $-2 < -8$ الْأَعْدَادُ الْمُوْجِبةُ هِيَ: $5, 1$; أَيْ إِنَّ $5 > 1$ بِمَا أَنَّ الْأَعْدَادَ السَّالِبَةَ أَصْغَرُ مِنَ الْأَعْدَادِ الْمُوْجِبةِ، فَإِنَّ تَرْتِيبَ الْأَعْدَادِ مِنَ الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ هُوَ:

$$-8, -2, 1, 5$$

اتحقق من فهمي:



2

أُرْتِبُ الْأَعْدَادَ: $-4, 0, 5, 9$ مِنَ الْأَكْبَرِ إِلَى الْأَصْغَرِ.



لِمُقَارَنَةِ الْأَعْدَادِ الصَّحِيحَةِ وَتَرْتِيبِهَا وُجُودُهُ في كَثِيرٍ مِنَ التَّطَبِيقَاتِ الْحَيَاتِيَّةِ.

مثال 3: من الحياة




يُبَيِّنُ الجَدُولُ الْأَتَيِيَّ دَرَجَاتِ الْحَرَارَةِ بِالسَّلْسِيلَةِ فِي أَحَدِ أَيَّامِ فَصْلِ الشَّتَاءِ فِي عَدَدِ مِنَ الْمُحَافَظَاتِ الْأُرْدُنِيَّةِ:

العقبة	الزرقاء	إربد	الطفيلة	عجلون	عمان
15	8	3	-5	-3	0

أُحَدِّدُ مَوْقِعَ درجة الحرارة في كُلِّ مُحَافَظَةٍ عَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ.

1



أُرْتِبُ الْمُحَافَظَاتِ الْأُرْدُنِيَّةِ بِحَسْبِ دَرَجَاتِ الْحَرَارَةِ الْمُسَجَّلَةِ مِنَ الْأَدْنِيِّ إِلَى الْأَعْلَىِ.

2

تَرْتِيبُ الْأَعْدَادِ مِنَ الْأَدْنِيِّ إِلَى الْأَعْلَىِ يَعْنِي تَرْتِيبَهَا مِنَ الْيُسْرَىِ إِلَى الْيَمِينِ.

$$-5 < -3 < 0 < 3 < 8 < 15$$


كُلُّمَا أَنْجَهْنَا إِلَى يَمِينِ خَطِّ الْأَعْدَادِ كَبُرَتِ الْأَعْدَادُ

$$-5, -3, 0, 3, 8, 15$$

$$-5 < -3 < 0 < 3 < 8 < 15$$

أيٌ إنَّ ترتيب المُدْنِ بحسب درجات حرارتها من الأدنى إلى الأعلى هو:
الطفيلية، عجلون، عمان، إربد، الزرقاء، العقبة.

تحقق من فهمي:



يبين الشكل المجاور موضع ثلاث أسماك من سطح الماء:
أحدد موقع كل سمكة على خط الأعداد بحسب عمقها.

أرتّب الأسماك بحسب موقعها عن سطح الماء تنازلياً (من الأبعد إلى الأقرب).



3

4

أتدرّب وأحل المسائل



استعمل خط الأعداد للمقارنة، بوضع إشارة <، > أو = في كل مما يأتي:

1 $17 \bigcirc 20$

2 $0 \bigcirc -5$

3 $23 \bigcirc -46$

4 $-39 \bigcirc -90$

5 $3 \bigcirc |-3|$

6 $|-25| \bigcirc -50$

استعمل خط الأعداد في ترتيب الأعداد الصحيحة من الأصغر إلى الأكبر:

7 $4, -7, 3, -2, 0$

8 $-5, 8, 2, -6, -9, 1$

إرشاد


الصفر أكبر من أي عدد سالب، وأصغر من أي عدد موجب، لذا فإن أي عدد موجب أكبر من أي عدد سالب.

أرتّب الأعداد الصحيحة في كل مما يأتي من الأكبر إلى الأصغر:

9 $17, -18, 20, -6, -23$

10 $48, -50, 32, -14, -36, 30$

الوحدة 1



شرکات: يبيّن التمثيل بالأعمدة المجاور أرباح

شركة من عام 2008 حتى عام 2013.

قارن ربح الشركة عام 2008 بربحها عام 2009.

اكتب فقرة تلخص أرباح الشركة من عام 2008

إلى عام 2013.

إرشاد

عند تمثيل بيانات بالأعمدة، تمثل البيانات التي قيمتها سالبة تحت الخط الأفقي (أي أسفل الصفر) لتشير إلى قيمتها السالبة.

درجات حرارة: يبيّن الجدول الآتي درجات الحرارة بالسلسيوس لمدة خمسة أيام

مُتناوبة في مدينة ما، استعمله في الإجابة عن الأسئلة أدناه:

الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الإثنين	الأحد	
5	-2	-12	-6	1	: العظمى
1	-8	-20	-14	0	: الصغرى

أرتّب درجات الحرارة العظمى تنازليًّا. أي الأيام كانت فيه درجة الحرارة أعلى؟

13

أرتّب درجات الحرارة الصغرى تصاعديًّا. أي الأيام كانت فيه درجة الحرارة أقل؟

14

مهارات التفكير العليا

اكتشاف الخطأ: قالت أمّل إنَّ العمق $m = 68$ - أكثر من العمق $m = 75$ ؛ لأنَّ

$-68 < -75$ ، هل قول أمّل صحيح؟ أبّرر إجابتي.

15

تبrier: إذا كانت $-4 < -6$ ، فما علاقه موقع العدد -4 بموقع العدد -6 على خط

أعدادٍ أفقية؟ أبّرر إجابتي.

16

مسألة مفتوحة: أكتب عدداً يقع بين -12 و -18 .

17

أشرح كيف أرتّب مجموعه من الأعداد الصحيحة السالبة تصاعديًّا من



18

دون استعمال خط الأعداد، معرّزاً إجابتي بمثال.

جمع الأعداد الصحيحة

الهدف: استعمال النماذج لجمع الأعداد الصحيحة.

تُستعمل قطع العد الزرقاء لتمثيل الأعداد الصحيحة الموجبة، و تُستعمل قطع العد الحمراء لتمثيل الأعداد الصحيحة السالبة؛ فالقطعة $+1$ تمثل $+1$ ، والقطعة -1 تمثل -1 .



نشاط 1

جمع عددين صحيحين متشابهين في الإشارة

أجد ناتج كل مما يأتي باستعمال قطع العد:

1 $2 + 3$

لجمع العددين الموجبين: $2 + 3$ ، أستعمل القطع لتمثيل كل منهما:

2 : $+1 \quad +1$

3 : $+1 \quad +1 \quad +1$

2 $-4 + (-6)$

لجمع العددين السالبين: $(-6) + (-4)$ ، أستعمل القطع لتمثيل كل منها:

-4 : $-1 \quad -1 \quad -1 \quad -1$

-6 : $-1 \quad -1 \quad -1 \quad -1 \quad -1 \quad -1$

أجمع القطع معا، فتتجزئ قطع جميعها زرقاء تمثل .

$2 + 3 =$ لذا:

أجمع القطع معا، فتتجزئ قطع جميعها زرقاء تمثل .

$-4 + (-6) =$ لذا:

قطعة زرقاء وأخرى حمراء تمثلان معا زوجا صفريا.

يمكن إضافة زوج صفرى أو حذفه من مجموعة الصفر أو حذفه لا يغير من قيمة العدد.

نشاط 2

جمع عددين صحيحين مختلفين في الإشارة

أجد ناتج $(-8) + 5$ باستعمال قطع العد.


لجمع عددين مختلفين في الإشارة، أستعمل القطع الزرقاء لتمثيل العدد الموجب والقطع الحمراء لتمثيل العدد السالب.

الوحدة 1

الخطوة 1 أمثل كلا العدددين باستعمال النماذج.

$$+5 : +1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad +1$$

$$-8 : -1 \quad -1$$



الخطوة 3 أحدد لون القطع المتبقي، ثم أحدد عددها.

بقيت قطع حمراء تمثل العدد .

$$5 + (-8) =$$

أحلل النتائج:

ماذا تمثل الأزواج الصفرية؟ 1

ماذا تمثل القطع المتبقية بعد إزالة الأزواج الصفرية؟ 2



كيف أستعمل النماذج لإيجاد ناتج: $8 - 5 = ?$ 1

استعمل النماذج لأكمل الثلاثة أعداد التالية في النمط أدناه: 2

$$-16, -12, -8, \boxed{}, \boxed{}, \boxed{}$$

أستكشف



أَدْيَ التَّبَّخُرُ فِي فَصْلِ الصَّيْفِ إِلَى انْخَفَاضِ مَنْسُوبِ الْمَاءِ فِي بُحْرَيْةِ صِنَاعِيَّةٍ 3 cm فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ، وَ 7 cm فِي الشَّهْرِ الثَّانِي. مَا إِجمَالِيُّ التَّغَيُّرِ فِي مَنْسُوبِ مَاءِ الْبُحْرَيْةِ؟


فكرة الدرس

أَجْمَعْ عَدَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ.
أَكْلُ مَسَائِلَ حَيَاتِيَّةً عَنْ جَمْعِ الْأَعْدَادِ الصَّحِيقَةِ.

المصطلحات

النظير الجمعي

يُمْكِنُ جَمْعُ عَدَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ لَهُمَا إِلِيْسَارٌ نَفْسُهَا بِاسْتِعْمَالِ النَّمَادِيجِ، أَوْ بِتَمْثِيلِهِمَا عَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ.



مثال 1

أَجِدُّ نَاتِجَ كُلِّ مِمَّ يَأْتِي بِاسْتِعْمَالِ النَّمَادِيجِ، وَعَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ:

$$\textcircled{1} \quad 4 + 5$$


الطريقة 1: استعمال النماديج.

$$\begin{array}{r}
 4 \qquad + \qquad 5 \qquad = \\
 \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \qquad + \qquad \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \qquad = \qquad \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \\
 \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \qquad + \qquad \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \qquad = \qquad \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \qquad = \qquad 9
 \end{array}$$

1
أَبْدأَ مِنَ الْعَدْدِ 0، ثُمَّ أَتَحَرَّكُ 4 وَحَدَاتٍ إِلَى الْيَمِينِ لِتَمْثِيلِ الْعَدْدِ الْأَوَّلِ

2
أَتَحَرَّكُ 5 وَحَدَاتٍ إِلَى الْيَمِينِ لِتَمْثِيلِ الْعَدْدِ الثَّانِي حَتَّى أَصْلِ إِلَى الْعَدْدِ 9

الطريقة 2: استعمال خط الأعداد.



الوحدة 1

2 $-3 + (-4)$


$$\begin{array}{ccccccc} -3 & + & (-4) & = & \begin{matrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{matrix} & -1 & -1 \\ \begin{matrix} -1 \\ -1 \end{matrix} & + & \begin{matrix} -1 \\ -1 \end{matrix} & = & \begin{matrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{matrix} & -1 & -1 \end{array}$$

الطريقة 1: استعمال النماذج.

$$= -7$$

2 أُنْهِرَكُ 4 وَحَدَاتٍ إِلَى اليسارِ لِتَمْثِيلِ الْعَدَدِ
الثَّانِي (-4) حَتَّى أَصِلَ إِلَى الْعَدَدِ -7

1 أَبْدأً مِنَ الْعَدَدِ 0 , ثُمَّ أُنْهِرَكُ 3 وَحَدَاتٍ
إِلَى اليسارِ لِتَمْثِيلِ الْعَدَدِ الْأَوَّلِ (-3)



الطريقة 2: استعمال خط الأعداد.

3 $5 + 1$

4 $-2 + (-6)$

أتحقق من فهمي:

يمكن أيضًا جمع عددين صحيحين لهما الإشارة نفسها بجمع القيمة المطلقة للعددين، ووضع إشارة أحد هما في الناتج.

مثال 2

أجد ناتج كل مما يأتي:

1 $9 + 7$

العددان 9 و 7 لهما الإشارة نفسها. إذن:

$$|9| + |7| = 9 + 7 = 16$$

أجمع القيمة المطلقة لكل من العددين

$$9 + 7 = +16$$

ناتج الجمع يساوي القيمة المطلقة

2 $-6 + (-2)$

العددان -6 و -2 لهما الإشارة نفسها. إذن:

$$|-6| + |-2| = 6 + 2 = 8$$

أجمع القيمة المطلقة لكل من العددين

$$-6 + (-2) = -8$$

ناتج الجمع يساوي سالب القيمة المطلقة

أتحقق من فهمي:



3 $14 + 8$

4 $-4 + (-7)$


يمكن استعمال النماذج وخط الأعداد لجمع عددين صحيحين محتلين في الإشارة.

مثال 3

أجد ناتج كل مما يأتي باستعمال النماذج، وعلى خط الأعداد:

1

$$-5 + 4$$



الطريقة 1: استعمال النماذج.


بقي قطعة عدد حمراء واحدة. إذن، $-5 + 4 = -1$

2

أتحرك 4 وحدات إلى اليمين لتمثيل العدد الثاني (4) حتى أصل إلى العدد -1 .


1

أبدأ من العدد 0، ثم أتحرك 5 وحدات إلى اليسار لتمثيل العدد الأول (-5).



الطريقة 2: استعمال خط الأعداد.


2 $7 + (-3)$



الطريقة 1: استعمال النماذج.

بقي 4 قطع عدد زرقاء. إذن، $7 + (-3) = +4$

الوحدة 1



الطريقة 2: استعمال خط الأعداد.

أتحقق من فهمي:

3 $-8 + 6$

4 $10 + (-5)$

يمكن أيضًا جمع عددين صحيحين مختلفي الإشارة بطرح القيمة المطلقة الصغرى من القيمة المطلقة الكبيرة، ووضع إشارة العدد الذي قيمته المطلقة أكبر في الناتج، وعند جمع عدد ومعكوسه يكون الناتج صفرًا ويسمى كل منهما أيضًا نظيرًا جمياً (additive inverse) للأخر.

مثال 4

أجد ناتج كل مما يأتي:

1 $-8 + 6$

العدان 8 و 6 مختلفان في الإشارة. إذن:

$$|-8| - |6| = 8 - 6 = 2$$

أطّرُ القيمة المطلقة الصغرى من القيمة المطلقة الكبرى

$$-8 + 6 = -2$$

أضع إشارة العدد الذي قيمته المطلقة أكبر

2 $9 + (-4)$

العدان 9 و 4 مختلفان في الإشارة. إذن:

$$|9| - |-4| = 9 - 4 = 5$$

أطّرُ القيمة المطلقة الصغرى من القيمة المطلقة الكبرى

$$9 + (-4) = +5$$

أضع إشارة العدد الذي قيمته المطلقة أكبر

أتحقق من فهمي:

3 $-12 + 8$

4 $11 + (-6)$

أتعلّم

تُحقّقُ الأَعْدَادُ الصَّحِيحَةُ خَاصِيَّةُ
الْإِبَدَالِ عَلَى الْجُمْعِ، حَيْثُ إِنَّ تَرتِيبَ
الْأَعْدَادِ الصَّحِيحَةِ الْمُجْمُوعَةِ لَا يُعَيِّرُ
مِنْ نَاتِيجِ الْجُمْعِ: $a + b = b + a$

لعملية جمع الأَعْدَادِ الصَّحِيحَةِ عَنْصُرٌ مُحايدٌ جَمْعِيٌّ، حَيْثُ إِنَّ نَاتِيجَ جَمْعِ أَيِّ
عَدَدٍ مَعَ الصَّفْرِ يُساوِي الْعَدَدَ نَفْسَهُ: $a + 0 = a$

مثال 5: من الحياة



أراد حارِسُ الْمَرْمى أَحْمَدُ التِّقاطَ الْكُرْةِ، فَجَرَى مَسَافَةً 9 m إِلَى الْأَمَامِ بَدْءًا مِنَ
الْمَرْمى، ثُمَّ عَادَ مَسَافَةً 6 m إِلَى الْخَلْفِ. كَمْ مِتْرًا يَبْعُدُ عَنِ الْمَرْمى؟

يُمْكِنُ إِيجَادُ بَعْدِ أَحْمَدٍ عَنِ الْمَرْمى بِجَمْعِ الْمَسَافَةِ الَّتِي رَكَضَ فِيهَا إِلَى الْأَمَامِ مَعَ
الْمَسَافَةِ الَّتِي رَكَضَ فِيهَا إِلَى الْخَلْفِ، وَيُمَثِّلُ الْعَدُدُ الْمُوجَبُ (+9) الْأَمْتَارَ الْمُقْطُوَّةَ
إِلَى الْأَمَامِ، وَيُمَثِّلُ الْعَدُدُ السَّالِبُ (-6) الْأَمْتَارَ الْمُقْطُوَّةَ إِلَى الْخَلْفِ، بَدْءًا بِالْمَرْمى؛

أَيْ إِنَّ الْمَطْلُوبَ إِيجَادُهُ هُوَ: $9 + (-6)$

إِشَارَتَا الْعَدَدَيْنِ 9 وَ -6 مُخْتَلِفَاتِانِ. إِذَنْ:

$$|9| - |-6| = 9 - 6 = 3$$

$$9 + (-6) = +3$$

أَطْرُحُ القيمة المطلقة الصغرى من القيمة المطلقة الكبيرة

أَضْصُعُ إِشَارةَ الْعَدَدِ الَّذِي قِيمَتُهُ المطلقةُ أَكْبَرُ

إِذَنْ، بَعْدِ أَحْمَدَ عَنِ الْمَرْمى هُوَ 3 m

أتحقق من فهمي:

غوص: غاصَتْ فَرْحَ مَسَافَةً 9 m تَحْتَ سَطْحِ الْبَحْرِ، ثُمَّ شَاهَدَتْ سَمَكَةً تَعْلُو هَا رَأْسِيًّا مَسَافَةً 5 m، فَتَوَجَّهَتْ إِلَيْهَا. كَمْ مِتْرًا سَتَبْعُدُ فَرْحَ عَنْ سَطْحِ الْبَحْرِ عِنْدَمَا تَصِلُّ الْمَكَانَ الَّذِي تَوَجَّدُ فِيهِ السَّمَكَةُ؟

أتدرّب

وأحل المسائل

إرشاد

إِذَا جُمِعَ عَدَدَانِ صَحِيحَانِ
بِاسْتِعْمَالِ قِطْعَ الْعَدَدِ، وَكَانَ عَدَدُ
الْقِطْعَ السَّالِبَةِ أَكْبَرُ مِنْ عَدَدِ
الْقِطْعَ الْمُوجَبَةِ، فَإِنَّ الْمَجْمُوعَ
يَكُونُ سَالِبًا، وَالْعَكْسُ صَحِيقُ.


$$\begin{array}{r} 1 \quad -1 \\ -1 \end{array} + \begin{array}{rr} -1 & -1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \quad +1 \\ +1 \end{array} + \begin{array}{rrrr} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{array}$$


الوحدة ١

أمثل كل جملة جمٌّع مِمَّا يُاتِي عَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ، ثُمَّ أَجِدُ نَاتِجَهَا:


3) $-4 + (-3) =$



4) $4 + (-2) =$



5) $-5 + 2 =$



أَجِدُ نَاتِجَ الْجَمْعِ فِي كُلِّ مِمَّا يُاتِي:

6) $-11 + (-12) =$

7) $-9 + 30 =$

8) $2 + (-10) =$

9) $-32 + 15 =$

10) $-23 + (-45) =$

11) $11 + |3| =$

هَوَافِتُ: سَعَةُ ذَاكِرَةِ الْهَاتِفِ الْمَحْمُولِ لِخَالِدٍ GB 32، اسْتَعْمَلَ مِنْهَا 10 GB، ثُمَّ 3 لِسْتِجِيلِ صُورٍ وَمَقَاطِعٍ فِيدِيو لِأَحَدِ رُحْلَاتِهِ. أَعْبَرَ عَنْ تِلْكَ السَّاعَاتِ بِالْأَعْدَادِ الصَّحِيحَةِ ثُمَّ احْسَبْ كَمْ يَقِيَ مِنْ سَعَةِ ذَاكِرَةِ هَاتِفِهِ؟

12)

ما السُّؤَالُ؟: أَكْتُبْ مَسَأَلَةً يُمْكِنُ تَمْثِيلُهَا بِخَطِّ الْأَعْدَادِ الْمُجاوِرِ.

تَبْرِيرُ: أَصْعِدُ الْعَدَدَ الْمُنَاسِبَ فِي ، لِتُصْبِحَ الْجُمْلَاتُ الْأَتِيَّاتُ صَحِيحَاتٍ، مُبَرِّراً إِجَابَتِيَّ:

15) $12 + (-12) + \boxed{\quad} = 7$

16) $-12 + \boxed{\quad} + 3 = 9$

+3		+1
	0	
-1		

تَبْرِيرُ: فِي الْمُرَبِّعِ السُّحْرِيِّ الْمُجاوِرِ لِكُلِّ صَفٍّ، وَعَمُودٍ، وَقُطْرٍ الْمَجْمُوعِ نَفْسِهِ، أَمْلَأُ الْمَرْبَعَاتِ الصَّغِيرَةِ بِالْأَعْدَادِ الصَّحِيحَةِ الْمُنَاسِبَةِ، مُبَرِّراً إِجَابَتِيَّ.

تَحْدٌ: أَحْلُ الْمُعَادَلَةِ الْآتِيَّةِ: $x + 4 = 1$


كَيْفَ أَسْتَعْمِلُ خَطَّ الْأَعْدَادِ لِجَمِيعِ عَدَدِيْنِ صَحِيحَيْنِ؟



إِرشاد

إِذَا كَانَ الْأَعْدَادُ الثَّانِيَ في عِبَارَةِ الْجَمْعِ سَالِيَا، فَإِنَّهُ يَوْضُعُ مَعَ إِشَارَتِهِ دَاخِلَ قُوْسَيْنِ؛ لِتَمْيِيزِ مِنْ إِشَارَةِ الْجَمْعِ، مِثْلُ: $(-21) + (-15)$

مَهَارَاتُ التَّفْكِيرِ الْعُلْيَا



13)

14)

17)

18)

19)

طَرْحُ الْأَعْدَادِ الصَّحِيحَةِ

الهدف: أَسْتَعْمَلُ النَّمَادِيجِ لِطَرْحِ الْأَعْدَادِ الصَّحِيحَةِ.

يُمْكِنُ أَسْتَعْمَلُ النَّمَادِيجِ لِتَمْثِيلِ طَرْحِ عَدَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ مُتَشَابِهِيْنِ فِي الإِشَارَةِ. الْعَدَدُ الْمَطْرُوحُ مِنْهُ بِقِطَاعِ النَّمَادِيجِ، ثُمَّ أَحْذَفَ قِطَاعَ بَعْدِ الْمَطْرُوحِ.



نشاط 1

طَرْحُ عَدَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ مُتَشَابِهِيْنِ فِي الإِشَارَةِ

أَجِدْ نَاتِجَ كُلَّ مَمَّا يَأْتِي بِاسْتَعْمَالِ قِطَاعِ الْعَدَدِ:

1 $-4 - (-3)$

الخطوة 1 أَسْتَعْمَلُ الْقِطَاعَ لِتَمْثِيلِ الْعَدَدِ -4

$$-4 : \boxed{-1} \quad \boxed{-1} \quad \boxed{-1} \quad \boxed{-1}$$

الخطوة 2 أَحْذِفُ قِطَاعَ حَمْرَاءً لِتَمْثِيلِ

$$\text{طَرْحُ الْعَدَدِ } -3$$

$$-4 - (-3) : \boxed{-1} \quad \boxed{-1} \quad \boxed{-1}$$

اللَّاحِظُ وُجُودُ قِطْعَةٍ عَدَدٍ حَمْرَاءً وَاحِدَةٍ مُتَبَقِّيَّةٍ. إِذَنْ:

$$-4 - (-3) = \boxed{}$$

2 $5 - 9$

الخطوة 1 أَسْتَعْمَلُ قِطَاعَ الْعَدَدِ الزَّرْقاءَ لِتَمْثِيلِ الْعَدَدِ 5

$$5 : \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \quad \boxed{+1}$$

الخطوة 2 أَحْذِفُ قِطَاعَ زَرْقاءَ لِتَمْثِيلِ طَرْحِ الْعَدَدِ 9

بِمَا أَنَّهُ لَا يَوْجُدُ قِطَاعٌ عَدَدِيٌّ كافٍ لِحَذْفِ قِطَاعٍ عَدَدِيٍّ زَرْقاءً، وَاحْتَاجُ إِلَى 4 قِطَاعٍ أُخْرَى؛ أُضِيفَ 4 أَزْوَاجٍ صَفْرِيَّةٍ، ثُمَّ أَحْذَفَ 9 قِطَاعَ عَدَدِيَّ زَرْقاءَ.

$$\boxed{+1} \quad \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \quad \boxed{+1}$$

$$\boxed{-1} \quad \boxed{-1} \quad \boxed{-1} \quad \boxed{-1}$$

اللَّاحِظُ وُجُودُ قِطَاعَ حَمْرَاءً مُتَبَقِّيَّةٍ. إِذَنْ:

$$5 - 9 = \boxed{}$$

أَسْتَعْمَلُ الأَزْوَاجِ الصَّفْرِيَّةِ لِطَرْحِ عَدَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي الإِشَارَةِ.

طَرْحُ عَدَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي الإِشَارَةِ

أَجِدْ نَاتِجَ: $5 - (-2)$


الخطوة 1 أَسْتَعْمَلُ قِطَاعَ الْعَدَدِ الزَّرْقاءَ لِتَمْثِيلِ الْعَدَدِ 5

$$5 : \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \quad \boxed{+1} \quad \boxed{+1}$$

الوحدة 1



الخطوة 2 أضيف أزواجًا صفريةً بعد القطع التي تمثل العدد المطروح، أي أضيف زوجين صفريين (لن يؤثر ذلك في العدد الأول).



ألاحظ وجود قطع عدد زرقاء متباعدة. إذن:

$$5 - (-2) = \boxed{\quad}$$

أحلل النتائج:

1

ماذا تمثل القطع المتبقية بعد حذف الأزواج الصفرية؟

2

لماذا لا تُستعمل الأزواج الصفرية عند طرح الأعداد الصحيحة المتشابهة في الإشارة؟

اتدرّب



1

كيف أستعمل النماذج لإيجاد ناتج: $5 - 2$ ؟

2

أستعمل النماذج لأكمل الثلاثة أعداد التالية في النمط أدناه:

$$23, 14, 5, \boxed{\quad}, \boxed{\quad}, \boxed{\quad}$$

طَرْحُ الْأَعْدَادِ الصَّحِيحةِ

4

الدرس

فكرة الدرس

أَطْرَحْ عَدَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ.



AWA2B
LEARN 2 BE

أَسْتَكْشِفُ

تَرْفَعُ أَنَابِيبُ مَعْدِنِيَّةٍ مَعْلَقَةً بِرَافِعَةٍ مَسَافَةً 20 m عَنْ سَطْحِ الْأَرْضِ. مَا الْمَسَافَةُ الرَّأْسِيَّةُ الَّتِي سَتَقْطَعُهَا الْأَنَابِيبُ عِنْدَمَا تُنْزَلُ لَهَا الرَّأْفَعَةُ، وَتَضَعُهَا فِي قَاعِ حُفْرَةٍ عُمُقُهَا 10 m؟

$$5 - 6 = -1$$

المُعْكُوسُ

$$5 + (-6) = -1$$

النَّاتِجُ نَفْسُهُ

إِطْرَاحُ عَدَدٍ صَحِيحٍ، أَجْمَعُ مَعْكُوسَهُ، فَيَكُونُ النَّاتِجُ هُوَ نَفْسُهُ:

$$a - b = a + (-b)$$

يُبَيِّنُ الْمِثَالُ الْأَتِي كَيْفِيَّةً إِيجَادِ نَاتِجِ الطَّرْحِ عِنْدَمَا يَكُونُ الْمَطْرُوحُ عَدَدًا مُوجِبًا.

مَثَلٌ 1

أَجِدْ نَاتِجَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي، ثُمَّ أَنْهَقُ مِنْ صِحَّةِ الْحَلِّ بِاسْتِعْمَالِ خَطِّ الْأَعْدَادِ:

1 6 - 9

أَجْمَعُ مَعْكُوسَ الْعَدَدِ 9 بَدَلًا مِنْ طَرْحِ الْعَدَدِ 9:


$$6 - 9 = 6 + (-9)$$

$$= -3$$

مَعْكُوسُ الْعَدَدِ 9 هُوَ -9

أُبْسِطُ

أَنْهَقُ: أَسْتَعْمِلُ خَطَّ الْأَعْدَادِ.



الوحدة 1

1 -8 - 2


أجمع معكوس العدد 2 بدلاً من طرح العدد 2:

$$\begin{aligned}-8 - 2 &= -8 + (-2) \\&= -10\end{aligned}$$

معكوس العدد 2 هو -2
أبسط

أتحرك وحدتين إلى اليسار لتمثيل معكوس العدد الثاني (-2) حتى أصل إلى العدد -10

أبدأ من العدد 0، ثم أتحرك 8 وحدات إلى اليسار لتمثيل العدد الأول (-8)



$$-8 - 2 = -10$$

أتحقق: أستعمل خط الأعداد.

أتحقق من فهمي:

أجد ناتج كل مما يأتي، ثم أتحقق من صحة الحل باستعمال خط الأعداد:

2 3 - 7

3 -1 - 5

يمكن أيضاً طرح عدد سالب بجمع معكوسه كما في المثال الآتي.

مثال 2

أجد ناتج كل مما يأتي، ثم أتحقق من صحة الحل باستعمال خط الأعداد:

1 $2 - (-4)$

أجمع معكوس العدد -4 بدلاً من طرح العدد -4:

$$\begin{aligned}2 - (-4) &= 2 + 4 \\&= 6\end{aligned}$$

معكوس العدد -4 هو 4
أبسط

أبدأ من العدد 0، ثم أتحرك 4 وحدات إلى اليمين لتمثيل معكوس العدد (-4) حتى أصل إلى العدد 6

أتحرك 4 وحدات إلى اليمين لتمثيل معكوس العدد (-4) حتى أصل إلى العدد 6



$$2 - (-4) = 6$$

أتحقق: أستعمل خط الأعداد.

2

$$-5 - (-3)$$

أجمع ممكوس العدد 3 - بدلاً من طرح العدد 3:


$$-5 - (-3) = -5 + 3$$

$$= -2$$

ممكوس العدد 3 هو

أبسط

اتحقق: أستعمل خط الأعداد.



3

$$7 - (-9)$$

4

$$-4 - 1$$

اتتحقق من فهمي:



أجد ناتج كُلِّ ممّا يأتي، ثُمَّ أتحقق من صحة الحل باستعمال خط الأعداد:

مثال 3: من الحياة



إذا كان متوسط درجة الحرارة على سطح الأرض 15° سلسليوس، ومتوسط درجة الحرارة على سطح كوكب المريخ -50° سلسليوس، فما الفرق بين متوسط درجتي الحرارة؟ لإيجاد الفرق بين متوسط درجتي الحرارة، أو: $(-50) - 15$ ، أجمع ممكوس العدد -50 بدلاً من طرح العدد -50 :

$$15 - (-50) = 15 + 50$$

$$= 65$$

ممكوس العدد -50 هو

أبسط

إذن، الفرق بين متوسط درجتي الحرارة هو 65° سلسليوس.

اتتحقق من فهمي:



آثار: عشر عالم آثار على جمجمة بشرية على عمق 220 cm تحت سطح الأرض. إذا كان قد وجد عظم ساق على ارتفاع 75 cm فوق الجمجمة وعظمة يد أسفل عظم الساق بـ 36 cm ، ف Gund أي عمق من سطح الأرض كانت عظمة اليد؟


الوحدة 1

أَتَدْرِيْ وَأَحَلُّ الْمَسَائِلَ




أُمِثِّلُ كُلَّ جُمْلَةً طُرْحٍ مِمَّا يَأْتِي عَلَى خَطٍّ الْأَعْدَادِ، ثُمَّ أَجِدُ نَاتِجَهَا:


1 $-4 - 3$




2 $1 - (-3)$



3 $-3 - (-3)$



4 $2 - (-5)$



أَجِدُ نَاتِجَ الْطَرْحِ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

5 $-23 - 18$

6 $-16 - (-45)$

7 $88 - 20$

8 $78 - (-15)$

9 $-7 - |8|$

10 $| -20 | - (-47)$



تَنَوَّحُ دَرَجَاتُ الْحَرَارةِ عَلَى سَطْحِ الْقَمَرِ بَيْنَ 130°C وَ -150°C ، مَا الْفَرْقُ بَيْنَ دَرَجَاتِ الْحَرَارةِ الْعَظِيمِ وَالصَّغِيرِ؟

11

الْأَنْوَارُ
الْحُرْفُ C هُوَ اخْتِصَارٌ لِلْكَلِمَةِ الْإِنْجِلِيزِيَّةِ (Celsius) الَّتِي تَعْنِي دَرَجَةَ الْحَرَارةِ بِالسَّلْسِيلِيَّوْنِ.

أَجِدُ مِقْدَارَ التَّغْيِيرِ فِي دَرَجَةِ الْحَرَارةِ أَوْ مِقْدَارَ التَّغْيِيرِ فِي الارتفاعِ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

13 مِنْ 42 m إِلَى 135 m

14 مِنْ 36°C إِلَى 20°C

15 مِنْ 65 cm إِلَى 175 cm

16 مِنْ 16°C إِلَى 70°C

إِرْشَاد

مِقْدَارُ التَّغْيِيرِ يُسَاوِي نَاتِجَ طَرْحِ الْقِيمَةِ الإِبْتَدَائِيَّةِ مِنَ الْقِيمَةِ النَّهَايِيَّةِ.

تجارة: تَعْمَلُ لَيْلَى فِي مَجَالِ التِّجَارَةِ. إِذَا رَبَحَتْ 5000 دِينَارٍ فِي صَفْقَةٍ تِجَارِيَّةٍ، ثُمَّ خَسَرَتْ 9000 دِينَارٍ فِي صَفْقَةٍ أُخْرَى، فَكَمْ دِينَارًا كَانَ رِبْحُهَا أَوْ خَسَارُهَا؟

16

ادّخار: كَانَ فِي الْحِسَابِ الْبَنْكِيِّ لِمُحَمَّدٍ 295 دِينَارًا، سَحَبَ مِنْهَا 85 دِينَارًا. كَمْ دِينَارًا بَقَى فِي حِسَابِهِ؟

17

شَوَاطِئُ: حَمَرَ سَامِيٌّ وَرَشا حُفَرَتَيْنِ عَلَى الشَّاطَائِيِّ، عُمُقُ الْأَوْلَى 25 cm، وَعُمُقُ الْثَّانِيَّةِ 12 cm، أَجِدُ الْفَرْقَ بَيْنَ عُمُقِيِّ الْحُفَرَتَيْنِ.

18

إِذَا كَانَتْ 7 = $x - 12$ ، فَأَوْجَدْ قِيمَةً كُلَّ مِمَّا يَأْتِي:

19) $x - y$

20) $2y - (x)$

اخْتِيَارٌ مِنْ مُنَعَّدٍ: يَيْلُغُ ارْتِفَاعُ قِمَةٍ مُنْحَدِرٍ يُطْلُّ عَلَى الْبَحْرِ 125 m فَوْقَ مُسْتَوِيِّ سَطْحِ الْبَحْرِ. سَقَطَتْ صَخْرَةٌ مِنْ قِمَةِ الْمُنْحَدِرِ، ثُمَّ اسْتَقَرَّتْ عَلَى عُمُقِ 14 m أَسْفَلَ سَطْحِ الْبَحْرِ. عَبَرَ عَنِ التَّغَيُّرِ فِي ارْتِفَاعِ الصَّخْرَةِ.

21

- a) $-14 - 125$ b) $14 - 125$ c) $125 - 14$ d) $125 - (-14)$

مهارات التفكير العليا

أَكْتَشِفُ الْخَطَاً: أَرَادَتْ تَالَا إِيجَادَ قِيمَةَ الْمِقْدَارِ $(-5) - (-2)$ ، فَكَانَ حَلُّهَا كَمَا يَأْتِي:

$$\begin{aligned} -2 - (-5) &= -2 + (-5) \\ &= -7 \end{aligned}$$

أَكْتَشِفُ الْخَطَاً فِي حَلٌّ تَالَا، ثُمَّ أَصَحِّهُ.

تَبْرِيرُ: إِذَا كَانَ a عَدَدًا صَحِيحًا سَالِيًّا، وَ b عَدَدًا صَحِيحًا مُوجَبًا، فَأَخَذَّهُ إِذَا كَانَ نَاتِجُ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي مُوجَبًا أَمْ سَالِيًّا، مُبَرِّرًا إِجَابَتِي:

إرشاد

أَسْتَعْمَلُ مَمْلَةً عَدْدِيَّةً.

23) $a - b$

24) $b - a$

25) $|a| + |b|$

كَيْفَ أَسْتَعْمِلُ الْمَعْكُوسَ وَجَمْعَ الْأَعْدَادِ الصَّحِيحَةِ لِإِيجَادِ نَاتِجٍ مَسْأَلَةٍ طَرْحٌ عَدَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ؟

أَكْتُب

26

5

الدرس

استكشف



وَقَفَتْ غَوَّاصَةٌ عِنْدَ سَطْحِ الْمَاءِ، ثُمَّ بَدَأَتْ بِالِتَّرْوِيلِ إِلَى قَاعِ الْبَحْرِ بِسُرْعَةِ 6 m في الدِّقِيقَةِ الْوَاحِدَةِ. مَا الْعُمُقُ الَّذِي سَتَصْلُ إِلَيْهِ بَعْدَ 5 دَقَائِقٍ إِذَا غَاصَتْ بِالسُّرْعَةِ نَفْسَهَا؟

فكرة الدرس

أَضْرِبُ عَدَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ، وَأَقْسِمُهُمَا.



أَسْتَعْمِلُ تَرْتِيبَ الْعَمَلِيَّاتِ لِإِجْرَاءِ عَمَلِيَّاتِ حِسَابِيَّةٍ بَسِيِّطةٍ.

تعلَّمْتُ سَابِقًا أَنَّ عَمَلِيَّةَ الضَّرْبِ هِيَ عَمَلِيَّةٌ جَمْعٌ مُتَكَرِّرٌ. فَمِثَالًا:

$$3 \times (-2) = (-2) + (-2) + (-2)$$

$$= -6$$

يُمْكِنُ تَمْثِيلُ الْجَمْعِ الْمُتَكَرِّرِ بِالنَّمَادِيجِ، وَعَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ:



$$3 \times (-2) = -6$$

$$3 \times (-2) = -6$$

أَلَا حَظُّ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ نَاتِجَ ضَرْبِ عَدَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي الإِشَارَةِ يَكُونُ سَالِبًا؛ أَيْ إِنَّ:

$$\ominus \times \oplus = \ominus$$

ناتج ضرب عدد سالب في عدد موجب يساوي عدداً سالباً.

$$\oplus \times \ominus = \ominus$$

ناتج ضرب عدد موجب في عددة سالب يساوي عدداً سالباً.

مثال 1


أَجِدْ نَاتِجَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي، ثُمَّ أُمَّثِلُهُ عَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ:

1

$$-5 \times 3$$

$$-5 \times 3 = -15$$


الْعَدَدَانِ مُخْتَلِفَانِ فِي الإِشَارَةِ، إِذَنْ، نَاتِجُ الضَّرْبِ سَالِبٌ:



2 $3 \times (-4)$

$$3 \times (-4) = -12$$

العددين مختلفان في الإشارة. إذن، ناتج الضرب سالب:



أتحقق من فهمي:


3

4 $9 \times (-8)$

أتعلم

مَعْكُوسُ $3 \times (-5)$ هُوَ
 $-(3 \times -5)$
أو $-3 \times (-5)$

يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ مَعْكُوسِ نَاتِجِ ضَرْبِ عَدَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي الإِشَارَةِ لِإِيْجَادِ نَاتِجِ ضَرْبِ عَدَدَيْنِ مُتَشَابِهَيْنِ فِي الإِشَارَةِ.



ألاَّ حَظُّ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ نَاتِجَ ضَرْبِ عَدَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ مُتَشَابِهَيْنِ فِي الإِشَارَةِ يَكُونُ مُوجِبًا؛ أَيْ إِنَّ:

$$\oplus \times \oplus = \oplus \quad \text{ناتج ضرب عدد موجب في عدد موجب يساوي عدداً موجباً.}$$

$$\ominus \times \ominus = \oplus \quad \text{ناتج ضرب عدد سالب في عدد سالب يساوي عدداً موجباً.}$$

مثال 2

أَجِدُّ نَاتِجَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

1 $-3 \times (-12)$

$$-3 \times (-12) = 36$$

العددان لها الإشارة نفسها. إذن، ناتج الضرب موجب

الوحدة 1

2 5×11

$$5 \times 11 = 55$$

العدّادان لهم إشارةٌ نفسُها. إذن، ناتج الضرب موجبٌ

3 $(-6)^2$

$$\begin{aligned} (-6)^2 &= (-6) \times (-6) \\ &= 36 \end{aligned}$$

تعريف مربع العدد
ناتج الضرب موجبٌ

4 $-2 \times (-1) \times (-4)$

$$\begin{aligned} -2 \times (-1) \times (-4) &= [-2 \times (-1)] \times (-4) \\ &= 2 \times (-4) \\ &= (-8) \end{aligned}$$

خاصيّة التّجميّع
أبْدأ العمليّة داخل الأقواسِ
 $2 \times (-4) = -8$

أتحققُ من فهمي:



5 $-8 \times (-13)$

6 $9 \times (-8)$

7 $-7 \times (-2) \times (-3)$

يمكنُ استعمال حِقائقِ الضربِ والقسمة المترابطة لإيجاد ناتج قسمة عددين صحيحين.

فمثلاً، لإيجاد ناتج $8 \div 8 = -40 \div 8$ ، أستعمل حِقائقِ الضربِ كما في المخطط الآتي:

$$8 \times (-5) = -40 \longrightarrow -40 \div 8 = -5$$

إشاراتان مختلفتان \rightarrow ناتج القسمة سالبٌ

الاحظُ مما سبقَ أنَّ ناتج قسمة عددين صحيحين مختلفين في الإشارة يكونُ سالباً؛ أي إنَّ:

$$\ominus \div \oplus = \ominus$$

ناتج قسمة عدد سالب على عدٍدٍ موجبٍ يساوي عدداً سالباً.

$$\oplus \div \ominus = \ominus$$

ناتج قسمة عدد موجب على عدٍدٍ سالبٍ يساوي عدداً سالباً.

مثال 3

أَجِدُّ ناتِجَّ كُلُّ مِمَّا يَأْتِي:

1 $-20 \div 5$

$$-20 \div 5 = -4$$

الْعَدَادُ الصَّحِيحُانِ مُخْتَلِفٌ فِي الْإِشَارَةِ، إِذَنْ، ناتِجُ الْقِسْمَةِ سَالِبٌ

2 $24 \div (-3)$

$$24 \div (-3) = -8$$


الْعَدَادُ الصَّحِيحُانِ مُخْتَلِفٌ فِي الْإِشَارَةِ، إِذَنْ، ناتِجُ الْقِسْمَةِ سَالِبٌ

أَتَحْقِقُ مِنْ فَهْمِي:

3 $64 \div (-8)$

4 $-56 \div 7$

يُمْكِنُ أَيْضًا اسْتِعْمَالُ خَصَائِصِ الْصَّرْبِ وَالْقِسْمَةِ لِإِيجَادِ ناتِجِ قِسْمَةِ الْأَعْدَادِ الصَّحِيقَةِ الْمُتَشَابِهَةِ فِي الْإِشَارَةِ، بِعَيْنِ لَا يَكُونُ الْمَقْسُومُ عَلَيْهِ صِفَرًا. فَمَثَلًا، لِإِيجَادِ ناتِجِ $(-8) \div -40$ ، أَسْتَعْمَلُ حَقَائِقَ الْصَّرْبِ كَمَا فِي الشَّكْلِ الْآتِي:



أَلَاحِظُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ ناتِجَ قِسْمَةِ عَدَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ مُتَشَابِهَيْنِ فِي الْإِشَارَةِ يَكُونُ مُوجِبًا؛ أَيْ إِنَّ:

$$\oplus \div \oplus = \oplus$$

ناتِجُ قِسْمَةِ عَدَدٍ مُوجِبٍ عَلَى عَدَدٍ مُوجِبٍ يُسَاوِي عَدَدًا مُوجِبًا.

$$\ominus \div \ominus = \oplus$$

ناتِجُ قِسْمَةِ عَدَدٍ سَالِبٍ عَلَى عَدَدٍ سَالِبٍ يُسَاوِي عَدَدًا مُوجِبًا.

مثال 4

أَجِدُّ ناتِجَّ كُلُّ مِمَّا يَأْتِي:

1 $-44 \div (-11)$

$$-44 \div (-11) = 4$$

الْعَدَادُ كُلُّهُمَا إِشَارَةٌ تَنْفُسُهَا. إِذَنْ، ناتِجُ الْقِسْمَةِ مُوجِبٌ

2 $42 \div 7$

$$42 \div 7 = 6$$

الْعَدَادُ كُلُّهُمَا إِشَارَةٌ تَنْفُسُهَا. إِذَنْ، ناتِجُ الْقِسْمَةِ مُوجِبٌ

الوحدة 1

3 $-6 \div (-3) \times 5$

$$\begin{aligned} -6 \div (-3) \times 5 &= [-6 \div (-3)] \times 5 \\ &= 2 \times 5 \\ &= 10 \end{aligned}$$

أقسم أولاً

أضرب ناتج القسمة 2 في 5

أكتب الناتج

4 $48 \div 6 \times (-2 \times 2)$

$$\begin{aligned} 48 \div 6 \times (-2 \times 2) &= 48 \div 6 \times (-4) \\ &= 8 \times (-4) \\ &= -32 \end{aligned}$$

أبدأ بالعملية داخل الأقواس

أضرب ناتج القسمة 8 في (-4)

أكتب الناتج

تحقق من فهمي:


5 $-48 \div (-4)$

6 $49 \div 7 \times (-7)$

7 $64 \div 4(2 - 4)$

8 $8 - 4(2 + 5^2) \div 12$

مثال 5: من الحياة



أسماك: يُبيّن التمثيل البياني المُجاوِر لـ العمق التقريري (بالأمتار) الذي تعيش فيه بعض الأسماك. أجد مُعَدَّل (الوسط الحسابي) لهذه الأعماق.

الأعماق التي تعيش فيها هذه الأسماك هي:

$$-90, -45, -10, -15, -65$$


مُعَدَّل العُمُق (\bar{x}) هو مجموع الأعماق مقسوماً على عددها.

$$\bar{x} = \frac{(-65) + (-15) + (-10) + (-45) + (-90)}{5}$$

$$\bar{x} = \frac{-225}{5} = -45$$

أي إن مُعَدَّل الأعماق التي تعيش فيها هذه الأسماك يساوي -45

تحقق من فهمي:



كيمياء: أثناء تفاعل كيميائي، انخفضت درجة الحرارة في الدورق كل دقيقة بنفس عدد الدرجات. إذا كانت درجة الحرارة 40 درجة سيلسيوس في الساعة 10:10 صباحاً، وبحلول الساعة 10:42 صباحاً، انخفضت درجة الحرارة إلى 24 درجة سيلسيوس. فما مُعَدَّل التغيير في درجة الحرارة كل دقيقة؟


أَتْدِرُبْ

وأَحْدُلُ الْمَسَائِلَ




أُمِّثِلْ كُلَّ جُمْلَةٍ ضَرْبٌ مِمَّا يَأْتِي عَلَى خَطٍّ الْأَعْدَادِ، ثُمَّ أَجِدُ النَّاتِجَ:


1 -4×4



2 $3 \times (-2)$



3 $-3 \times |-35|$



4 1×7



أَجِدُ نَاتِجَ الضَّرْبِ أَوِ الْقِسْمَةَ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

5 $-30 \times (-4)$

6 $54 \div (-9)$

7 $22 \times (-3)$

8 $60 \div (-4)$

9 $-6 \times 3 \times (-1)$

10 $(-80 \div 8 \times 2^2)$

11 $6 \times (-6)^2 + 7$

12 $36 \div (-6) \times (7 - 3)$

نُقُودُ: تُسْحِبْتْ شَادِيَة 120 دِينَارًا مِنْ حِسَابِهَا الْبَنْكِي شَهْرِيًّا، أَعْبَرْتْ عَنْ عَمَلِيَّةِ السُّحْبِ بِعَدْدٍ صَحِيقٍ، ثُمَّ أَكْتَبْتِ جُمْلَةَ الضَّرْبِ الَّتِي تَمْثِلُ مَجْمُوعَ السُّحْبِ فِي 8 أَشْهُرٍ، مِبْرًا إِجَابِيًّا.



أَنْزَلَ الْعَلَمَاءُ غَوَّاصَةً تَحْتَ الْمَاءِ فِي الْمُحِيطِ الْهَادِئِ لِرَصْدِ دَرَجَةٍ حَرَارَةِ الْمَاءِ. كَانَ الرَّصْدُ الْأَوَّلُ عَلَى عُمْقِ 25 m تَحْتَ مُسْتَوِي سَطْحِ الْبَحْرِ، ثُمَّ أُجْرِيَ مَزِيدُ مِنْ عَمَلِيَّاتِ الرَّصْدِ كُلَّ 25 m حَتَّى وَصَلَّتِ الْغَوَّاصَةُ إِلَى قَاعِ الْمُحِيطِ. أَجِدُ عُمَقَ الْغَوَّاصَةِ عِنْدَ إِجْرَاءِ الرَّصْدِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ.

13

14

مَعْلَوْمَة

تَمْكِنُ الْعَلَمَاءُ مِنِ الْوَصْلِ إِلَى أَعْمَاقِ الْمُحِيطِ الْهَادِئِ، حِيثُ وَصَلُوا إِلَى عُمَقِ 11 km عَنْ سَطْحِ الْكُرْبَةِ الْأَرْضِيَّةِ.

الوحدة 1

أسهم: اشتري عمر يوم الأحد أسهمًا من سوق المال بقيمة JD 500 ، وخلال بقية أيام الأسبوع سجلت أرباحه وخسائره كما في الجدول أدناه:

الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الاثنين
ربح JD 10	خسارة JD 23	خسارة JD 18	ربح JD 15

إرشاد

إذا ضرب أي عدد صحيح في صفر كان الناتج صفرًا، وإذا ضرب أي عدد صحيح في 1 كان الناتج العدد نفسه.

ما قيمة أسهم عمر في نهاية الأسبوع؟

أجد معدل أرباح (خسائر) عمر اليومية لـ أيام الأربعاء.

إذا كانت $-6 = z$ ، $12 = y$ ، $-2 = x$ ، فأجد قيمة كلٌّ من:

17 $y \div x$

18 $\frac{x \times z}{-y}$

19 $\frac{-2y + 6z}{x}$

أنسخ الجدول التالي، ثم أكمله.

15

16

20

21

مهارات التفكير العليا

استعمل الجدول السابق لأكتب قاعدة لإشارة ناتج ضرب أكثر من عددين صحيحين.

أبحث عن نمطٍ: أكمل الحدود الثلاثة التالية في كل نمطٍ مما يأتي:

22 $-3, +9, -27, +81, \dots$

23 $+256, -128, +64, -32, \dots$

اكتشف المحتوى: أحدد المقدار المختلف عن المقادير الثلاثة الأخرى، مبررًا إجابتي:

$-40 \div 8$

$-32 \div (-4)$

$12 \div (-3)$

$-22 \div 2$

24

25

26

27

تبrier: استعمل الأعداد الصحيحة: $-2, -5, +9, -8, +2, +5$ لإيجاد العدددين الصحيحين اللذين ناتج ضربهما هو الأعلى؟ أببر إجابتي.

تحد: أجد حل المعادلة $3x = -12$


أكتب متى يكون ناتج الضرب أو القسمة لعددين صحيحين موجباً؟ متى يكون سالياً؟ أعزز إجابتي بأمثلة.

اختبار الودعة

أَصْحَى دائِرَةً حَوْلَ رَمْزِ الإِجَابَةِ الصَّحِيحةِ فِي مَا يَأْتِي:

أيُّ الْآتِيَّةُ هُوَ تمثيل جُملَةَ الْجَمْعِ $-2 + (-2)$ عَلَى خطِ الأَعْدَادِ؟

خط الأعداد؟



أيُّ الْآتِيَّةُ الصَّحِيحةُ التَّالِيَّةُ مَرْتَبَةُ مِنَ الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ؟

- a) $-11, -9, -6, 17, 20$
- b) $-11, 9, -6, 17, 20$
- c) $-6, -9, -11, 17, 20$
- d) $20, 17, 6, -9, -11$

أيُّ الْآتِيَّةُ لِهِ القيمة المُطْلَقةُ الأَكْبَرُ؟

- a) $3 - (-1)$
- b) $4 - 5$
- c) $-3 - (-1)$
- d) $-4 - 5$

الْعِبَارَةُ الصَّحِيحةُ مِمَّا يَأْتِي هِيَ:

- a) $7 - 3 = 3 - 7$
- b) $7 - 3 > 3 - 7$
- c) $7 - 3 < 3 - 7$
- d) $7 - 3 = -4$

نَاتِجُ ضَرْبِ $0 \times (-5) \times 2$ هُوَ:

5

- a) 10
- b) 7
- c) 0
- d) -10

6

الْعِبَارَةُ غَيْرُ الصَّحِيحةِ مِمَّا يَأْتِي هِيَ:

- a) $-7 + (-6) = -13$
- b) $-5 + 1 = -4$
- c) $2 + (-1) = -1$
- d) $8 + (-9) = -1$

الْعِبَارَةُ الَّتِي نَاتَّجُهُا عَدَدٌ مُوجِّبٌ هِيَ:

7

- a) $-10 \div 2$
- b) $-10 \div -(-2)$
- c) $\frac{-10}{-2}$
- d) $-\frac{10}{-2}$

الْعِبَارَةُ الَّتِي تُكَافِئُ -4 هِيَ:

8

- a) $8 \div 2$
- b) $-\frac{16}{4}$
- c) $-2 \times (-2)$
- d) -4×1



الْعَدَدُ الَّذِي يُسَاوِي مَعْكُوسَهُ هُوَ:

9

- a) 1
- b) 0
- c) $\frac{1}{2}$
- d) 4

ما قياس درجة الحرارة الجديدة في كل ميزان
مما يلي بعد أن؟

10



تُصْبِحَ 3 أَمْثَالٍ مَا هِيَ عَلَيْهِ.

تَنْخَضُ بِمِقْدَارٍ 6°C .

الوحدة 1

إذا كانت درجة الحرارة 15°C ، فانخفضت 8°C ، فإن

جملة الجمع التي تعبّر عن درجة الحرارة النهائية هي:

a) $15 + (+8) = 9$

b) $8 + (+15) = 23$

c) $8 + (-15) = -7$

d) $15 + (-8) = +7$

أي الآتي ناتجه يساوي ناتج جمع $(-4) + (-2)$:

a) $-2 - (-4)$

b) $-2 + 4$

c) $-4 + (-2)$

d) $-4 - (-2)$

جملة الضرب التي ناتجها لا يساوي ناتج ضرب $(-6) \times 6$ هي:


a) -6×6

b) $9 \times (-4)$

c) -12×3

d) -8×4

تحلق طائرة على ارتفاع 10000 m ، إذا أراد الطيار الهبوط إلى الارتفاع الموضح في الرسم أدناه. استعمل الأعداد الصحيحة لتجد كم متراً يجب أن تهبط الطائرة؟



17

أربّب الأعداد $10, 15, 8, -15, -23, -12$ من

الأصغر إلى الأكبر.

11

قفز مظلي: هبط مظلي بمعدل 4 m في الثانية تقريباً بعد فتحه المظلة. أين سيكون المظلي بعد 6 ثوانٍ بالنسبة إلى موقع فتح المظلة؟

12

درجات الحرارة: في متصف الليل كانت درجة الحرارة 2°C ، وعند الساعة 5 a.m. انخفضت بمقدار 4°C ، ثم ارتفعت وقت الظهر بمقدار 9°C . ما درجة الحرارة وقت الظهر؟

13

في الشكل المجاور، إذا كان مجموع العددين في كل مسنتيليين متجاورين يساوي العدد في المسintel فوهما، فأكمل الشكل بالأعداد الصحيحة المناسبة.

14

عدد إذا أضيف إلى 7 - كان الناتج 29 ، ما هو العدد؟ وما ناتج قسمة هذا العدد على -9 ، ثم ضرب الناتج في -6 ؟

15

تدريب على الاختبارات الدولية:

أي الحالات الآتية يمكن تمثيلها بمعكوس العدد 60 :

16

هبوط طائرة مسافة 60 m (a)

صعود معد مسافة 60 m (b)

عمر جدة أحـمـد 60 عاماً. (c)

إضافة 60 صورة إلى هاتفك المحمول. (d)

الوحدة 2

الكسور و العمليات عليها

ما أهمية هذه الوحدة؟

تُستعمل العمليات على الكسور العاديَّة في كثير من مجالات الحياة، مثل الموازين. فعندما أشتري $\frac{1}{2}$ kg من الكُنافَة التَّاعِمَة، وأستعمل $\frac{3}{4}$ kg من الكُنافَة الحَشِينَة، أستعمل عمليَّة الجمع لِأعْرِفَ عدَّة الكيلوغرامات التي اشتَرَيْتها، ثم أضربُ هذا العدَّ في سعر الكيلوغرام الواحد لِأعْرِفَ الثمن الذي سأدفعُه في الحياة الْيَوْمِيَّة.



سأتعلَّم في هذه الوحدة:

- جمع الكسور و طرحها بأكثَر مِن طرِيقَةٍ.
- جمع الأَعْدَاد الْكَسْرِيَّة و طرحها.
- ضرب الكسور والأَعْدَاد الْكَسْرِيَّة و قسمتها بأكثَر مِن طرِيقَةٍ.
- حل مسائل حَيَاتِيَّةٍ عن الكسور والأَعْدَاد الْكَسْرِيَّة.

تعلَّمت سابقًا:

- ✓ ماهيَّة الكسور المُنْتَكَافِئَة، وإيجادها.
- ✓ جمع كسرَيْن مقام أحدهما مضاعف لِمقام الكسر الآخر، وطرحهما.
- ✓ ضرب كسرٍ في عدَّد كُلِّي، وقسمتهما.
- ✓ حل مسائل حَيَاتِيَّةٍ عن الكسور والأَعْدَاد الْكَسْرِيَّة.

مشروع الوحدة: السجاد والكسور



أَحْسِبْ مُحيطَ كُل سجّادَةٍ بِاسْتِعْمَالِ مَجْمُوعِ أَطْوَالِ الأَصْلَاعِ.

6

أَحْسِبْ مِسَاخَةَ كُل سجّادَةٍ بِاسْتِعْمَالِ قانُونِ الْمِسَاخَةِ.

7

أَسْأَلُ أَحَدَ وَالِدَيَّ عَنْ ثَمَنِ كُل سجّادَةٍ، ثُمَّ أَكْتُبْ الشَّمَنَ.

8

أَحْسِبْ ثَمَنَ الْمِتْرِ الْمُرَبَّعِ الْواحِدِ لِكُل سجّادَةٍ بِقِسْمَةِ ثَمَنِهَا عَلَى مِسَاخَتِهَا.

9

عرض النتائج:

أَعْرِضْ مَعَ أَفْرَادِ مَجْمُوعَتِي أَمَامَ زُمَلَائِي فِي الصَّفَّ الْبَيَانَاتِ الَّتِي جَمَعْنَاها.

1

أَكْتُبْ مَعَ أَفْرَادِ مَجْمُوعَتِي تَقْرِيرًا (يمكن اسْتِعْمَالُ

2

بَرْنَامِجِ مُعَالِجِ النُّصُوصِ (word) لِعَرْضِ

- جُدُولُ الْبَيَانَاتِ.

- الْحِسَابَاتِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الْخُطُوطِ (9-3).

- فَقْرَةً عَنْ طَرَائِقِ صِنَاعَةِ السَّجَادِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا.

- صُورَةً لِإِحْدَى السَّجَادَاتِ الَّتِي اسْتَعْمَلْنَاها.



أَسْتَعِدُ وَزُمَلَائِي لِتَفْعِيلِ مَشْرُوعِنَا الْخَاصِ الَّذِي نُطَبِّقُ فِيهِ مَا سَنَتَعَلَّمُهُ فِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ لِإِجْرَاءِ بَعْضِ الْعَمَلَياتِ الْحَسَابِيَّةِ عَلَى قِيَاسَاتِ السَّجَادِ.

خطوات تنفيذ المشروع:

أَدْوُنُ فِي الْجَدْوَلِ الْآتِي الْبَيَانَاتِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الْخُطُوطِ التَّالِيَّةِ:

رَقْمُ السَّجَادَةِ	الثَّمَنُ	الْعَرْضُ الْمُحِيطُ الْمِسَاخَةِ	ثَمَنُ الْمِتْرِ الْمُرَبَّعِ	نَمَنُ الْمِتْرِ
1				
2				
3				

أَخْتَارُ ثَلَاثَ سَجَادَاتٍ مُسْتَطِيلَةَ الشَّكْلِ أَوْ مُرَبَّعَةَ فِي مَنْزِلِي.

أَسْتَعْمِلُ شَرِيطَ الْقِيَاسِ لِقِيَاسِ طَوْلِ كُل سجّادَةٍ وَعَرْضِهَا بِالْأَمْتَارِ وَالسَّيْمِترَاتِ مِثْلِ: (1m, 75cm).

أَكْتُبْ الطَّوْلَ وَالْعَرْضَ لِكُل سجّادَةٍ بِالْأَمْتَارِ فِي صُورَةِ كُسُورٍ عَادِيَّةٍ، مِثْلِ:

$$(1m, 75cm = 1\frac{75}{100} = 1\frac{3}{4})$$

أَخْرِصُ عَلَى اخْتِيارِ سَجَادٍ أَبْعَادُهُ كُسُورٌ وَأَعْدَادٌ كَسْرِيَّةٌ.

جَمْعُ كَسْرٍ مَعَ كَسْرٍ.

الهدف: استعمال النماذج ولوحة الكسور المكافئة لإيجاد ناتج جمع كسرى غير متشابهين.

تعلمت سابقاً جمجمة كسرى متشابهين (لهما المقام نفسه)، ويمكنني استعمال النماذج ولوحة الكسور المكافئة لإيجاد ناتج جمجمة كسرى غير متشابهين أيضاً.



نشاط 1


استعمل النماذج ولوحة الكسور المكافئة لإيجاد ناتج: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

لأنّكَنَّ من جمجمة كسرى، يجب أن يكون الكسران متشابهين.

الخطوة 1 أجد ناتج جمجمة الكسرتين المكافئتين

للكسرتين $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ باستعمال النماذج.

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6}$$



مما سبق أجد أن ناتج: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ هو:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6}$$

الخطوة 1 أبحث في لوحة الكسور المكافئة عن

كسر مكافئ لـ $\frac{1}{3}$ ، وآخر مكافئ لـ $\frac{1}{2}$ ، ولهم المقام نفسه.

$$\text{الكسر المكافئ لـ } \frac{1}{2} \text{ هو: } \frac{1}{6}$$

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$				
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

$$\text{الكسر المكافئ لـ } \frac{1}{3} \text{ هو: } \frac{1}{6}$$

$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$			
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

أطلق النتائج:

ما العلاقة بين مقامي الكسرتين $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$ ، ومقامي الكسرتين $\frac{2}{6}$ و $\frac{3}{6}$ ؟

أصف كيف يمكن توحيد مقامي الكسرتين $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$ من دون استعمال النماذج لأنّكَنَّ من جمعهما.

1

2

أتدرب

استعمل النماذج ولوحة الكسور المكافئة لإيجاد ناتج كل مما يأتي:

1 $\frac{1}{4} + \frac{1}{2}$

2 $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$

3 $\frac{3}{5} - \frac{1}{2}$

3

جمع الكسور وطراحتها



استكشف

قطر القمر $\frac{1}{4}$ قطر الأرض تقريباً،
وقطر عطارد $\frac{2}{5}$ قطر الأرض تقريباً.
ما الفرق بين هذين الكسرتين؟

فكرة الدرس

أحد ناتج جمع الكسر وطراحتها في أبسط صورة.



تعلمت سابقاً جمع كسرتين متشابهتين وطراحتهما، وهما كسران مقاماهما متساويان. وللجمع كسرتين غير متشابهتين، أو حدد المقامين بالبحث عن المضاعف المشترك الأصغر لمقامي الكسرتين الأصليين، ثم أكتب الكسرتين بمقامين جديدين، كل منها يساوي المضاعف المشترك الأصغر لمقامي الكسرتين الأصليين.

مثال 1

أحد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة:

$$\textcircled{1} \quad \frac{3}{4} + \frac{3}{5}$$

الخطوة 1 أجد المضاعف المشترك الأصغر للمقامين 4 و 5 لجعل الكسرتين متشابهتين.

$$4 : 4, 8, 12, 16, \textcircled{20}$$

أكتب مضاعفات كل من

$$5 : 5, 10, 15, \textcircled{20}, 25$$

العددين 4 و 5

إرشاد

نستعمل حقائق الضرب للحصول على مضاعفات عدد.

إذن، المضاعف المشترك الأصغر يساوي 20

الخطوة 2 أوحد المقامين.


$$\frac{3}{4} + \frac{3}{5} = \frac{3 \times 5}{4 \times 5} + \frac{3 \times 4}{5 \times 4}$$

أضرب بسط ومقام $\frac{3}{4}$

$$= \frac{15}{20} + \frac{12}{20}$$

بالعدد 5 وأضرب بسط


ومقام $\frac{3}{5}$ بالعدد 4



الخطوة 3 أجمع البسطين، وأبقي المقامين.

$$\frac{15}{20} + \frac{12}{20} = \frac{15+12}{20} = \frac{27}{20}$$

أجمع الكسرتين الناتجين بجمع البسطين، والإبقاء على المقام



أكتب الناتج في صورة عدد كسري

$$\frac{3}{4} + \frac{3}{5} = 1 \frac{7}{20}$$

تحقق من فهمي:

2 $\frac{7}{9} + \frac{5}{6}$

3 $\frac{3}{8} + \frac{7}{12}$

مثلاً جمعت كسرَيْن غير متشابهَيْن يُمكِّنني طرح كسرَيْن غير متشابهَيْن، وذلك بتوحيد المقامين باستعمال المضاعف المشتركة الأصغر لهما.

مثال 2

أجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة:

1 $\frac{4}{5} - \frac{2}{3}$

الخطوة 1 أجد المضاعف المشترك الأصغر للمقامين 3 و 5 لجعل الكسرَيْن متشابهَيْن.

3 : 3 , 6 , 9 , 12 , 15

أكتب مضاعفات كل من

5 : 5 , 10 , 15 , 20 , 25


العددين 3 و 5

إذن، المضاعف المشترك الأصغر هو 15

الخطوة 2 أوحد المقامين.


$$\frac{4}{5} - \frac{2}{3} = \frac{4 \times 3}{5 \times 3} - \frac{2 \times 5}{3 \times 5}$$

أوحد المقامين



$$= \frac{12}{15} - \frac{10}{15}$$


أضرب



الوحدة 2

الخطوة 3 أطرح البسطين، وابقى المقامين.

$$\frac{12}{15} - \frac{10}{15} = \frac{12-10}{15} = \frac{2}{15}$$




$$\frac{4}{5} - \frac{2}{3} = \frac{2}{15}$$

أتحقق من فهمي:

2) $\frac{1}{2} - \frac{4}{9}$

3) $\frac{3}{8} - \frac{1}{6}$

استعمل جمجم الكسور العادي وطرحها في كثير من المواقف الحياتية، مثل المكاييل.



مثال 3: من الحياة

اكواب قياسية: استعملت علية اكواباً قياسية لكيمل $\frac{3}{4}$ كوب من زيت جوز الهند، ثم قررت إنفاص $\frac{1}{3}$ كوب من الكمية المكيلة. ما كمية زيت جوز الهند المكيلة؟

لحساب الكمية المكيلة، أطرح الكسر $\frac{1}{3}$ من الكسر $\frac{3}{4}$:

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} - \frac{1 \times 4}{3 \times 4}$$

$$= \frac{9}{12} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}$$

أو حدد المقامين بإيجاد المضاعف المشتركة الأصغر لها

أطرح البسطين

إذن، كمية زيت جوز الهند المكيلة تساوي $\frac{5}{12}$ كوب.

أتحقق من فهمي:



سطح الأرض: تمثل مياه المحيطات $\frac{17}{25}$ من سطح الكره الأرضية، وتتمثل المياه من مصادر أخرى $\frac{3}{100}$ من سطحها. ما المساحة التي تشغله المياه من سطح الأرض؟

أَتْدِرِبُ وأَهْلُ الْمَسَائِلَ

أَجِدُّ نَاتِجَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ:

1) $\frac{1}{2} + \frac{7}{9}$

2) $\frac{19}{21} - \frac{5}{6}$

3) $\frac{7}{12} - \frac{4}{9}$

4) $\frac{3}{4} + \frac{3}{10}$

5) $\frac{11}{28} - \frac{3}{8}$

6) $\frac{5}{6} + \frac{1}{4}$

أنهار: مَيْعَنْ نَهَرِ الْفُرَاتِ فِي تُرْكِيَا، لِكُنَّهُ يَمْرُّ بِسُورِيَا وَالْعَرَاقِ. إِذَا كَانَ $\frac{1}{5}$ النَّهَرِ فِي سُورِيَا، وَ $\frac{1}{3}$ النَّهَرِ فِي الْعَرَاقِ، فَمَا الْكَسْرُ الَّذِي يُمَثِّلُ مِقْدَارَ طُولِ النَّهَرِ الْمَارِ بِكُلِّ مِنْ سُورِيَا وَالْعَرَاقِ؟

تَحْطِيطُ: أَكْنَهْتُ سَلْمِي حَلَّ وَاجِبَاتِهِ الْمَدْرِسِيَّةِ فِي $\frac{8}{9}$ سَاعَةٍ، وَهُوَ أَقْلَى مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي خَطَطَتْ لَهُ بِ $\frac{1}{4}$ سَاعَةٍ. مَا الزَّمَنُ الَّذِي خَطَطَتْ سَلْمِي أَنْ تُنْهِيَ وَاجِبَاتِهِ فِيهِ؟

أَحْلِ كُلِّ مِنْ الْمَعَادِلَتَيْنِ الْآتِيَتِينِ:

9) $x + \frac{4}{9} = \frac{5}{6}$

10) $\frac{7}{10} - x = \frac{1}{4}$

مَغْلُوْفَةٌ

يَنْبَعُ نَهَرُ الْفُرَاتِ مِنْ جِبَالِ طُورُوْسِ فِي تُرْكِيَا، وَيَجْرِي لِيَمْرُّ فِي سُورِيَا، ثُمَّ الْعَرَاقَ، حِيثُ يَلْتَقِي بِنَهَرِ دَجلَةَ هَنَاكَ؛ لِيَكُونَ شَطَّ الْعَرَبِ الَّذِي يَصْبِبُ فِي الْخَلِيجِ الْعَرَبِيِّ.

تَحْدِدُ: أَمْلَأُ الْفَرَاغَ بِمَا هُوَ مُنَاسِبٌ:

$$\frac{\boxed{}}{18} - \frac{1}{\boxed{}} = \frac{16}{36}$$

مَهَارَاتُ التَّفْكِيرِ الْعُلَيَا

تَحْدِدُ: أَجِدُّ نَاتِجَ ما يَأْتِي:

$$\frac{1}{8} + \frac{3}{4} + \frac{5}{12} =$$

أَكْتَشِفُ الْحَكْمَةَ: قَالَ خَالِدٌ إِنَّ $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ ، أَكْتَشِفْ خَطأَ خَالِدَ وَأَصْحِحْهُ.

أَبْرُرُ إِجَابَتِيِّيِّ.

إِرْشَادٌ

أَجِدْ مَضَاعِفَاتِ الْمَقَامِ الْأَكْبَرِ
(12) حَتَّى أَصْلَلَ لِمَضَاعِفَ
مُشَتَّرِكٍ أَصْغَرٍ مَعِ الْمَقَامِيْنِ 4 وَ 8

أَكْتَبْ كَيْفَ أَجْمَعْ كَسْرِيْنِ غَيْرِ مَتَشَابِهِيْنِ؟

جمع الأعداد الكسرية وطردها



استكشف

يحتوي كُل مئة غرام من حليب الغنم على $\frac{10}{25}$ g من البروتين، في حين تحتوي الكتلة نفسها من حليب البقر على $\frac{1}{5}$ g من البروتين. كم غراما من البروتين يزيد حليب الغنم على حليب البقر في كل مئة غرام؟

فكرة الدرس

أجد ناتج جمع الأعداد الكسرية وطريها في أبسط صورة.

لجمع عددين كسريين، أوحد مقام الكسرتين أولاً، ثم أجمع العددان الكليين، ثم أجمع الكسرين.

مثال 1


أجد ناتج كُل مما يأتي في أبسط صورة:

$$1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{3}$$

الخطوة 1 أوحد مقام الكسرتين، ثم أجمعهما.

$$1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{3} = 1 + \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{3}$$


يتكون $1\frac{1}{3}$ و $1\frac{1}{2}$ من أعداد كليلة وكسر



$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} - \frac{1 \times 2}{3 \times 2}$$

أوحد مقامي الكسرتين باستعمال المضاعف المشتركة الأصغر

$$= \frac{3}{6} + \frac{2}{6}$$




$$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6}$$

أجمع الكسرتين الناتجين

$$\frac{5}{6}$$

الخطوة 2 أجمع العددان الكليين مع الكسر الناتج.


$$1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{3} = 1 + 1 + \frac{5}{6} = 2\frac{5}{6}$$




$$1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{3} = 1 + 1 + \frac{5}{6} = 2\frac{5}{6}$$

2 $\frac{1}{3} + 1 \frac{4}{5}$

الخطوة 1 أُوْحِدْ مَقَامَيِ الْكَسْرَيْنِ، ثُمَّ أَجْمَعُهُمَا.



يَتَكَوَّنُ $1 \frac{4}{5}$ مِنْ
أَعْدَادِ كُلْيَّةٍ وَكُسُورٍ




$$\frac{1}{3} + \frac{4}{5} = \frac{1 \times 5}{3 \times 5} - \frac{4 \times 3}{5 \times 3}$$

أُوْحِدْ مَقَامَيِ الْكَسْرَيْنِ

$$= \frac{5}{15} + \frac{12}{15} = \frac{17}{15}$$

أَجْمَعُ الْكَسْرَيْنِ النَّاتِجَيْنِ



الخطوة 2 أُحَوِّلُ الْكَسْرَ غَيْرَ الْفَعْلِيِّ النَّاتِجَ مِنْ جَمْعِ الْكَسْرَيْنِ إِلَى عَدَدٍ كَسِيرٍ.

$$\frac{17}{15} = \frac{15 + 2}{15} = \frac{15}{15} + \frac{2}{15}$$


أُحَوِّلُ الْكَسْرَ غَيْرَ الْفَعْلِيِّ النَّاتِجَ إِلَى عَدَدٍ كَسِيرٍ

$$= 1 \frac{2}{15}$$

الخطوة 3 أَجْمَعُ الْعَدَدَيْنِ الْكُلْيَّيْنِ مَعَ الْجُزْءِ الْكَسِيرِيِّ النَّاتِجِ.

$$2 + 1 + 1 \frac{2}{15} = 4 \frac{2}{15}$$

$$2 \frac{1}{3} + 1 \frac{4}{5} = 4 \frac{2}{15}$$



الوحدة 2

أتحققُ من فهمي:



3 $3 \frac{1}{6} + 2 \frac{3}{4}$

4 $2 \frac{3}{7} + 1 \frac{2}{3}$

لِطَرْحِ عَدَدَيْنِ كَسْرَيْنِ، أَحَوّلُ كُلَّاً مِنْهُمَا إِلَى كَسْرٍ غَيْرِ فِعْلِيٍّ، ثُمَّ أُوَحِّدُ مَقَامَيِ الْكَسْرَيْنِ النَّاتِجَيْنِ، ثُمَّ أَطْرُحُ، ثُمَّ أَكْتُبُ النَّاتِجَ فِي صُورَةِ عَدَدٍ كَسْرٍ إِنْ احْتَاجَ الْأَمْرُ.



1 $2 \frac{3}{4} - 1 \frac{5}{6}$



الخطوة 1 أَحَوّلُ الْأَعْدَادَ الْكَسْرِيَّةَ إِلَى كُسُورٍ غَيْرِ فِعْلِيَّةٍ.

$$2 \frac{3}{4} = 1 + 1 + \frac{3}{4}$$

$$= \frac{11}{4}$$

$$1 \frac{5}{6} = 1 + \frac{5}{6}$$


$$= \frac{11}{6}$$



الخطوة 2 أُوَحِّدُ مَقَامَيِ الْكَسْرَيْنِ غَيْرِ الْفِعْلِيَّيْنِ.

$$\frac{11}{4} - \frac{11}{6} = \frac{11 \times 3}{4 \times 3} - \frac{11 \times 2}{6 \times 2}$$


$$= \frac{33}{12} - \frac{22}{12}$$



الخطوة 3 أَطْرُحُ الْبَسْطَيْنِ، وَأَبْقِيُ الْمَقَامَيْنِ.

$$\frac{33}{12} - \frac{22}{12} = \frac{33 - 22}{12}$$

$$= \frac{11}{12}$$



أتحقق من فهمي:

2 $2\frac{3}{10} - 1\frac{5}{6}$

3 $10\frac{5}{6} - 7\frac{3}{10}$

أَسْتَعْمِل جَمْعَ الْأَعْدَادِ الْكَسْرِيَّةَ وَطَرْحَهَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاقِفِ الْحَيَاتِيَّةِ.

مثال 3: من الحياة



أَبْحَاثُ: تُعد طالبة جامعية بحثاً حول التصحر فقرأ她 مقالاتٍ مِنْ شَبَكَةِ الإِنْتَرْنِتِ مُدَّةً 3 ساعاتٍ، ثُمَّ قَرَأَتْ كُتُبًا تُفِيدُهَا فِي بَحْثِهَا مُدَّةً $\frac{1}{4}$ ساعَةٍ. بِكَمْ ساعَةٍ يَزِيدُ زَمْنُ قِرَاءَتِهَا الْكُتُبَ؟

لِإِيجَادِ مِقْدَارِ الرِّيَادَةِ، أَطْرُحُ: $3 - 2\frac{1}{4}$

$$3 - 2\frac{1}{4} = \frac{3}{1} - \frac{9}{4}$$

أَكْتُبُ الْعَدَدَ 3 وَالْعَدَدَ الْكَسْرِيَّ $\frac{1}{4}$ 2 في صورَةِ كُسُورٍ غَيْرِ فَعَلَيَّةٍ

أُوَحدُ المُقامَيْنِ

$$= \frac{12}{4} - \frac{9}{4}$$

$$= \frac{3}{4}$$

أَطْرُحُ الْكَسْرَيْنِ

إِذْنُ، يَزِيدُ زَمْنُ قِرَاءَتِهَا الْمَقَالَاتِ عَلَى زَمْنِ قِرَاءَتِهَا الْكُتُبَ $\frac{3}{4}$ ساعَةٍ.

أتحقق من فهمي:



حَيَوانَاتُ: الْإِمْپَراطُورُ تامارين حَيَوانٌ غَرِيبٌ وَنَادِرٌ جِدًّا، وَهُوَ مِنَ الْقِرَادَةِ الصَّغِيرَةِ؛ إِذْ يَلْعُجُ طُولُ جِسْمِهِ $23\frac{3}{4}$ cm، وَطُولُ ذَيْلِهِ $35\frac{5}{8}$ cm، ما طُولُ هَذَا الْحَيَانِ مَعَ ذَيْلِهِ؟

الوحدة 2

أَتَدْرِبُ وَأَهْلُ الْمَسَائِلَ



أَتَذَكّرُ

أوْحَدُ المَقَامَاتِ لِلْحَصُولِ عَلَى
كَسْرَيْنِ مُتَشَابِهِنِ قَبْلِ الْجَمْعِ
وَالْطَّرْحِ.

1 $1 \frac{1}{6} + 2 \frac{3}{8}$

2 $2 \frac{1}{14} - \frac{3}{4}$

3 $32 + 15 \frac{16}{17}$

4 $9 \frac{1}{8} + \frac{3}{10}$

5 $2 \frac{3}{7} + 11 \frac{30}{49}$

6 $65 + 100 \frac{1}{2}$

7 $3 \frac{2}{9} - 2 \frac{1}{12}$

8 $20 - 8 \frac{1}{3}$



مُهْبَرَاتُ: فِي مُهْبَرِ الْمَدْرَسَةِ سُلْكٌ حَرَارِيٌّ طُولُهُ $3 \frac{1}{4} \text{ m}$

اسْتَعْمَلَ طَلَبَةُ الصَّفَّ السَّادِسِ $\frac{5}{6} \text{ m}$ 1 مِنْهُ فِي إِحْدَى التَّجَارِبِ.

كَمْ مِتْرًا يَبْقَى مِنَ السُّلْكِ؟

طَحِينٌ: اسْتَعْمَلَ خَبَازٌ $\frac{8}{9} \text{ kg}$ 10 مِنَ الطَّحِينِ الْأَبْيَضِ، وَ $\frac{5}{6} \text{ kg}$ 20 مِنَ الطَّحِينِ
الْأَسْمَرِ لِصُنْعِ مَخْبُوزَاتِهِ. مَا كَمِيَّةُ الطَّحِينِ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا الْخَبَازُ؟



الخليّة	كميّة العسل بالكيلوغرام
A	$23 \frac{5}{8}$
B	?

عَسَلٌ: جَمَعَ أَحْمَدُ كَمِيَّةً مِنَ الْعَسَلِ مِنَ الْخَلِيَّةِ B تَزَيَّدُ عَلَى الْكَمِيَّةِ الَّتِي جَمَعَهَا مِنَ الْخَلِيَّةِ A بِمِقْدَارِ $3 \frac{3}{4} \text{ kg}$, مُعْتَمِدًا عَلَى الجَدْوَلِ الْمُجاوِرِ, أَجِدُ كَمِيَّةَ الْعَسَلِ الَّتِي جَمَعَهَا أَحْمَدُ مِنَ الْخَلِيَّةِ B.

9

فَغْلَوَةٌ

السُّلْكُ الْحَرَارِيُّ مُوصَلُ فِلِزِيُّ
يُولَدُ حَرَازَةً عِنْدَ مُرْوِرِ تَيَارٍ
كَهْرَبَائِيٌّ خِلَالَهُ، وَيُسْتَعْمَلُ
فِي أَجْهِزَةِ التَّسْخِينِ، مِثْلِ:
مُحَمَّصَاتِ الْحُبْزِ، وَمُجَفَّفَاتِ
الشَّعْرِ.

10

11

12

تَحْدِيدٌ: أَسْتَعْمِلُ الْأَرْقَامَ: 2، 3، 4، 5، 6، 7 لِتُصْبِحَ الْعِبَارَةُ الْأَتِيَّةُ صَحِيحَةً:

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = 5\frac{1}{12}$$

13

LEARN 2 BE

تَحْدِيدٌ: إِذَا جُمِعَتْ $\frac{5}{6}$ مَعَ عَدْدٍ كَسْرِيٍّ آخَرَ كَانَ النَّاتِجُ $\frac{1}{4}$ ، مَا هُذَا الْعَدْدُ؟

14

تَحْدِيدٌ: أَجِدُ نَاتِجَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ:

15 $1\frac{1}{8} + 3\frac{5}{16} + 2\frac{1}{4}$

16 $2\frac{8}{9} - 1\frac{3}{6} + 1\frac{13}{36}$

تَحْدِيدٌ: أَخْتَارُ مِنَ الْكُسُورِ وَالْأَعْدَادِ الْكَسْرِيَّةِ الْأَتِيَّةِ كَسْرَيْنِ يُحَقِّقَانِ الْمَطْلُوبَ فِي السُّؤَالَيْنِ أَدْنَاهُ:

$1\frac{4}{5}$

$\frac{3}{4}$

$2\frac{1}{2}$

$\frac{5}{6}$

$3\frac{1}{7}$

$\frac{3}{8}$

أَكْبَرُ مَجْمُوعٍ مُمْكِنٍ، مَعَ إِيجَادِ نَاتِجِ الْجَمْعِ.

17

أَقْلَى نَاتِجٍ طَرْحٍ، مَعَ إِيجَادِ النَّاتِجِ.

18

تَبْرِيرٌ: أَيُّ نَاتِجٍ الْجَمْلَتَيْنِ الْأَتِيَتَيْنِ أَكْبَرُ دُونَ إِجْرَاءِ الْعَمَلِيَّاتِ، مُبَرِّرًا إِجَابَتِيَّ:

$2\frac{2}{5} + 3\frac{5}{6} + \frac{3}{4}$

$7\frac{7}{8} - 1\frac{5}{12} - 1\frac{1}{3}$

إِرشاد

مقارنة الأعداد الكليلة في الأعداد الكسرية، ومقارنة الكسور فيها باستعمال قيمة مرجعية وهي النصف تساعد في مقارنة النواتج دون إجراء العمليات.

19

كَيْفَ أَطْرَحُ عَدَدَيْنِ كَسْرِيَّيْنِ مُقاَمَا الْكَسَرَيْنِ فِيهِمَا مُخْتَلِفَانِ؟



20

ضرب كسر في كسر

الهدف: استعمال النماذج لإيجاد ناتج ضرب كسرين.

تعلمت سابقاً ضرب عدد كلي في كسر، ويمكّنني أيضاً استعمال النماذج لضرب كسرين.


نشاط 1

استعمل النماذج لإيجاد ناتج: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$

تعني: كم نصف الثلث؟ ولإيجاده، أتبع الخطوات الآتية:

الخطوة 1 أمثل $\frac{1}{3}$


أقسم المُستطيل إلى 3 أجزاء متساوية، ثم أظلل أحدها.



الشكل كاملاً مقسم إلى 6 أجزاء متساوية، وهذا يعني أنَّ

الجزء الواحد يساوي

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$



أحل النتائج:

ما علاقه بسطي الكسرتين $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ و مقاميهما ببسط الكسر الناتج ($\frac{1}{6}$) و مقامه؟

كيف يمكن إيجاد ناتج: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ من دون استعمال نموذج؟

1 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$

2 $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$

3

أكتب جملة الضرب التي يمثلها النموذج أدناه، ثم أجد ناتجها.



أتدرب



استعمل النماذج لإيجاد ناتج كل مما يأتي:

3

ضرب الكسور

الدرس



استكشف

إذا كان $\frac{9}{10}$ من كتلة الخليفة ماء، فما كتلة الماء في بطيخة صغيرة كتلتها $\frac{6}{7} \text{ kg}$ ؟

فكرة الدرس

أجد ناتج ضرب الكسور في أبسط صورة.



تعلمت في النشاط المفاهيمي السابق كيفية ضرب كسرٍ بـ كسرٍ باستعمال النماذج، والآن سأتعلم كيفية ضرب كسرٍ بـ كسرٍ من دون استعمال النماذج.

ضرب الكسور

مفهوم أساسى



- بالكلمات** لضرب كسرٍ، أضرب البسطين، ثم أضرب المقامين.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d}, \text{ حيث } b \neq d \text{ لا يساويان صفرًا.}$$

$$\frac{7}{8} \times \frac{3}{11} = \frac{7 \times 3}{8 \times 11} = \frac{21}{88}$$

- بالرموز**

- مثال**

مثال 1

أجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة:

$$1 \quad \frac{1}{4} \times \frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1 \times 2}{4 \times 3}$$

$$= \frac{1}{12} \frac{2}{6}$$

$$= \frac{1}{6}$$

أضرب البسطين، ثم أضرب المقامين

أبسط الكسر الناتج يقسم بسهولة ومقامه على 2

أبسط صورة

أذكر

الاختصار هو قسمة البسط والمقام على العامل المشترك بينهما.

يكون الكسر في أبسط صورة إذا كان العامل المشترك الأكبر بين بسطه ومقامه يساوي 1



أتحقق من فهمي:

$$2 \quad \frac{7}{10} \times \frac{3}{8}$$

$$3 \quad \frac{1}{9} \times \frac{3}{4}$$

$$4 \quad \frac{5}{6} \times \frac{2}{11}$$

الوحدة 2

أمثلة

العامل المشترك بين عددين هو عدد يقسم كلاً منها.

يمكنني الاختصار قبل إجراء عملية الضرب عندما وجود عامل مشترك بين البسط والمقام.

مثال 2

أجد ناتج ما يأتي في أبسط صورة:

1 $\frac{8}{13} \times \frac{3}{4}$

$$\frac{8}{13} \times \frac{3}{4} = \frac{\cancel{8}^2}{\cancel{13}^1} \times \frac{3}{\cancel{4}^1}$$

$$= \frac{2 \times 3}{13 \times 1} = \frac{6}{13}$$

أبسط بقسمة البسط والمقام على 4

أضرب البسطين، ثم أضرب المقامين

تحقق من فهمي:

2 $\frac{2}{9} \times \frac{3}{7}$

3 $\frac{5}{21} \times \frac{14}{17}$

4 $\frac{11}{30} \times \frac{20}{8}$



مثال 3: من الحياة



صناعة الغراء: صنعت عبير غراء لاصقا في المنزل باستعمال $\frac{2}{5}$ kg من الطحين الأبيض، وكمية من السكر تعادل $\frac{1}{2}$ كمية الطحين، والقليل من الخل الأبيض. كم كيلوغراما استعملت عبير من السكر لصنع الغراء اللاصق؟

كمية السكر $\frac{1}{2}$ كمية الطحين، إذن، أضرب $\frac{1}{2}$ في $\frac{2}{5}$:

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{\cancel{2}^1} \times \frac{\cancel{2}^1}{5}$$

أبسط بقسمة البسط والمقام على 2

$$= \frac{1}{5}$$

أكتب ناتج الضرب

إذن استعملت عبير $\frac{1}{5}$ kg من السكر لصنع الغراء اللاصق.



تحقق من فهمي:



سرعة الصوت: سرعة الصوت في الماء أكبر من سرعته في الهواء؛ إذ يقطع في الثانية الواحدة

داخل الماء $\frac{37}{25}$ km، كم كيلومتراً يقطع في $\frac{5}{6}$ الثانية؟

أتدرب وأحل المسائل



أتذكر

الاختصار قبل الضرب، يسهل إجراء عملية الضرب.

1 $\frac{6}{7} \times \frac{5}{12}$

2 $\frac{2}{27} \times \frac{18}{21}$

3 $\frac{7}{100} \times \frac{25}{49}$

4 $\frac{11}{300} \times \frac{150}{121}$

5 $\frac{6}{19} \times \frac{3}{42}$

6 $\frac{5}{48} \times \frac{32}{33}$

7 $\frac{21}{36} \times \frac{24}{35}$

8 $\frac{9}{13} \times \frac{13}{81}$



طبيعة: سُلْطَانِيَّةُ الْعُشْبِ الْأَسْيَوِيَّةُ طول جَسَدِه $\frac{1}{3}$ طول ذَيلِه. إذا كانَ طولَ ذَيلِها $m \text{ m}$ ، فَكُمْ يَلْغُ طولُ جَسَدِه؟

9

طَائِرٌ قَوْسِ الْقُزْحِ: طول طَائِرٍ قَوْسِ الْقُزْحِ $\frac{1}{2}$ طول بَيْغَاءِ الشَّمْسِ. كَمْ طول طَائِرٍ قَوْسِ الْقُزْحِ، إذا كان طول طَائِرٍ بَيْغَاءِ الشَّمْسِ $\frac{11}{36} \text{ m}$ ؟

10



طَائِرٌ قَوْسِ الْقُزْحِ



طَائِرٌ بَيْغَاءِ الشَّمْسِ

جُبرٌ: إذا كانت $x = \frac{15}{48}$ ، و $y = \frac{16}{25}$ ، فأجد قيمة xy في أبسط صورة، علماً بأنّ xy تعني حاصل ضرب x في y .

11




زراعة: بلَغَ إِنْتَاجُ مَرْعَةٍ مِنَ التُّفَاحِ $\frac{2}{30} \text{ ton}$ ، باعَ مِنْهَا الْمُزَارِعُ $\frac{3}{8}$ الْكَمِيَّةُ لِمَصَانِعِ إِنْتَاجِ خَلِ التُّفَاحِ. كَمْ طُنَّا من التفاح باعَ لِهَذِهِ الْمَصَانِعِ؟

12

معلومة

يمتلك خل التفاح عنصرا طبيعيا مُضاد للبكتيريا يُسمى البكتين، والذي يعمل على تخفيف أوجاع وألام الأمعاء.

الوحدة 2



زراعة: قطعة أرض مساحتها $\frac{7}{10}$ من الدونم، وهي مزروعة بصنفين من الأشجار كما في المخطط المجاور. كم دونماً يشغل كل صنف؟

13

معلومات

تحتل المملكة المرتبة الرابعة عرباً من حيث حجم انتاج الزيتون وثامناً على مستوى العالم، حيث بلغت أعداد أشجار الزيتون المزروعة حوالي 11 مليون شجرة.




مهارات التفكير العليا

تَحْدِيد: أجد ناتج كل مما يأتي:

14 $(\frac{1}{2} \times \frac{7}{8}) \times 2$

15 $(\frac{7}{6} - \frac{5}{6}) \times \frac{2}{3}$

16 $\frac{9}{10} \times (\frac{4}{9} + \frac{1}{3})$



17

مَسْأَلةٌ مَفْتوحة: أكتب جملة ضرب لكسرين، بحيث أختصر قبل إجراء عملية الضرب، ثم أجد ناتجها.

18

معلومات

استعمل حل مسألة أبسط واختصار الكسور قبل إجراء عملية الضرب للوصول إلى الناتج.

تَحْدِيد: أجد ناتج ما يأتي:

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} \times \dots \times \frac{99}{100}$$

تَحْدِيد: أجد ناتج ما يأتي في أبسط صورة:

$$\frac{7}{15} \times \frac{4}{7} \times \frac{5}{8}$$

19

20

21

22

أَكْتَشِفُ الْخَطاً: قالت مها إن $\frac{3}{4} \times \frac{1}{8} = \frac{3}{2}$ ، اكتشف الخطأ الذي وقع فيه منها، ثم أجد الحل الصحيح؟

أكتب كيف أضرب كسرين؟

ضرب كسر في عدد كسريٌّ

الهدف: استعمال النماذج لإيجاد ناتج ضرب كسر في عدد كسريٌّ.

يمكن استعمال النماذج لإيجاد ناتج ضرب كسر في عدد كسريٌّ.

نشاط 1

استعمل النماذج لإيجاد ناتج: $\frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{3}$

تعني: كم نصف العدد الكسري $\frac{1}{3}$ ؟ وإيجاده؛ أتبع الخطوات الآتية:

الخطوة 2 أكتب الكسر الناتج من تضليل

$$\frac{7}{3}$$

عدد الأجزاء التي يحويها كل شكل بعد التنصيف 6 إذن،

الكسر الناتج عن تضليل نصف $\frac{7}{3}$ هو:



$$\frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{3} = \frac{7}{6}$$


الخطوة 1 أمثل $\frac{1}{3}$ 2 أو $\frac{7}{3}$ بالنماذج.

أمثل $\frac{1}{3}$ 2 أو $\frac{7}{3}$ بالنماذج.



ثم أقسِّم الشكَل إلى نصفين برسِّم خطًّا أفقيًّا في متنصفه،

وأظلل نصف الكسر $\frac{7}{3}$ بلونٍ مختلفٍ.



$$\frac{1}{2} \times \frac{7}{3}$$

أحلل الناتج:


أعبر عن عملية الضرب السابقة جبرياً كما يلي:

$$\frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \times \frac{7}{3} = \frac{7}{6} = 1 \frac{1}{6}$$

1

أتدرُّب

أكتب جملة الضرب التي يمثلها النموذج المجاور:



1

استعمل النماذج لإيجاد ناتج كُلِّ مما يأتي:

2 $\frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{3}$

3 $\frac{1}{3} \times 2 \frac{1}{2}$

استكشف



قِمَّةُ جَبَلٍ تُوْبِقَالَ فِي الْمَغْرِبِ أَعْلَى الْقِمَمِ فِي الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ؛ إِذْ تَرْتَفَعُ $\frac{33}{200}$ km عَنْ سَطْحِ الْبَحْرِ، تَلِيهَا قِمَّةُ جَبَلٍ النَّبِيِّ يُونُسَ فِي فِلَسْطِينَ الَّتِي يَيْلُغُ ارْتِفَاعُهَا $\frac{22}{25}$ مِنْ ارْتِفَاعِ جَبَلٍ تُوْبِقَالَ. كَمْ كِيلُومِترًا تَرْتَفَعُ قِمَّةُ جَبَلٍ النَّبِيِّ يُونُسَ عَنْ سَطْحِ الْبَحْرِ؟

فكرة الدرس

أَجِدُّ نَاتِجَ ضَرْبِ الْأَعْدَادِ الْكَسْرِيَّةَ فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ بِطَرَائِقَ عِدَّةٍ.

تَعَلَّمْتُ فِي النَّشَاطِ الْمَفاهِيمِيِّ السَّابِقِ كَيْفِيَّةَ ضَرْبِ كَسْرٍ فِي عَدَدٍ كَسْرِيٍّ، وَالآنَ سَأَتَعَلَّمُ كَيْفِيَّةَ ضَرْبِ كَسْرٍ فِي عَدَدٍ كَسْرِيٍّ مِنْ دُونِ اسْتِعْمَالِ النَّمَادِيجِ، باسْتِعْمَالِ خَاصِيَّةِ التَّوزِيعِ.

مثال 1

أَجِدُّ نَاتِجَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ:

$$1 \quad \frac{3}{10} \times 5 \frac{1}{3}$$

$$\frac{3}{10} \times 5 \frac{1}{3} = \frac{3}{10} \times \left(5 + \frac{1}{3}\right)$$

$$= \left(\frac{3}{10} \times 5\right) + \left(\frac{3}{10} \times \frac{1}{3}\right)$$

$$= \left(\frac{3}{10} \times \frac{1}{1}\right) + \left(\frac{3}{10} \times \frac{1}{3}\right)$$

$$= \frac{3}{2} + \frac{1}{10}$$

$$= \frac{3 \times 5}{2 \times 5} + \frac{1}{10}$$

$$= \frac{15}{10} + \frac{1}{10} = \frac{16}{10}$$

$$= 1 \frac{6}{10} = 1 \frac{3}{5}$$

أَكْتُبُ الْعَدَدَ الْكَسْرِيَّ فِي صُورَةٍ مَجْمُوعِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ، وَكَسْرٍ

أُوْزِعُ الضَّرْبَ عَلَى الْجُمْعِ

أَكْتُبُ الْعَدَدَ الْكُلِّيَّ فِي صُورَةٍ كَسْرٍ غَيْرِ فِعْلِيٍّ مَقَامُهُ 1، ثُمَّ أَبْسِطُ

أَجِدُّ نَوَافِعَ الضَّرْبِ

أُوْحِدُ مَقَامَيِ الْكَسْرِيْنِ

أَجْمَعُ الْكَسْرَيْنِ

أَكْتُبُ النَّاتِجَ فِي صُورَةٍ عَدَدِ كَسْرِيٍّ فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ

أَتَحْقَقُ مِنْ فَهْمِيَّ:

$$2 \quad \frac{7}{9} \times 3 \frac{1}{7}$$

$$3 \quad 4 \frac{1}{5} \times \frac{5}{8}$$

يمكنني أيضاً إيجاد ناتج ضرب عددين كسريين بكتابه كل منهما في صورة كسر غير فعلي.

مثال 2

أجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة:

$$1 \frac{1}{3} \times 1 \frac{1}{4}$$

$$1 \frac{1}{3} \times 1 \frac{1}{4} = \frac{4}{3} \times \frac{5}{4}$$

$$= \frac{\cancel{4}}{3} \times \frac{5}{\cancel{4}}$$

$$= \frac{5}{3} = 1 \frac{2}{3}$$

أكتب كل عدد كسري في صورة كسر غير فعلي

أبسط

أضرب أكتب الناتج في صورة عدد كسري

تحقق من فهمي:

$$2 \quad 1 \frac{2}{9} \times 4 \frac{1}{2}$$

$$3 \quad 10 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{7}$$



استعمل ضرب الأعداد الكسرية في كثير من المواقف الحياتية.

مثال 3 من الحياة



اقمار: يدور القمر حول الأرض دورة كاملة في $\frac{1}{3}$ 27 يوماً. كم يوماً يستغرق القمر في الدوران $\frac{1}{9}$ دورة؟

لإيجاد عدد الأيام التي يستغرقها القمر في الدوران $\frac{1}{9}$ دورة حول الأرض، أضرب $\frac{1}{9}$ في زمان الدورة الكاملة، وهو $\frac{1}{3}$ 27 يوماً.

$$\frac{1}{9} \times 27 \frac{1}{3} = \frac{1}{9} \times (27 + \frac{1}{3})$$

أكتب العدد الكسري في صورة مجموع عدد كلي وكسر

$$= (\frac{1}{9} \times 27) + (\frac{1}{9} \times \frac{1}{3})$$

أوزع الضرب على الجمع

$$= (\frac{1}{9} \times \frac{27^3}{1}) + (\frac{1}{9} \times \frac{1}{3})$$

أكتب العدد الكلي في صورة كسر غير فعلي مقاوم 1، ثم أبسط

$$= \frac{3}{1} + \frac{1}{27} = 3 \frac{1}{27}$$

أجد نواتج الضرب، ثم أكتب الناتج في صورة عدد كسري

الوحدة 2

إذن، يسْتَغْرِقُ الْقَمَرُ 3 $\frac{1}{27}$ أَيَّامٍ لِيَدُورَ حَوْلَ الْأَرْضِ $\frac{1}{9}$ دُورَةً.



أتحقق من فهمي:

زراعة: اشتَرَى إِبْرَاهِيمُ عُلَيْهِ سَمَادٌ لِبَاتَاتِ الرِّيَّةِ، كُتِّبَ فِي إِرْشَادَاتِ اسْتِعْمَالِهَا $L = \frac{1}{20}$ مِنَ السَّمَادِ لِكُلِّ لِتْرٍ مَاءٍ. كم لِتْرًا مِنَ السَّمَادِ سَيَضَعُ فِي $L = \frac{1}{2}$ مِنَ الْمَاءِ؟



أتدرِّب وأحلُّ المسائل

أَجِدُ نَاتِجَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ:

1 $1\frac{3}{4} \times 5\frac{1}{7}$

2 $\frac{5}{12} \times 2\frac{5}{8}$

3 $7\frac{1}{5} \times \frac{5}{8}$

4 $3\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{7}$



5 $10 \times 8\frac{3}{8}$

6 $2\frac{5}{11} \times 33$

7 $40 \times \frac{11}{32}$

8 $\frac{1}{81} \times 54$

أَجِدُ مِسَاحَةَ كُلِّ مِنَ الْمُسَطَّيلِينِ الْآتَيْنِ:



وقود: مَا ثَمَنُ $L = 5\frac{3}{11}$ مِنَ الْوَقْدِ إِذَا كَانَ ثَمَنُ الْلِّتِرِ الْوَاحِدِ $\frac{22}{25}$ مِنَ الدِّينَارِ؟



أَجْنَةُ: يَتَضَاعِفُ طُولُ الْجَنِينِ سَرِيعًا، فَيُصِّبِّحُ طُولُهُ فِي الْأَسْبُوعِ الثَّانِي عَشَرَ $3\frac{3}{10}$ أَصْعَافِ طُولِهِ وَهُوَ فِي الْأَسْبُوعِ الثَّامِنِ. إِذَا كَانَ طُولُ جَنِينٍ فِي الْأَسْبُوعِ الثَّامِنِ $1\frac{3}{5}$ cm، فَكُمْ طُولُهُ فِي الْأَسْبُوعِ الثَّانِي عَشَرَ؟

معلومة

يأخذ الجنين في رحم الأم جميع ما يحتاجه من عناصر غذائية من جسدها، لذا عليها تناول غذاء متوازن.

11

12



إِذَا كَانَ $\frac{9}{10}$ مِنْ كُتْلَةِ الْبَطِّيْخَةِ مَاءً، فَمَا كُتْلَةُ الْمَاءِ فِي الْبَطِّيْخَةِ الْمُجَاوِرَةِ؟

13



هَنْدَسَة: صَمَمَ مُهَنْدِسٌ نَمَوْذَجًا لِسَيَّارَةٍ، طُولُهُ $\frac{1}{12}$ طُولِ السَّيَّارَةِ الْحَقِيقِيَّةِ. إِذَا كَانَ طُولُ السَّيَّارَةِ الْحَقِيقِيَّةِ كَمَا فِي الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ، فَمَا طُولُ النَّمَوْذَجِ؟

14

صِحَّة: يَحْتَوِي الْكِيلُوْغْرَامُ الْواحِدُ مِنْ سَمَكِ السَّلْمُونَ عَلَى $\frac{3}{5} g$ دَهْوَنٍ أُوْمِيْغَا 3، كَمْ غِرَامًا مِنَ الْأُوْمِيْغَا 3 فِي سَمَكَةِ مِنْ هَذَا التَّوْعِيْنِ كُتْلَتُهَا $\frac{4}{7} kg$ ؟

15

جُبْرٌ: إِذَا كَانَتْ $a = \frac{2}{3}$ ، وَ $b = 3 \frac{1}{2}$ ، وَ $c = 1 \frac{3}{4}$ ، فَأَجِدُ نَاتِجَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

16 ab

17 $\frac{1}{2} c$

18 cb

19 $\frac{1}{8} a$


مهارات التفكير العليا

تَحْدِيد: هَلْ الْعَبَارَةُ "نَاتِجٌ ضَرْبٌ عَدَدِيْنِ كَسْرِيْنِ أَقْلَى مِنْ 1" صَحِيحَةٌ دَائِمًا، أَمْ أَحْيَانًا، أَمْ غَيْرَ صَحِيحَةٌ أَبَدًا؟ أَبْرُرْ إِجَابَتِي بِكِتَابَةِ مِثَالٍ.

20

تَبْرِيرٌ: مِنْ دُونِ إِجْرَاءِ عَمَلِيَّةِ الضَّرْبِ، أَيُّ النَّقَاطِ: A , B , C , D هِيَ نَاتِجٌ؟
أَبْرُرْ إِجَابَتِي.

21



$3 \frac{1}{2} cm$



تَحْدِيد: إِذَا كَانَ مُحِيطُ الْمُسْتَطِيلِ الْمُجَاوِرِ $\frac{2}{5} cm$ 12، فَأَجِدُ مِسَاحَتَهُ.

22

جُمْلَةٌ مَفْتوَحَةٌ: أَمْلأُ الْفَرَاغَ فِي الْجُمْلَةِ الْأَيْتَمِيَّةِ بِمَا هُوَ مُنَاسِبٌ:

23

$$3 \frac{3}{4} \times \frac{2}{13} = 2$$

تَبْرِيرٌ: قَالَ هَيْمَمٌ إِنَّ نَاتِجَ $2 \frac{1}{5} \times 7 \frac{1}{4}$ هُوَ $14 \frac{1}{20}$ ، هَلْ قَوْلُهُ صَحِيحٌ؟ أَبْرُرْ إِجَابَتِي.

24

أَكْتَبْ: كَيْفَ أَجِدُ نَاتِجَ ضَرْبٌ عَدَدِ كَسْرِيٍّ فِي كَسْرٍ؟

25

مَعْلَوْمَة: تَعْدَ الأَسْمَاكُ الْمَصْدَرُ الْأَوَّلُ لِنَوْعٍ مِنَ الدُّهُونِ اسْمُهُ أُوْمِيْغَا 3، وَهِيَ ضَرُورِيَّةٌ لِبَنَاءِ خَلَايا الدَّمَاغِ وَصِحَّةِ الْقَلْبِ.



قسمة كسر على كسرٍ

الهدف: استعمال النماذج لإيجاد ناتج قسمة كسر على كسر.


تعلمت سابقاً كيفية جمجم الكسور وطريقها، والآن سأتعلم كيفية قسمة الكسور باستعمال النماذج.

نشاط 1



الخطوة 2 أكمل تقسيم الشكل إلى ستة أجزاء.

متساوية لتنتج الأسداس.




استعمل النماذج لإيجاد ناتج: $\frac{2}{3} \div \frac{1}{6}$

$\frac{2}{3} \div \frac{1}{6}$ تعنى: كم سدسًا في الثلثين؟ ولإيجاده، اتبع الخطوات الآتية:

الخطوة 1 أمثل $\frac{2}{3}$ بالنماذج.

أكتب الكسر الذي يمثل الجزء المظلل



الخطوة 3 أعد الأسداس في الثلثين.

عدد الأسداس في الثلثين يساوى

$$\frac{2}{3} \div \frac{1}{6} = \boxed{}$$

أحل النتائج:

ما العلاقة بين ناتج: $\frac{2}{3} \div \frac{1}{6}$ وناتج: $\frac{2}{1} \times \frac{6}{1}$ ؟ وما العلاقة بين $\frac{1}{6}$ و $\frac{6}{1}$ ؟

أصف كيف يمكن إيجاد ناتج: $\frac{2}{3} \div \frac{1}{6}$ من دون استعمال النماذج.


1

2

أتدرب



أكمل جملة القسمة التي تمثل النموذج:



$$\boxed{} \div \boxed{} = 10$$

1

استعمل نموذجاً لإيجاد ناتج كل ممّا يأتي:

2 $\frac{3}{4} \div \frac{1}{8}$

3 $\frac{2}{5} \div \frac{1}{10}$



فكرةُ الدرس

أَجِدُّ ناتِجَ قِسْمَةُ الْكُسُورِ فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ.

المُضْطَلَاحُ

مَقْلُوبُ الْكَسْرِ.



أَعَدَّ عَطَارٌ $\frac{3}{5}$ مِنْ زَيْتِ الرَّيْحَانِ الْكَافُورِيِّ
الَّذِي يُسْتَعْمَلُ بَدِيلًا عِلَاجِيًّا، ثُمَّ فَرَغَهُ فِي
قَوَارِيرٍ زُجَاجِيَّةٍ، سَعَةُ كُلِّ مِنْهَا $\frac{3}{200}$ كَمٌ
قَارُورًا اسْتَعْمَلَ لِذَلِكَ؟

LEARN 2 BE

يُمْكِنُ إِيجَادُ مَقْلُوبِ الْكَسْرِ (reciprocal) بِتَبَدِيلِ بَسْطِهِ وَمَقَامِهِ، وَنَاتِجَ ضَرِبِ الْكَسْرِ فِي مَقْلُوبِهِ يَسَاوِي 1

$$\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = \frac{ab}{ba} = 1, \text{ حِيثُ: } \frac{b}{a} \text{ هُوَ } \frac{a}{b} \text{ مَقْلُوبٌ}$$

مثال 1

أَجِدُّ مَقْلُوبَ $\frac{3}{7}$

1

$$\text{بِمَا أَنَّ } 1 = \frac{1}{12} \times 12, \text{ فَإِنَّ } \frac{3}{7} \text{ هُوَ مَقْلُوبٌ } \frac{3}{7} \times \frac{7}{3} = 1$$

أَجِدُّ مَقْلُوبَ 12

2

$$\text{بِمَا أَنَّ } 1 = \frac{1}{12} \times 12, \text{ فَإِنَّ } \frac{1}{12} \text{ هُوَ مَقْلُوبٌ 12}$$

أَتَدْقُقُ مِنْ فَهْمِي:

3 $\frac{1}{4}$

4 18

5 $\frac{2}{11}$

يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ الْمَقْلُوبِ لِإِيجَادِ ناتِجِ قِسْمَةِ كَسْرٍ عَلَى آخَرَ.

قِسْمَةُ الْكُسُورِ

مفهومٌ أَسَاسِيٌّ



- بالكلمات** لِإِيجَادِ ناتِجِ قِسْمَةِ كَسْرٍ عَلَى آخَرَ، أَضْرِبُ الْمَقْسُومَ فِي مَقْلُوبِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} \quad \bullet \quad \text{بالرموز}$$

حِيثُ b وَ c وَ d لَا تُساوِي صِفَرًا.

الوحدة 2

مثال 2

أَجِدُ ناتِجَ ما يَأْتِي في أَبْسَطِ صورَةٍ:

1) $\frac{3}{5} \div \frac{1}{7}$

$$\begin{aligned}\frac{3}{5} \div \frac{1}{7} &= \frac{3}{5} \times \frac{7}{1} \\ &= \frac{21}{5} \\ &= 4\frac{1}{5}\end{aligned}$$

أَضْرِبُ فِي مَقْلُوبِ الْمُقْسُومِ عَلَيْهِ

أَجِدُ النَّاتِجَ بِضَرِبِ الْبَيْسِطِينَ وَضَرِبِ الْمَاقِمِينَ

أَكْتُبُ النَّاتِجَ فِي صُورَةِ عَدَدٍ كَسْرِيٍّ

الذكْر

الْكَسْرُ غَيْرُ الْفَعْلِيٌّ هُوَ كَسْرٌ
بَسْطُهُ أَكْبَرُ مِنْ مَقَامِهِ.

أَتَحْقِقُ مِنْ فَهْمِي:

2) $\frac{4}{9} \div \frac{3}{5}$

3) $\frac{7}{11} \div \frac{2}{3}$

يُمْكِنُنِي الْإِخْتِصارُ قَبْلَ إِيجادِ ناتِجِ الْقِسْمَةِ عِنْدَ وُجُودِ عَامِلٍ مُشَارِكٍ بَيْنَ الْبَيْسِطِ وَالْمَاقِمِ فِي خُطْوَةِ الضَّرِبِ فِي الْمَقْلُوبِ.

مثال 3

أَجِدُ ناتِجَ ما يَأْتِي في أَبْسَطِ صورَةٍ:

1) $\frac{8}{21} \div \frac{4}{7}$

$$\frac{8}{21} \div \frac{4}{7} = \frac{8}{21} \times \frac{7}{4}$$

$$= \frac{8}{21} \times \frac{\cancel{7}}{\cancel{4}}^1$$

$$= \frac{\cancel{8}}{3} \times \frac{\cancel{7}}{1}^1 = \frac{2}{3}$$

أَضْرِبُ فِي مَقْلُوبِ الْمُقْسُومِ عَلَيْهِ، أي $\frac{7}{4}$

أَبْسَطُ بِقِسْمَةٍ كُلُّ مِنْ 7 وَ 21 عَلَى الْعَامِلِ الْمُشَارِكِ الأَكْبَرِ 7

أَبْسَطُ بِقِسْمَةٍ كُلُّ مِنْ 4 وَ 8 عَلَى الْعَامِلِ الْمُشَارِكِ الأَكْبَرِ 4، ثُمَّ أَجِدُ النَّاتِجَ

أَتَحْقِقُ مِنْ فَهْمِي:

2) $\frac{5}{36} \div \frac{20}{81}$

3) $\frac{7}{11} \div \frac{21}{22}$

أَسْتَعْمِلُ قِسْمَةَ الْكُسُورِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاقِفِ الْحَيَاتِيَّةِ.

مثال 4: من الحياة



الري بالتنقيط: في مزرعة هاني نظام رى بالتنقيط يوصل $\frac{3}{4}$ لتر الماء في الساعة لكل شجرة. كم ساعة تلزم لإيصال $\frac{9}{10}$ لتر الماء إلى إحدى الأشجار في المزرعة؟

للمعرفة عدد الساعات اللازم لإيصال $\frac{9}{10}$ لتر الماء إلى الشجرة، أقسم $\frac{9}{10}$ على $\frac{3}{4}$:

$$\frac{9}{10} \div \frac{3}{4} = \frac{9}{10} \times \frac{4}{3}$$

$$= \frac{9}{10} \times \frac{4^2}{3^1}$$

$$= \frac{6}{5} = 1 \frac{1}{5}$$

أضرب في مقلوب القسم على

أبسط بقسمة البسط والمقام على العامل المشترك الأكبر بينهما

أكتب الناتج في صورة عدد كسري

إذن، يحتاج نظام الري $1 \frac{1}{5}$ ساعة ليوصل $\frac{9}{10}$ لتر إلى الشجرة.



أتحقق من فهمي:

مخلوقات بحرية: تقطع نجمة البحر مسافة $\frac{9}{10}$ m في الدقيقة. كم دقيقة تلزم لقطع مسافة $\frac{14}{15}$ m؟

أتدرّب وأحل المسائل



أجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة:

1) $\frac{1}{6} \div \frac{5}{12}$

2) $\frac{6}{7} \div \frac{9}{20}$

3) $\frac{15}{17} \div 30$

4) $40 \div \frac{10}{13}$

5) $\frac{35}{37} \div \frac{42}{47}$

6) $\frac{5}{18} \div \frac{31}{72}$

7) $\frac{29}{90} \div \frac{9}{70}$

8) $\frac{121}{250} \div \frac{11}{25}$

معلومة

يُؤخذ الزعفران من ميسمن زهرة الرّغفران الذي يحتوي على زيت دهنّي طيّار ذي رائحة ركية، وهو تميّن جدًا، لذا يُباع في عبوات صغيرة.



توايل: وزع عامل في محل للتوايل $\frac{9}{100}$ kg من الزعفران في علب بالتساوي، واضعاً

كل $\frac{3}{200}$ kg في علبة. كم علبة استعمل لذلك؟

9)

الوحدة 2



مَشْغُولَاتٌ يَدَوِيَّةٌ: وَضَعَتْ سُعَادٌ كُلَّ $\frac{1}{10}$ kg مِنَ الْخَرَزِ الْمُلَوَّنِ
فِي كِيسٍ. إِلَى كَمْ كِيسًا مِنَ الْحَجْمِ نَفِسٍّهُ تَحْتَاجُ لِوَضْعِ $\frac{4}{5}$ kg
مِنَ الْخَرَزِ؟

10

هندسة: إذا كان محيط مربع $\frac{9}{11}$ m، فما طول ضلعه؟

11

جُبْرٌ: إذا كانت $x = \frac{17}{18}$, و $y = \frac{2}{3}$, فأخذ قيمة $\frac{x}{y}$ في أبسط صورة، علماً بأنَّ $\frac{x}{y}$ تعني ناتج قسمة x على y .

16

إِذَا كَانَتْ $\frac{2}{3} = \frac{5}{9}$ ، فَأَجِدُ نَاتِجَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي مِنْ دُونِ إِجْرَاءِ عَمَلِيَّةِ الْقِسْمَةِ:

13 $\frac{5}{9} \div \frac{5}{6}$

14 $\frac{5}{9} \div \frac{2}{3}$

أَهْلُ كُلِّ مُعَادَلَةٍ مِمَّا يَأْتِي:

15


16 $\frac{3}{16} \div x = \frac{3}{4}$

مسألة مفتوحة: أَمْلأُ الفَراغَ بِمَا هُوَ مُنَاسِبٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَتِيَّةِ:

15

تبَرِيرٌ: حلَّتْ سَلْمَى الْمَسَالَةُ: $\frac{4}{5} \div \frac{8}{15}$ عَلَى النَّحْوِ الْأَتَيِ، فَهَلْ حُلُّهَا صَحِيحٌ؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.

18



أَكْتَشِفُ الْمُحْتَلِفَ: أَيُّ الْجُمَلِ الْأَتِيهِ مُخْتَلِفٌ عَنِ الْبَقِيَّةِ، مُبَرِّراً إِجَابَتِي:

10

$$\frac{2}{3} \div \frac{4}{5}$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}$$

$$\frac{5}{4} \times \frac{2}{3}$$

$$\frac{5}{4} \div \frac{2}{3}$$

تَبْرِيرٌ: مِنْ دُونِ إِجْرَاءِ عَمَلِيَّةِ الْقِسْمَةِ، هَلْ $\frac{1}{5} \div \frac{1}{10}$ أَصْغَرُ مِنْ $\frac{1}{10} \div \frac{1}{5}$ أَمْ أَكْبَرُ مِنْهَا؟

20

أَبْرُرُ اجَابَتِي.

كَيْفَ أَجِدُ نَاتِجَ قِسْمَةِ كَسْرَيْنِ؟

۱۰

27

قِسْمَةُ الْأَعْدَادِ الْكَسْرِيَّةِ

أَسْتَكْشِفُ



قطارُ الْبُرَاقِ فِي الْمَغْرِبِ هُوَ ثالِثُ أَسْرَعِ قِطَارٍ فِي الْعَالَمِ؛ إِذْ يَقْطَعُ مَسَافَةَ $5 \frac{1}{3}$ km فِي الدَّقِيقَةِ الْوَاحِدَةِ. إِلَى كَمْ دَقِيقَةً يَحْتَاجُ لِيَقْطَعُ مَسَافَةَ $40 \frac{1}{2}$ km 40 يَنَّ مَدِيَّتَيْنِ؟

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَجِدُّ نَاتِجَ قِسْمَةِ الْأَعْدَادِ الْكَسْرِيَّةِ فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ.

لِقِسْمَةِ الْأَعْدَادِ الْكَسْرِيَّةِ، أَكْتُبُهَا فِي صُورَةِ كُسُورٍ غَيْرِ فِعْلِيَّةٍ، ثُمَّ أَقْسِمُ عَلَى نَحْوِ مُشَابِهٍ لِقِسْمَةِ الْكُسُورِ.

مَثَلٌ 1

أَجِدُّ نَاتِجَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ:

$$1 \quad 2 \frac{2}{3} \div \frac{2}{3}$$

$$2 \frac{2}{3} \div \frac{2}{3} = \frac{8}{3} \div \frac{2}{3}$$

$$= \frac{8}{3} \times \frac{3}{2}$$

$$= \frac{8 \times 3}{3 \times 2}$$

$$= \frac{24}{6} = 4$$


أَكْتُبُ الْعَدَدَ الْكَسْرِيَّ فِي صُورَةِ كُسُرٍ غَيْرِ فِعْلِيٍّ

أَضْرِبُ فِي مَقْلُوبِ الْمُقْسُومِ عَلَيْهِ

أَضْرِبُ الْبَسْطَيْنِ وَالْمُقَامَيْنِ

أَبْسَطُ النَّاتِجَ

أَمْثَل $\frac{2}{3}^2$ بِالنَّمَاذِجِ، وَاقْسِمْ كُلَّ عَدَدٍ كَلِيًّا إِلَى 3 أَجْزَاءٍ، ثُمَّ أَحْدِدْ كُلَّ $\frac{2}{3}$ وَأَعْدِدْ عَدَدَهَا، فَأَجَدْهُ 4



$$2 \quad \frac{1}{4} \div 3 \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4} \div 3 \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \div \frac{7}{2}$$

$$= \frac{1}{4} \times \frac{2}{7}$$

$$= \frac{1}{4} \times \frac{2}{7} = \frac{1}{14}$$

أَحْوَلُ الْعَدَدَ الْكَسْرِيَّ إِلَى كُسُرٍ غَيْرِ فِعْلِيٍّ

أَضْرِبُ فِي مَقْلُوبِ الْمُقْسُومِ عَلَيْهِ

أَبْسَطُ، ثُمَّ أَجِدُ النَّاتِجَ

الوحدة 2

أتحقق من فهمي:

3) $2 \frac{1}{7} \div \frac{5}{8}$

4) $1 \frac{4}{5} \div 2 \frac{1}{4}$

يمكنني إيجاد قيم مقادير جبرية تحتوي على قسمة الكسور.

مثال 2

إذا كان: $m = 1 \frac{3}{4}$, $n = \frac{2}{5}$, فأوجد قيمة:

1) $m \div n$

$$\begin{array}{c}
 m \div n \\
 \downarrow \qquad \downarrow \\
 1 \frac{3}{4} \div \frac{2}{5} \\
 \downarrow \\
 \frac{7}{4} \div \frac{2}{5} \\
 \downarrow \\
 \frac{7}{4} \times \frac{5}{2} \\
 \downarrow \\
 \frac{35}{8} = 4 \frac{3}{8}
 \end{array}$$

أكتب المقدار الجبري

$n = \frac{2}{5}$, وقيمة $m = 1 \frac{3}{4}$ أعرض قيمة

أحول العدد الكسري إلى كسر غير فعلي

أضرب في المقلوب

أجد الناتج وأبسطه

أتحقق من فهمي:

إذا كان: $m = 2 \frac{1}{3}$, $n = \frac{7}{9}$, فأوجد قيمة كل مما يأتي:

2) $m \div n$

3) $n \div m$

استعمل قسمة الأعداد الكسرية في كثير من المواقف الحياتية.

مثال 3: من الحياة



إنتاج: أنتجت مطحنة $\frac{2}{5}$ طنًا من طحين القمح في $2 \frac{1}{3}$ h، كم طنًا تنتج في

ساعة واحدة؟

أجد كمية الطحين المنتجة في ساعة بقسمة الكمية المنتجة على زمن إنتاجها:

$$1 \frac{2}{5} \div 2 \frac{1}{3} =$$

$$\frac{7}{5} \div \frac{7}{3} =$$

$$\frac{7}{5} \times \frac{3}{7} =$$

$$\frac{1}{5} \frac{7}{5} \times \frac{3}{7} = \frac{3}{5}$$

أكتب العددين الكسريين في صورة كسران غير متعاكشين

أضرب في مقلوب المقسم عليه

أختصر، ثم أجد الناتج

إذن، أتجه المطحنة $\frac{3}{5}$ من طحين القمح في ساعة واحدة.

تحقق من فهمي:



زراعة: حصاد مزارع في $\frac{1}{2}$ 5 مخصوص العدس المزروع على مساحة $\frac{3}{8}$ دونمات من الأرض. كم دونماً حصاد في الساعة الواحدة؟ (الدوّام وحدة لقياس المساحة، ويساوي 1000 متراً مربعاً)

أتدرب وأحل المسائل

1 $2 \frac{1}{6} \div 1 \frac{13}{15}$

2 $\frac{9}{100} \div 1 \frac{7}{20}$

3 $3 \frac{1}{7} \div 1 \frac{11}{9}$

4 $10 \frac{2}{3} \div 8$

5 $42 \div 2 \frac{2}{13}$

6 $30 \frac{2}{3} \div 1 \frac{1}{3}$

7 $4 \frac{3}{10} \div \frac{2}{15}$

8 $\frac{11}{14} \div 1 \frac{20}{101}$

إذا كان: $x = \frac{5}{11}$, $y = \frac{3}{22}$ ، فأوجد قيمة كل مما يأتي:

9 $x \div y$

10 $y \div x$



حادة: أنبوب حديط طوله $\frac{1}{2} m$ ، أراد حداد تقطيعه إلى

قطع، طول الواحدة $\frac{2}{3} m$ ، إلى كم قطعة يمكّنه تقطيع الأنابيب؟

أتذكر

حساب قيمة مقدار جبري
أعرض عن قيم كل متغير، ثم
أجري عملية القسمة المطلوبة.

الوحدة 2

دواء: كم علبة تلزم لتفریغ $\frac{2}{5}$ ل من الدواء، علماً بأن سعة العلبة الواحدة L ؟

12

رياضة: محيط ملعب $1\frac{3}{5}$ km، إذا دارت سامية بـ ١٢ دورات حول الملعب مسافة

13

$\frac{6}{7}$ km، فكم دورة دارت حول الملعب ؟

14

شاحنات: أقصى حمولة لمجموعه من الشاحنات



$12\frac{1}{10}$ ton، كم شاحنة يمكنها نقل

من الأسمدة ؟

هندسة: مُضلع منتظم، محيطه $18\frac{2}{3}$ cm، وطول ضلعه $2\frac{1}{3}$ cm، ما عدد أضلاعه ؟

15

أولويات العمليات: أجد ناتج ما يأتي في أبسط صورة :

16

$$2\frac{1}{3} \div (\frac{1}{3} + \frac{5}{6})$$

معلومة

المضلع المنتظم هو الذي
تساوي أطوال أضلاعه
وقياسات زواياه.

مهارات التفكير العليا

مسألة متعددة الخطوات: دهن عيسى $\frac{3}{4}$ عرفته باستعمال $\frac{1}{2}$ علبة دهان. كم علبة

17

يحتاج لإكمال دهان الغرفة ؟

تبسيط: أجد ناتج كل مما يأتي من دون استعمال ورقه وقلم :

18 $\frac{2345}{1015} \times \frac{13}{15} \div \frac{2345}{1015}$

19 $\frac{2345}{11} \times \frac{12}{1015} \div \frac{2345}{1015}$

20

تبسيط: أي الآتية ناتجها أقل من 1 من دون إجراء عملية القسمة، مبررا إجابتي :

$3\frac{1}{2} \div 1\frac{3}{5}$

$2\frac{1}{2} \div 1\frac{1}{3}$

$4\frac{1}{3} \div 2\frac{2}{5}$

$2\frac{1}{8} \div 3\frac{1}{3}$

كيف أقسم عددين كسريين ؟



21

اختبار الوحدة

أَصْبِحُ دَائِرَةً حَوْلَ رَمْزِ الإِجَابَةِ الصَّحِيحَةِ فِي مَا يَأْتِي:

6) $\frac{3}{8} \div \frac{3}{4} =$

- a) $\frac{9}{32}$ b) $\frac{2}{1}$
 c) $\frac{1}{4}$ d) $\frac{1}{2}$

7) $2 \frac{1}{5} \times 1 \frac{3}{4} =$

- a) $2 \frac{3}{20}$ b) $\frac{40}{20}$
 c) $3 \frac{4}{20}$ d) $\frac{77}{20}$

ادَّخَرْتُ لِيَلَى $\frac{1}{2}$ دَنَانِيرَ مِنْ مَصْرُوفَهَا فِي شَهْرٍ، ثُمَّ
 ادَّخَرْتُ $\frac{3}{4}$ دِينَارٍ فِي الشَّهْرِ التَّالِي. بِكَمْ يَقْلُلُ ما
 ادَّخَرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي عَمَّا ادَّخَرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ؟

- a) $1 \frac{1}{4}$ b) $\frac{3}{4}$
 c) $\frac{1}{4}$ d) $1 \frac{3}{4}$

قطَعَ عَلَاءُ بَدْرًا جِهَةً مَسَافَةً $5 \frac{1}{2}$ km فِي $2 \frac{1}{3}$ h، كَمْ
 كِيلُومِترًا قَطَعَ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ؟

- a) $2 \frac{2}{15}$ b) $21 \frac{1}{3}$
 c) $13 \frac{1}{3}$ d) $\frac{3}{40}$

1) $\frac{3}{14} + \frac{1}{4} =$

- a) $\frac{4}{18}$ b) $\frac{7}{14}$
 c) $\frac{4}{28}$ d) $\frac{13}{28}$

2) $\frac{7}{12} - \frac{3}{8} =$

- a) $\frac{4}{24}$ b) $\frac{5}{24}$
 c) $\frac{2}{24}$ d) $\frac{3}{24}$

3) $1 \frac{2}{3} + 4 \frac{1}{5} =$

- a) $5 \frac{3}{12}$ b) $5 \frac{13}{15}$
 c) $5 \frac{3}{8}$ d) $5 \frac{2}{8}$

4) $7 \frac{5}{6} - 4 \frac{3}{10} =$

- a) $3 \frac{8}{15}$ b) $3 \frac{1}{15}$
 c) $3 \frac{1}{2}$ d) $3 \frac{3}{4}$

5) $\frac{3}{16} \times \frac{8}{10} =$

- a) $\frac{3}{20}$ b) $\frac{3}{30}$
 c) $\frac{3}{5}$ d) $\frac{3}{10}$

الوحدة 2

تدريب على الاختبارات الدولية:

ما عرض مُستطيل مساحته $11 \frac{1}{3} m^2$, وطوله

15

$$? 5 \frac{1}{7} m$$

a) $2 \frac{11}{54}$

b) $2 \frac{1}{7}$

c) $2 \frac{1}{21}$

d) $2 \frac{1}{3}$


ما قيمة Δ في الجملة الآتية:

16

$$1 \frac{5}{8} \div \Delta = \frac{13}{18}$$

يُمثل الشكل الآتي أبعاد حديقة:

$$18 \frac{1}{3} m$$



ما قيمة x في أبسط صورة؟

17

ما قيمة y في أبسط صورة؟

18

ما طول السياج المحيط بالحديقة في أبسط صورة؟

19

مشتريات: مع محمد 50 ديناراً، اشتري منها $\frac{1}{4}$

10

kg بنَدْوَرَة. إذا كان سعر الكيلوغرام الواحد $\frac{1}{3}$ دينار،

فكم يَقِي مع محمد؟

ذهب: دفعت فاطمة $\frac{1}{2}$ 50 ديناراً ثمناً لعقد من

11

الذهب، كتلته $\frac{3}{4} g$, ما ثمن الغرام الواحد من

الذهب في ذلك اليوم؟

سباق: يُبيّن الجدول الآتي الرَّمَنَ الَّذِي اسْتَغْرَقَهُ 4

مُتسابقين فيقطع مسافة $1500 m$

المتسابق	الزَّمْنُ بِالدَّفَائِنِ
علاء	$5 \frac{1}{3}$
محمد	$3 \frac{4}{5}$
عَدْنَانُ	$4 \frac{1}{3}$
قصي	$4 \frac{2}{3}$

بكم دقيقة تقدم محمد على عدنان؟

12

كم دقيقة تفصل بين أسرع متسابق وأبطأ متسابق؟

13

إلى كم دقيقة يحتاج قصي لقطع ضعف هذه المسافة

14

إذا حافظ على السرعة نفسها؟

الوحدة 3

العمليات على الكسور العشرية

ما أهمية هذه الوحدة؟

تُستخدم الكسور العشرية والعمليات عليها في كثير من مجالات الحياة، مثل التحاليل والفحوص الطبية؛ فهي تتطلب دقة كبيرة، وأي خطأ في الأجزاء العشرية يعني تشخيصاً طبياً مختلفاً، وعلاجًا غير مناسب.



سأتعلم في هذه الوحدة:

- ضرب الأعداد العشرية.
- قسمة الأعداد العشرية.
- حل مسائل عن القياس تتضمن الأطوال والكتل والسعات بوحدات قياس مختلفة.
- حل مسائل حياتية تتضمن عمليات على الأعداد العشرية.

تعلمت سابقاً:

- ✓ تعرف الكسور العشرية ضمن أجزاء الألف.
- ✓ جمع الأعداد العشرية، وطرحها.
- ✓ ضرب الكسور العشرية في 10، و100، و1000، والقسمة عليها.
- ✓ التحويل بين الوحدات المركبة للطول، والكتلة، والسعية.



مشروع الوحدة: المواد الغذائية في البسكويت

أجد السعرات الحرارية في الغرام الواحد من كل نوع.

4

اختار نوعين من البسكويت وأقارن بين كتليهما بوضع $>$ أو $<$ أو $=$ ، وأكرر المقارنة مع نوعين آخرين.

5

يرق محمد 65 سعراً حرارياً عندما يمشي مسافة 1.6 km، كم كيلومتراً يجب أن يمشي لحرق السعرات الحرارية الناجمة عن تناول قطعة من النوع الأول من البسكويت؟

6

استعد وزملاي لتنفيذ مشروعنا الخاص الذي نطبق فيه ما سنتعلمه في هذه الوحدة عن العمليات على الكسور العشرية لدراسة بعض الخصائص الغذائية للبسكويت.



المُواد والأدوات:

خمس عبوات من البسكويت تحتوي على البروتين، ومدون على كل منها السعرات الحرارية.

خطوات تنفيذ المشروع:

عرض النتائج:

أصنع مطوية دائيرية الشكل وأزين غلافها بصورة قطع البسكويت وأضمنها ما يلي:

1

- خطوات عمل المشروع، والنتائج التي توصلت إليها.

2

- معلومة جديدة تعلمتها في أثناء تنفيذ المشروع.

3

أعرض مع أفراد مجروعي المطوية والنتائج أمام طلبة الصف.



أقرأ المعلومات المدونة على كل عبوة ثم أحسب كل كتلة لكل قطعة داخل العبوة وكمية البروتين وعدد السعرات الحرارية فيها وأكتبها في الجدول الآتي: معلومات حول القطعة الواحدة من البسكويت

الكتلة	كمية البروتين	السعرات الحرارية
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		

اختار أحد أنواع البسكويت الخامسة، ثم أجد كتلة 3 قطع منه.

2

اختار نوعا آخر من البسكويت، ثم أجد كتلة البروتين في 4 قطع منه.

3


ضرب الكسور العشرية

الهدف: استعمال النماذج وحقائق الضرب لإيجاد ناتج ضرب كسران عشريين.
يمكن استعمال النماذج لضرب كسر عشري في كسر عشري آخر.

نشاط 1 أجد ناتج 0.4×0.3 باستعمال النماذج.


الخطوة 2 أمثل الكسر العشري الثاني (0.4)

- أظلل 4 أعمدة باللون الأحمر ليتمثل الكسر العشري 0.4



الخطوة 1 أمثل الكسر العشري الأول (0.3)

- أمثل الكسر العشري في شبكة 10×10 , واتذكر أن المربع الصغير الواحد يمثل 0.01
- أظلل 3 صفوف باللون الأصفر ليتمثل الكسر العشري 0.3



الخطوة 3 أعبر عن 0.4×0.3 بتضليل المنطقة المشتركة باللون.

أعد مربعات المنطقة المشتركة \square فأجد أنها 12 مربعا، كل منها يساوي 0.01 , ومجموعها 0.12 إذن، $0.3 \times 0.4 = 0.12$

أحلل الناتج:

ما مجموع عدد المنازل العشرية في الكسرتين العشريتين 0.4 و 0.3 ؟

ما عدد المنازل العشرية في الكسر الناتج؟

أتدرب

أجد ناتج ضرب كل مما يأتي باستعمال النماذج:

1 0.7×0.3

2 0.6×0.2

ضرب الكسور العشرية



استكشف

في أحوالٍ بيئيةٍ مُناسبةٍ، يَزدادُ ارتفاعُ شجرة السُّرُو 0.04 m تقريباً كُلَّ عامٍ. كم مِترًا يَزدادُ ارتفاعُ شجرة السُّرُو في 3.5 سنواتٍ؟

فكرة الدرس

أَضْرِبْ كَسْرَيْنِ عَشْرِيَّيْنِ.
أَضْرِبْ عَدَدَيْنِ عَشْرِيَّيْنِ.

لَاحظْتُ فِي النَّشَاطِ الْمَفاهِيمِيِّ الَّذِي يَسْبِقُ الدَّرْسَ أَنَّهُ عِنْدَ ضَرْبِ كَسْرٍ عَشْرِيٍّ فِي كَسْرٍ عَشْرِيٍّ آخَرَ، فَإِنَّ عَدَدَ الْمَنَازِلِ الْعَشْرِيَّةِ فِي النَّاتِحِ يُسَاوِي مَجْمُوعَ عَدَدِ الْمَنَازِلِ الْعَشْرِيَّةِ فِي الْكَسْرَيْنِ الْعَشْرِيَّيْنِ الْمَضْرُوبَيْنِ.

$$0.3 \times 0.6 = 0.18$$



يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ لِضَرْبِ كَسْرَيْنِ عَشْرِيَّيْنِ، وَذَلِكَ بِتَحْوِيلِهِمَا إِلَى عَدَدَيْنِ كُلَّيْنِ (بِحَذْفِ الْفَاصِلَةِ الْعَشْرِيَّةِ)، ثُمَّ ضَرِبِهِمَا، ثُمَّ تَحْدِيدِ مَوْقِعِ الْفَاصِلَةِ الْعَشْرِيَّةِ فِي النَّاتِحِ.

مثال 1


أَجِدْ نَاتِجَ ضَرْبِ كُلِّ مِمَا يَأْتِي:

$$1 \quad 0.8 \times 7$$

أَضْرِبْ مَنْ دُونِ اسْتِعْمَالِ فَاصِلَةِ عَشْرِيَّةِ.

$$56 = 7 \times 8$$

أُحَدِّدُ مَوْقِعَ الْفَاصِلَةِ الْعَشْرِيَّةِ.



$$2 \quad 1.07 \times 0.3$$

أَضْرِبْ مَنْ دُونِ اسْتِعْمَالِ فَاصِلَةِ عَشْرِيَّةِ.

$$107 \times 3 = 321$$



الخطوة 2

أحدّد موقع الفاصلة العشرية.

$$1.07 \times 0.3 = 0.321$$

مُنْزَلَتَانِ عَشْرِيَّاتٍ

مُنْزَلَةُ عَشْرِيَّةٌ واحِدةٌ

3 مَنَازِلَ عَشْرِيَّةٍ

3 0.008×5

أضرب من دون استعمال فاصلة عشرية.

$$8 \times 5 = 40$$

أحدّد موقع الفاصلة العشرية.

$$0.008 \times 5 = 0.040$$

3 مَنَازِلَ عَشْرِيَّةٍ

0 مُنْزَلَةُ عَشْرِيَّةٌ لِأَنَّهُ

عَدَدُ كُلُّ

3 مَنَازِلَ عَشْرِيَّةٍ

أُضِيفَ صُفْرًا يَسَارَ الرُّوْمَ

4 1.32×2.4

أضرب من دون استعمال فاصلة عشرية.

$$132 \times 24 = 3168$$

أحدّد موقع الفاصلة العشرية.

$$1.32 \times 2.4 = 3.168$$

مُنْزَلَتَانِ عَشْرِيَّاتٍ

مُنْزَلَةُ عَشْرِيَّةٌ واحِدةٌ

3 مَنَازِلَ عَشْرِيَّةٍ

5 3.9×6

6 6.02×0.8

7 0.007×6

8 4.34×2.15

أتحقق من فهمي:



الوحدة 3

تعلّمتُ سابقاً أنه عند ضرب عدد عشرى في 10 ، أو 100 ، أو 1000 ، فإنني أحرك الفاصلة العشرية إلى اليمين عدداً من المنازل يساوى عدداً أصغاراً فيها، فإذا انتهت المنازل العشرية في العدد العشري، فاض صفرأ أو أكثر يمين آخر رقم حتى يكتمل العدد المطلوب من المنازل.

$$5.6 \times 10 = 56.$$

$$5.6 \times 100 = 560.$$

$$5.6 \times 1000 = 5600.$$

يمكن ضرب عدد عشرى في عدد من مضاعفات 10 ، أو 100 ، أو 1000 باستعمال التحليل إلى العوامل، ثم تطبيق قواعد الضرب في 10 ، أو 100 ، أو 1000

مثال 2

أجد ناتج ضرب كل مما يأتي:

1 4.1×20

$$4.1 \times 20 = 4.1 \times 10 \times 2$$

أحلل: $20 = 10 \times 2$

$$= 4.1 \times 10 \times 2$$

أضرب 10 في العدد العشري

$$= 41 \times 2$$

أحرك الفاصلة منزلة إلى اليمين

$$= 82$$

أضرب

$$\text{إذن، } 4.1 \times 20 = 82.$$

2 2.745×300

$$2.745 \times 300 = 2.745 \times 100 \times 3$$

أحلل: $300 = 100 \times 3$

$$= 2.745 \times 100 \times 3$$

أضرب 100 في العدد العشري

$$= 274.5 \times 3$$

أحرك الفاصلة مرتين إلى اليمين

$$2745 \times 3 = 8235$$

أضرب من دون استعمال الفاصلة

$$2.745 \times 300 = 274.5 \times 3 = 823.5$$

أحدد موقع الفاصلة العشرية

مئلة عشرية واحدة

$$\text{إذن، } 2.745 \times 300 = 823.5$$

أتحقق من فهمي:

3 3.2×70

4 0.012×400

تعلمت سابقاً إيجاد قيمة عددة لمقدار جبوري بالتعويض عن المتغير بعدد كلي، يمكن أيضاً التعويض عنه بكسر عشربي، أو عدد عشربي.

مثال 3

أجد قيمة المقدار الجبوري $3x$ عندما $x = 1.02$.

أذكر

$3 \times x$ تساوي $3x$
وتساوي أيضاً (x)

$$\begin{array}{r} 3 \quad x \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 3 \times 1.02 \\ \downarrow \\ 3.06 \end{array}$$

أكتب المقدار الجبوري

أعوض عن x بالعدد 1.02

أجد ناتج الضرب

أتحقق من فهمي:

أجد قيمة المقدار الجبوري $2000x$ عندما $x = 5.013$.

استعمل ضرب الكسور والأعداد العشرية في كثير من المواقف الحياتية.

مثال 4: من الحياة



يتدرب سامي استعداداً لسباق الدراجات الهوائية، فيقطع مسافة 14.3 km في ساعة واحدة. ما المسافة التي يقطعها في 1.25 ساعة إذا حافظ على نفس السرعة؟ المسافة التي يقطعها سامي في 1.25 ساعة تساوي ناتج ضرب 1.25 في المسافة التي يقطعها في ساعة واحدة.

استعمل خوارزمية الضرب لإيجاد ناتج 14.3×1.25 :

$$\begin{array}{r}
 1 & 4. & 3 \\
 \times & 1. & 2 & 5 \\
 \hline
 7 & 1 & 5 \\
 2 & 8 & 6 & 0 \\
 + & 1 & 4 & 3 & 0 & 0 \\
 \hline
 1 & 7. & 8 & 7 & 5
 \end{array}$$


منزلة عشرية واحدة
 منزلتان عشريتان
 3 منزلات عشرية

الوحدة 1

إذن، يقطع سامي مسافة km 17.875 في 1.25 ساعة.

أتدقق من فهمي:

في تجربة مخبرية، استعمل طبقة الصفيح السادس 2.3 قارورة من الكحول، سعة كل منها 1.2 L، ما كمية الكحول التي استعملتها الطبقة باللترات؟



AWA2EL
LEARN 2 BE

أتدرب وأحل المسائل

أجد ناتج كل مما يأتي:

1 2.21×3

2 0.006×6

3 23.1×0.94

4 5.1×6.45

أجد ناتج كل مما يأتي:

5 6.5×40

6 1.025×700

7 0.129×2000

أجد قيمة كل مقدار جبري مما يأتي عندما $x = 4.02$:

8 $4x$

9 $3.1x$

10 $20x$

ذهب: أرادت منال شراء هدية لوالدتها، فاختارت خاتماً من الذهب كتلته 5 g، إذا كان ثمن غرام الذهب في ذلك اليوم JD 38.6، فما ثمن الخاتم؟



فضاء: يبلغ وزن جسم على سطح القمر 0.166 وزنه على سطح الأرض. أجد وزن رائد فضاء على سطح القمر، علمًا بأن وزنه على سطح الأرض 625 N



كهرباء: يستهلك مصباح موف لطاقة 0.053 كيلوواط من الكهرباء في الساعة الواحدة. كم كيلوواط يستهلك المصباح من الكهرباء في 10.5 ساعة؟

معلومات

يمكن توفير استهلاك الكهرباء في المنزل باستعمال مصابيح توفر الطاقة (LED) التي تخفض قيمة فاتورة الكهرباء بنسبة 85% تقريبًا.

11

12

13

وقود: ملأ حازم سيارته بـ L 34.6 من الوقود. إذا كان ثمن اللتر الواحد JD 0.76، فما المبلغ الذي دفعه حازم ثمناً للوقود؟

14

أنهار: طول نهر الأمازون 6.4 km، وطول نهر النيل 1.04 مثل طول نهر الأمازون تقربياً. أجد طول نهر النيل.

15

Learn 2 Be



16

قوارب: تكلفة استئجار قارب شراعي في الساعة الواحدة JD 35.5، أجد تكلفة استئجاره مدة 1.25 ساعة.

17

أملأ الفراغ في المخططين الآتيين بأعداد مناسبة:

$$\begin{array}{ccccc} & \boxed{} & & & \\ & \uparrow \times 0.7 & & & \\ 4000 & & & & \downarrow \times 0.07 \\ 0.007 \times & \boxed{} & & & \boxed{} \end{array}$$

18

$$\begin{array}{ccccc} & \boxed{} & & & \\ & \uparrow \times 0.6 & & & \\ 200 & & & & \downarrow \times 0.06 \\ 0.006 \times & \boxed{} & & & \boxed{} \end{array}$$

فَعْلَوْمَةٌ

يَعْنِي نهر الأمازون في أميركا الجنوبية، وهو ثالث أطول نهر في العالم بعد نهر النيل.

اكتشاف الخطأ: أراد هيثم إيجاد ناتج 5.26×3.4 ، فكان حلُّه كَما يَأْتِي:

5.	2	6
	\times	3. 4
		2 1 0 4
		+ 1 5 7 8 0
1 7 8. 8 4		

مهارات التفكير العليا

تبrier: هل ناتج ضرب كسر عشري أقل من 1 في عدد كلّي أكبر دائمًا من العدد الكلّي أم أصغر منه؟ أبّرر إجابتي.

21

إِشَادَةٌ

أستعين بـ أمثلة عدديّة.

مسألة مفتوحة: أجد كسرain عشريين ناتج ضربهما يحوي 3 منازل عشرية.

22

أكتب: كيف أحدد موقع الفاصلة العشرية عند ضرب عدد عشري في عدد عشري آخر؟

23

الوحدة 3


قسمة الكسور العشرية

الهدف: استعمال النماذج لقسمة عدد عشرى على عدد عشرى آخر.

يمكن استعمال النماذج لإيجاد ناتج قسمة عدد عشرى على كسر عشرى.


قسمة عدد عشرى على كسر عشرى.

أجد ناتج $0.8 \div 2.4$ باستعمال النماذج.



الخطوة 1 أمثل العدد العشري 2.4 باستعمال

النماذج.



الخطوة 2 أحدد عدد المجموعات التي يحوي

كل منها 0.8 في النموذج.
الاحظ وجود 3 مجموعات، في كل منها 0.8

$$2.4 \div 0.8 = 3$$


أحلل الناتج:

هل للعمليات الناتج نفسه؟ لماذا؟

ما ناتج $2.4 \div 0.8$

ما ناتج $24 \div 8$

1



أكتب جملة القسمة الممثلة بالنماذج أدناه، ثم أجد ناتجها.

1

$$1.6 \div \dots = \dots$$

أجد ناتج قسمة $0.4 \div 3.6$ باستعمال النماذج.

2



2

قسمة الكسور العشرية

الدرس



استكشف

ثمن تذكرة الدخول إلى متحفٍ علميٍّ 3.25 دنانير. إذا كانَ مجموعَ مبيعاتِ التذاكر في يومٍ 783.25 ديناراً، فما عددُ التذاكر المباعة في ذلكَ اليوم؟

فكرة الدرس

أقسامُ الكسور العشرية.

تعلَّمْتُ سابِقاً أَنَّهُ عِندَ قِسْمَةِ عَدَدٍ عَشْرِيٍّ عَلَى 10، أَوْ 100، أَوْ 1000، فَإِنِّي أُحَرِّكُ الفاصلَةَ العَشْرِيَّةَ إِلَى اليسارِ عَدَدًا مِنَ الْمَنَازِلِ يُسَاوِي عَدَدَ الْأَصْفَارِ فِي العَدَدِ العَشْرِيِّ. أَمَّا إِذَا انتَهَتِ الْمَنَازِلُ الْعَشْرِيَّةُ فِي الْعَدَدِ العَشْرِيِّ، فَأَضْعُصُ صِفْرًا أَوْ أَكْثُرَ يَسَارَ آخِرِ رَقْمٍ حَتَّى يَكْتُمَ الْعَدَدُ الْمَطْلُوبُ مِنَ الْمَنَازِلِ.

$$5.6 \div 10 = 0.56$$

$$5.6 \div 100 = 0.056$$

$$5.6 \div 1000 = 0.0056$$

لاحظْتُ فِي النَّشَاطِ الْمَفاهِيمِيِّ الَّذِي يَسْبِقُ الدَّرْسَ أَنَّ $24 \div 8 = 3$ ، وَ $0.8 \div 0.4 = 2$. لَهُمَا النَّاتِجُ نَفْسُهُ، وَأَنَّهُ يُمْكِنُ إِيجادُ نَاتِجٍ $2.4 \div 0.8 = 3$ كُلُّ مِنْ 24 وَ 8 عَلَى الْعَدَدِ 10، لِذَلِكَ يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ لِإِيجادِ نَاتِجٍ 0.8 $\div 0.4 = 2$ مِنْ دونِ اسْتِعْمَالِ النَّمَاذِجِ.

مثال 1

أَجِدُ نَاتِجَ قِسْمَةِ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

1 $2.4 \div 8$

$$\begin{array}{r} 24 \div 8 = 3 \\ \downarrow 10 \qquad \downarrow 10 \\ 2.4 \div 8 = 0.3 \end{array}$$

مَنْزِلَةُ عَشْرِيَّةٍ وَاحِدَةٌ

حَقِيقَةُ أَسَاسِيَّةٌ

أَصْغَرُ بِ10 مَرَّاتٍ مِنْ 24

إِذَنْ، نَاتِجُ الْقِسْمَةِ أَصْغَرُ بِ10 مَرَّاتٍ مِنْ 3

2 $0.24 \div 8$

$$\begin{array}{r} 24 \div 8 = 3 \\ \downarrow 100 \qquad \downarrow 100 \\ 0.24 \div 8 = 0.03 \end{array}$$

مَنْزِلَتَانِ عَشْرِيَّاتٍ

حَقِيقَةُ أَسَاسِيَّةٌ

أَصْغَرُ بِ100 مَرَّةٍ مِنْ 24

إِذَنْ، نَاتِجُ الْقِسْمَةِ أَصْغَرُ بِ100 مَرَّةٍ مِنْ 3

الوحدة 3

أتحقق من فهمي:



3 $4.2 \div 7$

4 $0.42 \div 7$

5 $0.042 \div 7$

يمكن أيضًا قسمة كسر عشرى على عدد كلى باستعمال القسمة الطويلة. عند كتابة ناتج القسمة الطويلة أضع الفاصلة العشرية في الناتج فوق الفاصلة العشرية في المقسم، وأستمر في القسمة حتى يصبح الباقي صفرًا.



Learn 2 Be
قسمة كسر عشرى على عدد كلى

مفهوم أساسى



- بالكلمات: عند قسمة كسر عشرى على عدد كلى باستعمال القسمة الطويلة، أضع الفاصلة العشرية في ناتج القسمة فوق الفاصلة العشرية في المقسم، ثم أقسم كما أفعل مع الأعداد الصحيحة.

$$4 \overline{)7.32} \quad \begin{array}{c} 1.83 \\ \downarrow \\ \text{أضع الفاصلة العشرية في ناتج القسمة} \\ \text{فوق الفاصلة العشرية في المقسم} \end{array}$$

- بالأعداد:

مثال 2

أجد ناتج قسمة كل مما يأتي:

1 $4.35 \div 3$

أستعمل القسمة الطويلة

$$\begin{array}{r} 1.45 \\ 3 \overline{)4.35} \\ -3 \\ \hline 13 \\ -12 \\ \hline 15 \\ -15 \\ \hline 0 \end{array}$$

أضع الفاصلة العشرية في ناتج القسمة
فوق الفاصلة العشرية في المقسم

إذن، $4.35 \div 3 = 1.45$

2 $93 \div 6$

تقع الفاصلة العشرية يمين العدد الكلي 93، ويمكن كتابتها في صورة 93.0

أستعمل القسمة الطويلة لإيجاد ناتج $93.0 \div 6$:

$$\begin{array}{r} 1 \ 5 \\ 6) 9 \ 3 \ . \ 0 \\ \underline{-} \ 6 \\ 3 \ 3 \\ - 3 \ 0 \\ \underline{\quad} \ 3 \ 0 \\ - 3 \ 0 \\ \underline{\quad\quad} 0 \ 0 \end{array}$$

أضع الفاصلة العشرية في ناتج القسمة
فوق الفاصلة العشرية في المقسم

إذن، $93 \div 6 = 15.5$

3 $0.637 \div 7$

$$\begin{array}{r} 0 \ . \ 0 \ 9 \ 1 \\ 7) 0 \ . \ 6 \ 3 \ 7 \\ \underline{-} \ 6 \ 3 \\ \underline{\quad\quad} 0 \ 0 \ 7 \\ - 7 \\ \underline{\quad\quad\quad} 0 \end{array}$$

أضع 0 في ناتج القسمة؛ لأن $6 < 7$
ثم أقسّم 63 على 7

تحقق من فهمي:

4 $7.9 \div 4$

5 $58 \div 4$

6 $0.426 \div 6$

لماذا لا يتغير ناتج القسمة
عند تحريك الفاصلة العشرية
العدد نفسه من المنازل في كلا
العدادين؟

عند قسمة عدد عشرى على عدد عشرى، أجعل المقسم على عدداً كلياً بتحريك الفاصلة العشرية في كل من المقسم والمقسم على العدد نفسه من المنازل إلى اليمين حتى يصبح المقسم على عدداً كلياً، ثم أستعمل القسمة الطويلة، أو القسمة المختصرة.

$$9.27 \div 3.1 = 92.7 \div 31.$$

الوحدة 3

مثال 3

أَجِدْ ناتِجَ قِسْمَةٍ كُلُّ مِمَّا يَأْتِي :

1 $5.52 \div 1.2$

$$5.52 \div 1.2 = 55.2 \div 12.$$



$$12) \overline{)55.2} \quad \begin{array}{r} 4 \\ 5 \\ -4 \\ \hline 1 \\ 2 \\ -1 \\ \hline 0 \end{array}$$

أُخْرِكُ الْفَاصِلَةَ الْعَشِيرَيَّةَ مَنْزِلَةً واحِدَةً إِلَى الْيَمِينِ

أَسْتَعْمِلُ الْقِسْمَةَ الْمُخْتَصَرَةَ:

$55.2 \div 12 = 4$ ، وَالبَاقِي 7

أَكْتُبُ الْبَاقِي بِجَانِبِ الْعَدَدِ 2

$72 \div 12 = 6$ ، وَالبَاقِي 0

إِذَنْ، $55.2 \div 12 = 4.6$

2 $32 \div 0.2$

$$32 \div 0.2 = 320 \div 2.$$

$$2) \overline{)312} \quad \begin{array}{r} 1 \\ 3 \\ -2 \\ \hline 1 \\ 2 \\ -1 \\ \hline 0 \end{array}$$

أُخْرِكُ الْفَاصِلَةَ الْعَشِيرَيَّةَ مَنْزِلَةً واحِدَةً إِلَى الْيَمِينِ

أَسْتَعْمِلُ الْقِسْمَةَ الْمُخْتَصَرَةَ:

$32 \div 2 = 1$ ، وَالبَاقِي 2

أَكْتُبُ الْبَاقِي بِجَانِبِ الْعَدَدِ 2

$12 \div 2 = 6$ ، وَالبَاقِي 0

أَقْسِمُ الْمَنْزِلَةَ الْأَخِيرَةَ: $0 \div 2 = 0$

إِذَنْ، $32 \div 0.2 = 160$

3 $0.06 \div 1.5$

$$0.06 \div 1.5 = 0.6 \div 15.$$

أَضَعُ 0 فِي ناتِجِ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ 6 > 15 ،
ثُمَّ أَقْسِمُ 60 عَلَى 15

$$15) \overline{)0.60} \quad \begin{array}{r} 0.04 \\ 0.60 \\ -60 \\ \hline 0 \end{array}$$

أَسْتَعْمِلُ الْقِسْمَةَ الْمُخْتَصَرَةَ:

إِذَنْ، $0.06 \div 1.5 = 0.04$

أتحقق من فهمي:



4

$$2.47 \div 1.3$$

5

$$65 \div 0.5$$

6

$$0.06 \div 1.2$$


أَسْتَعْمِلُ قِسْمَةَ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاقِفِ الْحَيَاَتِيَّةِ.

مثال 4: من الحياة



عصاير: أَرَادَتْ سَامِيَّةُ شِرَاءَ عَصِيرٍ مِنْ أَحَدِ الْمَحَالِ، فَوَجَدَتِ الْعَرْضَيْنِ فِي الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ. أَيُّ الْعَرْضَيْنِ أَفْضَلُ؟

لِتَحْدِيدِ الْعَرْضِ الْأَفْضَلِ، أُحَدِّدُ سِعْرَ الْعُلَبَةِ الْواحِدَةِ فِي كُلِّ عَرْضٍ؛ بِقِسْمَةِ سِعْرِ العَرْضِ عَلَى عَدَدِ الْعُلَبِ.

**6 علب**

$$\begin{array}{r} 0.975 \\ 6 \overline{) 5.850} \\ - 5 \quad 4 \\ \hline 4 \quad 5 \\ - 4 \quad 2 \\ \hline 3 \quad 0 \\ - 3 \quad 0 \\ \hline 0 \quad 0 \end{array}$$

8 علب

$$\begin{array}{r} 0.925 \\ 8 \overline{) 7.400} \\ - 7 \quad 2 \\ \hline 2 \quad 0 \\ - 1 \quad 6 \\ \hline 4 \quad 0 \\ - 4 \quad 0 \\ \hline 0 \quad 0 \end{array}$$

سِعْرُ الْعُلَبَةِ الْواحِدَةِ فِي الْعَرْضِ الَّذِي يَحْوِي 6 عَلَبٍ هُوَ 0.975 JD، وَسِعْرُ الْعُلَبَةِ الْواحِدَةِ فِي الْعَرْضِ الَّذِي يَحْوِي 8 عَلَبٍ هُوَ 0.925 JD؛ لِذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا الْعَرْضَ الَّذِي يَحْوِي 8 عَلَبٍ هُوَ الْأَفْضَلُ لِلْشِرَاءِ.

أتحقق من فهمي:



فِي الْمَثَالِ السَّابِقِ، وَجَدَتْ سَامِيَّةُ عَرْضًا ثالِثًا تُبَاعُ فِيهِ 12 عُلَبَةَ عَصِيرٍ بِـ 10.95 JD. هَلْ هَذَا الْعَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَرْضِ الَّذِي يَحْوِي 8 عَلَبٍ عَصِيرٍ؟

الوحدة 3

أَتَدْرِيُ وَأَحَدُ الْمَسَائلَ



أَجِدُّ نَاتِجَ كُلَّ مِمَّا يَأْتِي:

1 $7.2 \div 9$

2 $0.72 \div 9$

3 $0.072 \div 9$

أَجِدُّ نَاتِجَ كُلَّ مِمَّا يَأْتِي:

4 $6.12 \div 4$

5 $26.88 \div 24$

6 $49 \div 5$

7 $0.369 \div 9$

أَجِدُّ نَاتِجَ كُلَّ مِمَّا يَأْتِي:

8 $2.47 \div 1.3$

9 $0.945 \div 0.45$

10 $65 \div 0.5$

11 $0.06 \div 1.2$

مَعْلُومَةٌ

طاقة متجددّة: تحوي محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح 4 مراوح كبيرة تُنتج 0.32 ميغا واط في العام. كم ميغا واط تُنتج المروحة الواحدة من الكهرباء في العام؟



ذهب: لدى صائغ عدد من الخواتم المتماثلة كتلتها معاً 139.5 g، ما عدد الخواتم إذا كانت كتلة الخاتم الواحد $?15.5 \text{ g}$

يمكن توليد الكهرباء باستعمال طاقة الرياح ليلاً ونهاراً، خلافاً لتوليد الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية الذي يكون فقط نهاراً.

رياضة: يدور سامي بذرّاجته 3 دورات حول حديقة عامة في 9.45 دقائق. أجد الزمان الذي يستغرقه في قطع دورة واحدة إذا سار بالسرعة نفسها.

طوق: اشتترت هناء شريطًا ملوكاً طوله 2.5 m؛ لتربين أطواق للشعر. إذا كان تربين كل طوق يتطلّب استعمال 0.5 m من هذا الشريط، فاجد عدد أطواق الشعر التي يمكن تربيتها بهذا الشريط.

معادن: وجد عالم أن كمية الكالسيوم في 5 L من مياه البحر الميت 87.5 g، أجد كمية الكالسيوم في 1 L من مياه البحر الميت.

12

13

14

15

16



رسائل: إذا كانت تكلفة الرسالة النصية الواحدة في الهاتف JD 0.03، فما عدد الرسائل النصية التي يمكن إرسالها بمبلغ JD 0.75.

17



فول سوداني: اشتري عاصم 13.5 kg من الفول السوداني، ثم عبأها في أكياس سعة كل منها 0.9 kg ليبعها في حديقة الحيوانات. كم كيساً استعمل عاصم؟

مَعْلُومَةٌ

استعمل العلاقة بين الضرب والقسمة لحل معادلات الضرب والقسمة، فمثلاً يمكن كتابة المعادلة: $x \div 20 = 5$

على صورة: $x = 20 \times 5$

$$19 \quad 2.7x = 3.24$$

$$20 \quad x \div 4.3 = 0.4$$

مهارات التفكير العليا

$$\begin{array}{r} 1.712 \\ \hline 5 \overline{) 5.356}^{10} \end{array}$$

اكتشاف الخطأ: أراد عذنان إيجاد ناتج قسمة باستعمال القسمة المختصرة كما يأتي:

اكتشاف الخطأ في حل عذنان، ثم أصححه.

تحدد: إذا كان $\text{_____} \div 2.3 = \text{_____}$ حيث _____ عدد كلي مكون من رقم واحد، فما أكبر وأصغر قيمة يمكن أن تكون للعدد _____ ? أكتب إجابتي لمترتين عشرتين.

أكتب: كيف أحدد موقع الفاصلة العشرية في ناتج قسمة عدد عشرى على عدد كلى؟

إرشاد

أحدد أصغر رقم وأكبر رقم في المقسم على، ثم أبدأ عملية القسمة.

استكشف



لدى سناة L 5 من الدهان، وأرادت أن تدهن عدداً من الصناديق الخشبية. إذا كان 320 mL من الدهان يكفي لدهن الصندوق الواحد، فكم صندوقاً يمكنها أن تدهن؟

فكرة الدرس


أحل مسائل عن وحدات القياس باستعمال ضرب الكسور العشرية وقسمتها.

يطلب حل بعض المسائل إجراء عمليات حسابية على قياسات معطاة في صورة كسر عشري، لكن يجب توحيد وحدات القياس أولاً. استعمل العلاقات بين وحدات القياس والتي تعلمتها سابقاً عند التحويل.

مثال 1

أولاً الفراغ بما هو مناسب في كل مما يأتي:

1 $2.5 \text{ m} \times 420 \text{ cm} = \dots \text{m}^2$



القيمة المطلوبة هي بوحدة المتر المربع؛ لذا أحول 420 cm إلى أمتار:

$$\begin{aligned} 2.5 \text{ m} \times 420 \text{ cm} &= 2.5 \text{ m} \times (420 \div 100) \text{ m} \\ &= 2.5 \text{ m} \times 4.2 \text{ m} \\ &= 10.5 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

أحول 420 cm إلى أمتار

أقسم

أضرب

إذن، $2.5 \text{ m} \times 420 \text{ cm} = 10.5 \text{ m}^2$

تحقق من فهمي:

2 $5.7 \text{ m} \times 500 \text{ cm} = \dots \text{m}^2$

3 $1.3 \text{ cm} \times 620 \text{ mm} = \dots \text{cm}^2$

في مسائل القسمة، أحول إحدى الوحدتين إلى الأخرى، ثم أختصر الوحدة المشتركة فيصبح الناتج بلا وحدة.


مثال 2

أَمْلأُ الفَراغَ بِمَا هُوَ مُنَاسِبٌ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

1 $0.00795 \text{ L} \div 1.5 \text{ mL} = \dots \dots \dots$

$$0.00795 \text{ L} \div 1.5 \text{ mL} = (0.00795 \times 1000) \text{ mL} \div 1.5 \text{ mL}$$

أَحَوَّلُ 0.00795 L إِلَى مِلِيلِتراتٍ



$$= 7.95 \text{ mL} \div 1.5 \text{ mL}$$

$$= \frac{7.95 \text{ mL}}{1.5 \text{ mL}}$$

$$= 5.3$$

أَضْرِبُ

أَخْتَصِرُ الْوَحْدَةَ مِنَ الْبَسْطِ وَالْمُقَامِ

أَقْسِمُ

$$\text{إِذْنُ، } 0.00795 \text{ L} \div 1.5 \text{ mL} = 5.3$$

أَتَحَقُّقُ مِنْ فَهْمِي:

2 $6.5 \text{ L} \times 400 \text{ mL} = \dots \dots \dots$

3 $3.6 \text{ m} \div 2.4 \text{ cm} = \dots \dots \dots$

أَسْتَعْمِلُ تَطْبِيقَاتِ الْعَمَلِيَّاتِ عَلَى وَحَدَّاتِ الْقِيَاسِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاقِفِ الْحَيَاتِيَّةِ.

مثال 3



أَرَادَ رَامِيَ تَغْطِيَةً حَدِيقَةً مُسْتَطِيلَةَ الشَّكْلِ بِالْعُشْبِ الصَّنَاعِيِّ، فَوَجَدَ أَنَّ طَولَهَا 30.5 m ، وَعَرْضَهَا 560 cm ، أَجِدْ كم مترًا مربعًا مِنَ الْعُشْبِ الصَّنَاعِيِّ يَحْتَاجُ لِتَغْطِيَهَا.

مِقْدَارُ الْعُشْبِ الصَّنَاعِيِّ الْمَطْلُوبُ يُسَاوِي مِسَاحَةَ الْحَدِيقَةِ الْمُسْتَطِيلَةِ الشَّكْلِ.

لِإِيجَادِ مِسَاحَةِ الْحَدِيقَةِ (A)، أَضْرِبُ الطَّولَ l فِي الْعَرْضِ w :

$$A = l \times w$$

قانونُ مِسَاحَةِ الْمُسْتَطِيلِ

$$A = 30.5 \text{ m} \times 560 \text{ cm}$$

أُعْوَضُ $w = 560 \text{ cm}$ و $l = 30.5 \text{ m}$

$$= 30.5 \text{ m} \times (560 \div 100) \text{ m}$$

أَحَوَّلُ 560 cm إِلَى أَمْتَارٍ

$$= 30.5 \text{ m} \times 5.6 \text{ m}$$

أَقْسِمُ

$$= 170.8 \text{ m}^2$$

أَضْرِبُ

إِذْنُ، يَحْتَاجُ رَامِي إِلَى 170.8 m^2 مِنَ الْعُشْبِ الصَّنَاعِيِّ لِتَغْطِيَةِ الْحَدِيقَةِ.

الوحدة 3

أتحقق من فهمي:



اشترت هنا سجادة طولها 5.5 m، وعرضها 450 cm، ما مساحة السجادة بالمتر المربع؟

تعلمت سابقاً أن الكمية تقادس بوحدة كبيرة وأخرى صغيرة في آن معاً، فتكون الكمية مقيسة بوحدة مركبة. ولحل المسائل الحياتية، أحول إحدى الوحدتين إلى الأخرى.


LEARN 2 BE

مثال 4

لدي طحين 2 kg و 800 g من الطحين، أراد أن يصنع منها فطائر. إذا كان صنع الفطيرة الواحدة يستهلك 0.4 kg من الطحين، فما عدد الفطائر التي يمكنني صنعها؟

الخطوة 1 أكتب الكتل بالوحدة نفسها.

كتلة الطحين 2 kg و 800 g، وهي وحدة مركبة؛ لذا أحول إحدى الوحدتين إلى الأخرى، ولكن كمية الطحين اللازمة لصنع فطيرة هي بوحدة (kg)؛ لذا أحول الغرام إلى كيلوغرام:



$$\begin{aligned} 2 \text{ kg}, 800 \text{ g} &= 2 \text{ kg} + 800 \text{ g} \\ &= 2 \text{ kg} + 0.8 \text{ kg} \\ &= 2.8 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$800 \text{ g} \div 1000 = 0.8 \text{ kg}$$

أجمع

الخطوة 2 أقسم كمية الطحين المتوفرة على كمية الطحين اللازمة لصنع فطيرة واحدة:

$$2.8 \text{ kg} \div 0.4 \text{ kg} = 2.8 \text{ kg} \div 0.4 \text{ kg}$$

أحرر الفاصلة العشرية منزلاً واحدة إلى اليمين

أقسم

$$= 28 \text{ kg} \div 4 \text{ kg}$$

$$= \frac{28 \text{ kg}}{4 \text{ kg}}$$

$$= 7$$

أختصر الوحدة من البسط والمقام

أقسم

إذن، يمكن للطاهي أن يصنع 7 فطائر بكمية الطحين التي لديه.

أتحققُ من فهمي



لَدِي شِيمَاء 7 kg وَ 200 g مِنَ السَّمَادِ. إِذَا كَانَ مِتْرُ الْأَرْضِ الْمُرَبَّعُ فِي حَدِيقَتِهَا بِحَاجَةٍ إِلَى 0.8 kg مِنَ السَّمَادِ، فَمَا مِسَاخَةُ الْأَرْضِ التَّيْ يُمْكِنُ لِشِيمَاء تَسْمِيْدُهَا بِهَذِهِ الْكَمِيَّةِ؟



أتدرُّبُ وأحلُّ المسائل

أَمَّا لِفَرَاغِ بِمَا هُوَ مُنَاسِبٌ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

1 $4.5 \text{ kg} \div 2000 \text{ g} =$ []

2 $1.2 \text{ m} \times 50 \text{ cm} =$ [] m^2

3 $0.8 \text{ m} \times 1.25 \text{ cm} =$ [] cm^2


4 $0.02 \text{ L} \div 2.5 \text{ mL} =$ []

5 $0.056 \text{ km} \times 4.8 \text{ m} =$ [] m^2

6 $8000 \text{ g} \div 2.5 \text{ kg} =$ []

مُلْصَقُ: أَجِدُ مِسَاخَةً مُلْصِقٍ إِعْلَانِيًّا مُسْتَطِيلٌ الشَّكْلِ بِوَحْدَةِ الْمِتْرِ الْمُرَبَّعِ، عِلْمًا بِأَنَّ طَوْلَهُ 40 cm، وَعَرْضَهُ 1.35 m.

عَصِيرُ: أَعْدَدْ أَيْمَنُ 1.3 L مِنْ عَصِيرِ الْفَرَالَةِ، وَ 280 mL مِنْ عَصِيرِ الْبَرْتُقَالِ، ثُمَّ وَضَعَهُمَا فِي إِبْرِيقٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ سَكَبَ الْخَلِيطَ فِي 7 أَكُوبٍ بِالتَّسَاوِيِّ. كَمْ لِتْرًا مِنَ الْعَصِيرِ فِي كُلِّ كُوبٍ؟



تَجْرِيَةُ: لَدِي عَالِمٍ كِيمِيَّ 29.04 g مِنْ مَادَّةٍ أَرَادَ إِجْرَاءَ تَجْرِيَةٍ عَلَيْهَا، وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَضُعُ 0.24 g مِنْهَا فِي كُلِّ أَنْبُوبٍ اخْتِيَارٍ. أَجِدُ عَدَدَ أَنَابِيبِ الْاخْتِيَارِ الْلَّازِمِ لِإِجْرَاءِ التَّجْرِيَةِ.



حِيَاَةُ: تَحْتَاجُ عُلَا إِلَى 52 g مِنْ خُيُوطِ الصُّوفِ لِحِيَاَةٍ رِدَاءٍ صُوفِيٍّ لِلْأَطْفَالِ. كَمْ رِدَاءً تَسْتَطِيعُ عُلَا حِيَاَتَهُ بِاسْتِعْمَالِ 189.8 g مِنْ خُيُوطِ الصُّوفِ؟

7

8

9

10

مَعْلَمَة

عند إجراء التجارب الكيميائية في مختبر المدرسة يجب اتباع إجراءات السلامة مثل ارتداء القفازات وواقي الوجه.

الوحدة 3

سيارات: موقف للسيارات طوله 52.5 m، وعرضه 20 m، وكان فيه 4 صفوف

11

للوقوف، كما في الشكل أدناه:



إذا كان عرض كل مكان اصطفاف هو 2.5 m فما عدد أماكن الاصطفاف في موقف السيارات.

12

قماش: يَبْعِيْعُ مَتْجَرْ قَمَاشًا فِي لَفَّاتٍ، عَرْضُ كُلِّ مِنْهَا 50 cm، وَسِعْرُ الْمِتْرِ الطَّوْلِيِّ مِنْهُ 2.75 JD، كم ديناراً تدفع سميارة لشراء 3.5 m^2 من القماش؟

13

صحة: يَحْتَاجُ بَنْكُ الدَّمِ إِلَى 1500 وَحدَةٍ دَمٌ أَسْبُوعِيًّا، سَعَةُ كُلِّ مِنْهَا 450 mL، إِلَى كم لِترًا مِنَ الدَّمِ يَحْتَاجُ الْبَنْكُ فِي الْأَسْبُوعِ؟

14

دهان: أَحْلُ الْمَسَالَةُ الْوَارِدَةُ فِي بِدَائِيَةِ الدَّرْسِ، ثُمَّ أَحْدَدْ كَمِيَّةَ الدَّهَانِ الْمُتَبَقِّيَّةَ بَعْدَ دَهْنِ الصَّنَادِيقِ.

معلومة

تعتبر فصيلة الدم O+ الأكثر شيوعاً، لذا تحرص المستشفيات على توفير كميات كبيرة منها.



اكتشف الخطأ: أراد نيل إيجاد ناتج $7.8 \text{ mL} \div 1.6 \text{ mL}$ ، فكان حلّه كما يأتي:

15

$$7.8 \text{ mL} \div 1.6 \text{ mL} = 48.75 \text{ mL}$$

أَكْتَشِفُ الْخَطَاً فِي حَلٌّ نَيْلٍ، ثُمَّ أَصْحِحُهُ.

16

تبير: بناءً على المعلومات الغذائية المدونة على كيس الخبز في الجدول المجاور، قال سالم إن رغيف الخبز الواحد الذي كتنته 0.4 kg سيمتحن g 60 من البروتين. هل قوله صحيح؟ أبُرُّ إجابتي.

17

تحدد: لدى مريم لفات من ورق الجدران، طول كل منها 8 m، وعرضها 0.7 m، أرادت الصاقها على الجدران الداخلية الجانبيّة لغرفة طولها 4.5 m ، وعرضها 3.5 m، وارتفاعها 2.8 m، ما عدد اللفات التي ستلزمها لذلك؟

18

كيف أجد ناتج $?3 \text{ kg} \div 650 \text{ g}$

حقائق غذائية	
الخبز	الكتلة لكل 100g
295	السعرات الحرارية
3.2g	الدهون
0.6g	الصوديوم
55g	الكريوبلاست
11g	البروتين

خطوة حل المسألة (حل مسألة أبسط)



قطع يزيد بساحتته مسافة 236.8 km في 3.7 ساعات. كم كيلومترًا يقطع في 5.85 ساعات، إذا سار بالسرعة نفسها؟

فكرة الدرس

أحل مسائل واستعمال خطوة (حل مسألة أبسط).



أفهم:

1

المعطيات: المسافة المقطوعة في 3.7 ساعات هي 236.8 km

المطلوب: المسافة التي سيقطعها يزيد في 5.85 ساعات.

أخطط

2

تتضمن المسألة أعداداً عدديّة عدديّة تزيدُها تعقيداً، لذا أحولها إلى مسألة أخرى تحوّي أعداداً أبسط، ثم أحّلّها، ثم أستعمل طريقة حل المسألة الأبسط لحل المسألة الأصلية.

أحل

3

أستعمل التّقريب لإيجاد أعداد قريبة من أعداد المسألة الأصلية يسهل على استعمالها.

$$236.8 \text{ km} \rightarrow 240 \text{ km}$$

$$3.7 \text{ h} \rightarrow 4 \text{ h}$$

$$5.85 \text{ h} \rightarrow 6 \text{ h}$$

المسألة الأبسط: قطع يزيد مسافة 240 km في 4 ساعات. كم كيلومترًا يقطع في 6 ساعات؟

حل المسألة الأبسط: إذا قطع يزيد مسافة 240 km في 4 ساعات، فإنَّه يقطع مسافة $240 \div 4 = 60 \text{ km}$ في ساعة واحدة. إذن، سيقطع يزيد مسافة $60 \times 6 = 360 \text{ km}$ في 6 ساعات.

حل المسألة الأصلية: أحل المسألة الأصلية باتباع نفس خطوات حل المسألة الأبسط.

إذا قطع يزيد مسافة 236.8 km في 3.7 ساعات، فإنَّه يقطع مسافة $236.8 \div 3.7 = 64 \text{ km}$ في ساعة واحدة. إذن، سيقطع يزيد مسافة $64 \times 5.85 = 374.4 \text{ km}$ في 5.85 ساعات.

اتحقّ

4

أستعمل علاقة عمليّة الضرب بالقسمة لتحقّق من صحة ناتجي عمليّي الضرب والقسمة في الحل.

الوحدة 3

أَتَدْرِبُ وَأَحْلُّ الْمَسَائِلَ



سيارات: تقطع إيمان سيارتها مسافة 263.5 km في ساعتين. كم كيلومتراً تقطع

في 3.8 ساعات؟

مياه: ينسكب من خرطوم L 103.5 من الماء في 4.6 دقيقة. كم لتر ماء ينسكب من الخرطوم في 0.5 ساعة؟



أجبان: إذا كان سعر 2.5 kg من الجبن JD 6.65، فما سعر g 450 من الجبن نفسه؟

وقود: تستهلك سيارة L 19.6 من الوقود عند قطع مسافة km 88.2، كم لتراً من الوقود تستهلك عند قطع مسافة m 1450؟

عصير: تحتاج عيرو إلى 4.2 kg من البرتقال لصنع كيلوغراماً من البرتقال يلزم لصنع L 2.35 من العصير؟



هندسة: أجد مساحة الشكل كل شكل مما يأتي:



حديقة: حديقة مستطيلة الشكل، عرضها m 18.72 طولها يساوي $\frac{1}{2}$ عرضها

أجد محيطها.

معلومة

تعتمد كمية استهلاك محرك المركبة للوقود على حجمها، حيث تحتاج المركبة الثقيلة إلى طاقة أكبر لتشغيلها، أما في المركبات الهجينة (الوقود والكهرباء) فتتجه لوجود بطارية كهربائية ذات خاصية إعادة الشحن نتيجة للحركة، فيؤدي ذلك إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 0.3 من الاستهلاك الطبيعي.



اختبار الوددة

شريط زينة طوله 2.52 m , فَصَّ إلى 7 أجزاءٍ

8

متساوية. طول الجزء الواحد هو:

- a) 1.764 m
- b) 0.1764 m
- c) 0.036 m
- d) 0.36 m

أستعمل الأرقام 3, 4, 6 لإكمال عملية الضرب الآتية:

$$\begin{array}{r} \boxed{} \quad \boxed{} \\ \times \quad \boxed{} \\ \hline 2 \quad 6 \quad 1 \quad . \quad 6 \end{array}$$

أكتب الرقم المقصود ليصبح عمليّة القسمة صحيحة في كل مما يأتي:

$$10 \quad \begin{array}{r} 1 \quad . \quad 7 \quad \boxed{} \\ 4 \overline{) 7 \quad . \quad 1 \quad 6} \end{array}$$

$$11 \quad \begin{array}{r} 2 \quad . \quad 0 \quad \boxed{} \\ 4 \overline{) 8 \quad . \quad 0 \quad 4} \end{array}$$

$$12 \quad \begin{array}{r} 1 \quad . \quad 3 \quad 8 \\ 7 \overline{) 9 \quad . \quad \boxed{} \quad 6} \end{array}$$

$$13 \quad \begin{array}{r} 1 \quad . \quad 4 \quad 5 \\ 7 \overline{) 1 \quad 0 \quad . \quad \boxed{} \quad 5} \end{array}$$

تغذية: تشير البيانات المدونة على علبة شوفان إلى أنها تحوي 2.5 g من الدهون. كم غراماً من الدهون يوجد في 3.75 علب مشابهة؟

أضف دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

ناتج 1.2×4 هو:

- a) 48
- b) 4.8
- c) 0.48
- d) 4.08

ناتج 0.32×2.4 هو:

- a) 7.68
- b) 1.20
- c) 0.768
- d) 0.120

ناتج 0.004×5 هو:

- a) 20
- b) 0.002
- c) 0.02
- d) 0.200

ناتج $7.2 \div 3$ هو:

- a) 24
- b) 0.024
- c) 0.24
- d) 2.4

ناتج $5.6 \div 8$ هو:

- a) 0.007
- b) 0.07
- c) 0.7
- d) 7

ناتج $13.68 \div 8$ هو:

- a) 1.71
- b) 17.1
- c) 0.171
- d) 171

ناتج $1.3\text{cm} \times 2\text{mm}$ هو:

- a) 2.6 cm^2
- b) 0.26 cm^2
- c) 0.026 cm^2
- d) 26 cm^2

الوحدة 3

تدريب على الاختبارات الدولية:

طلَبَتِ المُعَلَّمَةُ إِلَى حَنِينَ وَرَجَاءَ قِسْمَةَ عَدَدِ مَا عَلَى 100، فَضَرَبَتِ حَنِينُ خَطًّا العَدَدَ في 100 ، فَكَانَ النَّاتِحُ 320 ، فِي حِينٍ قَسَمَتِ رَجَاءُ الْعَدَدَ عَلَى 100 بِصُورَةٍ صَحِيحةٍ، فَكَانَ النَّاتِحُ :

- a) 32 b) 3.2
c) 0.32 d) 0.032

تَسْتَهِلُكُ الَّهُ 2.4 L مِنَ الْوَقُودِ عِنْدَ تَشْغِيلِهَا 25 سَاعَةً. كم تَسْتَهِلُكُ الْأَلَّهُ مِنَ الْوَقُودِ عِنْدَ تَشْغِيلِهَا 100 سَاعَةً؟

- a) 2.4 L b) 7.2 L
c) 9.6 L d) 12 L

زُجَاجَاتٌ سَعَةُ كُلِّ مِنْهَا 250 mL، ما عدَدُ الزُّجَاجَاتِ الَّتِي نَحْتَاجُهَا لِمِلءِ 300L مِنَ الْمَاءِ؟

- a) 12 b) 120
c) 1200 d) 12000

سَعَةُ خَرَازِ الْوَقُودِ لِسَيَارَةٍ 45 L مِنَ الْوَقُودِ، وَهِيَ تَسْتَهِلُكُ 8.2 L مِنَ الْوَقُودِ كُلَّ 100 km، قَطَعَتِ السَّيَارَةُ مَسَافَةً 350 km، وَكَانَ الْخَرَازُ مَلِيئًا بِالْوَقُودِ. مَا عَدَدُ لِتَرَاتِ الْوَقُودِ الْمُتَبَقِّي بَعْدَ قَطْعِ هَذِهِ

- الْمَسَافَةِ هُوَ؟
a) 29.75 L b) 28.7 L
c) 18.75 L d) 16.3 L

20

21

22

23

15

16

17

18

19


زَرَافَة: تَقْطَعُ الزَّرَافَةُ مَسَافَةَ 14.3 m فِي الثَّانِيَةِ الْوَاحِدَةِ. مَا الْمَسَافَةُ التَّيْيَةُ تَقْطَعُهَا فِي 1.5 ثَانِيَةٍ؟

زِرَاعَة: تَمْلِكُ حَنَانُ قِطْعَةَ أَرْضٍ مُسْتَطِيلَةَ الشَّكْلِ، بُعْدَاهَا 30 m وَ 25.5 m، أَرَادَتْ شِرَاءَ نَوْعَ مِنَ الْبَذُورِ لِزِرَاعَةِ أَرْضِهَا، مَا كَمِيَّةُ الْبَذُورِ التَّيْيَةُ تَلْزِمُهَا لِزِرَاعَةِ الْأَرْضِ بِالْكِيلُوغرَامِ إِذَا كَانَ كُلُّ 1m² يَلْزِمُهُ 70 g مِنَ الْبَذُورِ؟



قِيَاس: اسْتَعْمَلَ الْإِنْسَانُ قَدِيمًا الْبَذُورَ مَقْيَاً لِلسَّعَةِ. إِذَا كَانَتْ بَذْرَةٌ تَمَلِّأُ قَارُورَةً سَعْتُهَا 3000 250 mL، فَأَجْدُ سَعَةَ الْقَارُورَةِ الَّتِي تَحْوِي 18000 بَذْرَةً بِوَحْدَةِ الْلَّتِيرِ.

نَجْمَة: إِذَا كَانَتْ مَسَاحَةُ الْجَزْءِ الْمُلُونُ فِي النَّجْمَةِ السِّدَاسِيَّةِ الْمَرْسُومَةِ أَدْنَاهُ 34.6 cm² فَأَجْدُ مَسَاحَةَ النَّجْمَةِ كَامِلَةً ، عَلَمًا بِأَنَّهَا مُنْتَظِمَةٌ.



أَكْمَلِ الْجَدُولِ الْأَتَيِّ:

x	2	0.2	1.6
$2.3x$			
$x \div 0.4$			

الوحدة 4

التَّحْوِيلاتُ وَالْإِنْشَاءَتُ الْهَنْدَسِيَّةُ

ما أهمية هذه الوحدة؟

يسْتَعْمِلُ الْمُهَنْدِسُونَ الْمُضْلِعَاتِ كَثِيرًا فِي تَصَامِيمِ الْمَبَانِيِّ وَأَبْرَاجِ نَقلِ الطَّاقَةِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ، اسْتِنادًا إِلَى مَبَادِئِ الْإِنْسَابِ، وَالْإِنْعِكَاسِ، وَالْإِنْشَاءَتِ الْهَنْدَسِيَّةِ.



سَأَتَعَلَّمُ فِي هَذِهِ الْوَحدَةِ:

- تَعْيِينُ نُقْطَةٍ فِي أَرْبَاعِ الْمُسْتَوِيِّ الْأَحْدَاثِيِّ الْأَرْبَعَةِ.
- إِجْرَاءِ اِنْسَابِ فِي اِتِّجَاهَيْنِ، وَانْعِكَاسِ حَوْلِ الْمُحْوَرَيْنِ x, y .
- إِجْرَاءِ بَعْضِ الْإِنْشَاءَتِ الْهَنْدَسِيَّةِ.
- رَسْمِ مُثَلَّثٍ، وَدَائِرَةٍ، وَمُضْلَعٍ مُّنْظَمٍ.

تَعْلَمُ سَابِقًا:

- ✓ تَعْيِينُ نُقْطَةٍ فِي الرُّبْعِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمُسْتَوِيِّ الْأَحْدَاثِيِّ.
- ✓ إِجْرَاءِ اِنْسَابِ فِي اِتِّجَاهِ وَاحِدٍ، وَانْعِكَاسِ حَوْلِ مَحْوَرٍ.
- ✓ قِيَاسِ طَولِ قِطْعَةِ مُسْتَقِيمَةٍ.
- ✓ رَسْمِ زَاوِيَّةٍ عُلِّمَ قِيَاسُهَا.



مشروع الوحدة: الرياضيات والجغرافيا

أَرْسُمْ دَائِرَةً نِصْفُ قُطْرِهَا 3 cm، وَمَرْكِرْهَا مَدِينَةً الطَّفْيَلَةِ، ذَاكِرًا أَسْمَاءَ ثَلَاثَ مُدُنٍ تَقَعُ دَاخِلَ الدَّائِرَةِ، وَاسْمَيِّ مَدِينَتَيْنِ تُشَكَّلُانِ طَرْفِيٍّ وَتَرْا فِي الدَّائِرَةِ، وَاسْمَيِّ مَدِينَتَيْنِ تُشَكَّلُانِ طَرْفِيٍّ نِصْفَ قُطْرِهِ فِي الدَّائِرَةِ.

5


أَضْعُ مُسْتَوًى إِحْدَائِيًّا فَوْقَ الْخَرِيطَةِ، بِحِيثُ تَكُونُ مَدِينَةُ عَمَانَ نُقطَةُ الْأَصْلِ، ثُمَّ أَجْدُ إِحْدَائِيَّاتِ أَرْبَعِ مُدُنٍ فِي الْمُسْتَوَى.

6

أُجْرِيَ اِنْسِحَابًا وَانْعِكَاسًا لِشَكْلٍ فِي الْمُسْتَوَى
الْإِحْدَائِيِّ السَّابِقِ.

7


أَسْتَعِدُ وَزُمَلَائي لِتَنْفِيذِ مَشْرُوْعِنَا الْخَاصِ الَّذِي نُطَبِّقُ فِيهِ مَا سَتَتَّعَلَّمُهُ فِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ عَنِ التَّحْوِيلَاتِ وَالْإِنْشَاءَاتِ الْهَنْدَسِيَّةِ.



خطوات تنفيذ المشروع:

أَضْعُ الْخَرَائِطَ الَّتِي رَسَمْتُ عَلَيْهَا فِي لَوْحَةِ أَعْرِضِهَا
أَمَامَ زُمَلَائي فِي الصَّفَّ.

عرض النتائج:

1

أَعْمَلُ مَطْوِيَّةً تَتَضَمَّنُ:
• الْخَرَائِطَ وَالرُّسُومَ الَّتِي أَنْشَأْنَا أَنَا وَأَفْرَادُ
مَجْمُوعَتِي.

2

• خُطُواتِ الْعَمَلِ الْخَاصَّةِ بِكُلِّ رَسْمٍ.
• كِتَابَةَ بَعْضِ الْمَعْلُومَاتِ عَنِ الْأَماْكِنِ السِّيَاحِيَّةِ فِي
الْأُرْدُنِ.

3

• مُقَارَنَةُ نَتَائِجِي بِتَابِعِ زُمَلَائي فِي الصَّفَّ.
• بِيَانِا لِبَعْضِ الصُّعُوبَاتِ الَّتِي وَاجْهَهُنَا فِي أَنْتَاعِ تَنْفِيذِ
الْمَشْرُوْعِ، وَطَرَائِقِ مُعَالَجَتِهَا.

4

• صُورًا لِبَعْضِ الْمُدُنِ الْأُرْدُنِيَّةِ وَالْأَماْكِنِ السِّيَاحِيَّةِ.

أَحْضِرُ نَسَخًا مِنْ خَرِيطَةِ الْمُمْلَكَةِ الْأُرْدُنِيَّةِ الْهَاشِمِيَّةِ، ثُبَّيْنُ
مُدُنَاهَا وَقُراها، ثُمَّ أَنْفَدُ وَزُمَلَائي مَا يَأْتِي عَلَيْهَا:

أَرْسُمْ قِطْعَةً مُسْتَقِيمَةً تَصُلُّ بَيْنَ مَدِينَتَيْنِ، ثُمَّ أَنْصِبُهَا. مَا اسْمُ
الْمَدِينَةِ الْوَاقِعَةِ فِي الْمُنْتَصَفِ؟


أَرْسُمْ زَاوِيَّةً تَرْبِطُ بَيْنَ ثَلَاثَ مُدُنٍ، ثُمَّ أَسْتَعْمِلُ الْفَرْجَارِ
وَالْمِسْطَرَةَ لِتَنْصِيفِ الزَّاوِيَّةِ، ذَاكِرًا اسْمَ بَلْدَةٍ يَمْرُّ بِها
مُنْصَفُ الزَّاوِيَّةِ.

أَرْسُمْ خَطًّا مُسْتَقِيمًا يَصُلُّ بَيْنَ مَدِينَتَيْنِ، ثُمَّ أَخْتَارُ مَدِينَةً
لَا تَقَعُ عَلَيْهَا، وَأَرْسُمْ مِنْهَا عَمودًا مُسْتَقِيمًا عَلَيْهَا.

أَجْدُ ثَلَاثَ مُدُنٍ يُشَكَّلُ مَوْقِعُهَا مُثَلَّثًا، وَأَسْتَعْمِلُ
الْمِسْطَرَةَ لِإِيجَادِ الْمَسَافَةِ بَيْنَهَا عَلَى الْخَرِيطَةِ، ثُمَّ
أَرْسُمْ بِالْفَرْجَارِ الْمُثَلَّثَ الْوَاصِلَ بَيْنَهَا، ذَاكِرًا اسْمَيِّ
بَلْدَتَيْنِ تَقَعَانِ دَاخِلَ الْمُثَلَّثِ.

المُسْتَوِي الْإِحْدَاثِيُّ

أَسْتَكْشِفُ



كيف يمكن وصف موقع الفيل في حديقة الحيوانات المجاورة؟

فكرة الدرس

أتَعْرَفُ الْمُسْتَوِي الْإِحْدَاثِيُّ، ثُمَّ أَحَدُدُ إِحْدَاثِيَّاتٍ نَقَاطِهِ عَلَيْهِ.


المصطلحات

الْمُسْتَوِي الْإِحْدَاثِيُّ، الرُّبُّع، الْمَحْوَرُ x ، الْمَحْوَرُ y ، نَقْطَةُ الْأَصْلِ، الأَرْبَاعُ الْأَرْبَعَةُ.

يَتَسَقَّطُ تَقاطُعُ الْمُسْتَوِي الْإِحْدَاثِيُّ (coordinate plane) مِنْ تَقاطُعِ خَطَّيْ أَعْدَادٍ، أَحَدُهُمَا أَفْقِيُّ، وَالْآخَرُ رَأْسِيُّ عِنْدَ نَقْطَةِ الصِّفَرِ فِي كِلِّيْهِما. يُسَمَّى خَطُّ الْأَعْدَادِ الْأَفْقِيِّ الْمَحْوَرُ x (العموديُّ)، الْمَحْوَرُ y (origin point)، وَيُقْسَمُ مَحْوَرُ x وَالْمُسْتَوِي الْإِحْدَاثِيُّ إِلَى أَرْبَاعٍ أَرْبَاعٍ (four quadrants).

أَتَعْلَمُ

الْأَرْبَاعُ الْأَرْبَعَةُ فِي الْمُسْتَوِي الْإِحْدَاثِيِّ مُرْتَبَةٌ مِنَ الْأَوَّلِ إِلَى الْأَرْبَاعِ عَكْسَ اِتِّجَاهِ دَوْرَانِ عَقَارِبِ السَّاعَةِ، بَدْءًا بِالرُّبُّعِ الْأَعْلَى يَمِينًا.



مَوْقِعُ كُلِّ نَقْطَةٍ عَلَى الْمُسْتَوِي الْإِحْدَاثِيِّ يُحَدَّدُه زَوْجٌ مِنَ الْأَعْدَادِ، يُكْتَبُ (x, y) ، وَيُسَمَّى زَوْجًا مُرَتَّبًا.


$$(4, -2)$$

الإِحْدَاثِيُّ x الَّذِي يَنَاظِرُ
الْعَدْدُ 4 عَلَى الْمَحْوَرِ x

الإِحْدَاثِيُّ y الَّذِي يَنَاظِرُ
الْعَدْدُ -2 عَلَى الْمَحْوَرِ y

الوحدة 4

مثال 1



أَحدِ إِحْدَاثِيَّاتِ كُلِّ مِنَ النَّقَاطِ الْأَتِيَّةِ، ثُمَّ أَحدِ الرُّبُعَ الَّذِي تَقَعُ فِيهِ، أَوِ الْمَحْوَرُ الَّذِي تَقَعُ عَلَيْهِ:

النُّقطَةُ: **H**


النُّقطَةُ **H** تقابل العدد 4 على المحور x ; لِذَا فَإِنَّ إِحْدَاثِيَّ x لَهَا هُوَ 4، وتقابل العدد 3 على المحور y ; لِذَا فَإِنَّ إِحْدَاثِيَّ y لَهَا هُوَ 3، إذن الزَّوْجُ الْمُرَتَّبُ الَّذِي يُحدِّدُ مَوْقِعَ النُّقطَةِ **H** هُوَ $(4, 3)$ ، وَتَقَعُ هَذِهِ النُّقطَةُ فِي الرُّبُعِ الْأَوَّلِ.

النُّقطَةُ: **A**

النُّقطَةُ **A** تقابل العدد 3 على المحور x ; لِذَا فَإِنَّ إِحْدَاثِيَّ x لَهَا هُوَ 3، وتقابل العدد -2 على المحور y ; لِذَا فَإِنَّ إِحْدَاثِيَّ y لَهَا هُوَ -2، والزَّوْجُ الْمُرَتَّبُ الَّذِي يُحدِّدُ مَوْقِعَ النُّقطَةِ **A** هُوَ $(-2, -3)$ ، وَتَقَعُ هَذِهِ النُّقطَةُ فِي الرُّبُعِ الرَّابِعِ.

النُّقطَةُ: **C**

النُّقطَةُ **C** تقابل العدد -4 على المحور x ; لِذَا فَإِنَّ إِحْدَاثِيَّ x لَهَا هُوَ -4، وتقابل العدد 2 على المحور y ; لِذَا فَإِنَّ إِحْدَاثِيَّ y لَهَا هُوَ 2، والزَّوْجُ الْمُرَتَّبُ الَّذِي يُحدِّدُ مَوْقِعَ النُّقطَةِ **C** هُوَ $(-4, 2)$ ، وَتَقَعُ هَذِهِ النُّقطَةُ فِي الرُّبُعِ الثَّانِيِّ.



أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

النُّقطَةُ: **B**

النُّقطَةُ: **D**




النُّقطَةُ: **F**

يُمْكِنُ تَعْيِينُ الزَّوْجِ الْمُرَتَّبِ (y, x) عَلَى الْمُسْتَوِيِّ الْإِحْدَاثِيِّ بِالْحَرَكَةِ x وَحْدَةً أَفْقيَّاً، وَلَا وَحْدَةً رَأْسِيَّاً، بَدْءًا بِنُقطَةِ الْأَصْلِ.

مثال 2

طائرات: يظهر في الشكل المجاور 3 طائرات تحلق فوق إحدى المدن. أحدد موقع كل من الطائرات الآتية والربع الذي تقع فيه:



الطائرة **A**

موقع الطائرة **A** يقابل العدد -2 على المحور x ; لذا فإن إحداثي x لها هو -2 ، ويقابل العدد 3 على المحور y ; لذا فإن إحداثي y لها هو 3 إذن، الزوج المرتب الذي يمثل موقع الطائرة **A** هو $(-2, 3)$ ، وتقع الطائرة **A** في الربع الثاني.

تحقق من فهمي:

الطائرة **C** 3

الطائرة **B** 2

يمكن تحديد الزوج المرتب (x, y) على المستوى الإحداثي بالحركة بدءاً ب نقطة الأصل أفقياً (لليمين أو لليسار بحسب إشارة x) وبالحركة y وحدة رأسياً (للأعلى أو للأسفل بحسب إشارة y).

مثال 3


أحدد موقع كل من الأزواج المرتبة الآتية على المستوى الإحداثي ثم أحدد الربع الذي يقع فيه أو المحور الذي تقع عليه.

1 $(4, -3)$

أبدأ ب نقطة الأصل وأتحرك **4 وحدات** أفقياً إلى اليمين ثم **3 وحدات** رأسياً للأسفل وأرسم نقطة.
الاحظ أن النقطة تقع في الربع الرابع.

2 $(-5, 0)$

أبدأ ب نقطة الأصل وأتحرك **5 وحدات** أفقياً لليسار ثم **0 وحدة** رأسياً، وأرسم نقطة.
الاحظ أن النقطة تقع على المحور x .



تحقق من فهمي:

3 $(-6, -6)$

4 $(0, -2)$

الوحدة 4

أَجْدُ إِحْدَاثِيَّاتٍ كُلُّ مِنَ النَّقَاطِ الْآتِيَّةِ، ثُمَّ أَحَدِّدُ الرُّبُعَ الَّذِي تَقْعُ فِيهِ، أَوِ الْمَحْوَرَ الَّذِي تَقْعُ عَلَيْهِ:

1 B



2 C

3 E

4 F

5 G

6 H



أَتَدْرِيكَ وَأَحَدُ الْمَسَائِلَ



إِرشَاد

إِذَا كَانَتِ النَّقْطَةُ عَلَى الْمَحْوَرِ x فَإِنَّ إِحْدَاثِيَّاً لَهَا يَكُونُ صِفْرًا، وَإِذَا كَانَتِ عَلَى الْمَحْوَرِ y كَانَ إِحْدَاثِيَّاً لَهَا صِفْرًا.

إِرشَاد

إِذَا لَمْ تَظْهُرْ أَعْدَادُ (تَدْرِيجُ) عَلَى الْمَحْوَرَيْنِ x , y , فَأَقْتَرِضْ أَنَّ طَوْلَ ضِلْعٍ كُلُّ مُرَبَّعٍ يُمَثِّلُ وَحْدَةً واحِدَةً.

أَرَادَ سَامِيُّ الْإِلْتِقاءِ بِصَدِيقِهِ رَائِدِ فِي مَطْعَمٍ قَبْلَ الدَّهَابِ مَعَهُ إِلَى النَّادِي، وَكَانَ الْمَطْعَمُ يَبْعُدُ مَسَافَةً 9 km جَنوبَ النَّادِي. أَمْثِلْ مَوْقِعَ الْمَطْعَمِ، ثُمَّ أَكْتُبْ إِحْدَاثِيَّاتِهِ.

مدارس: تمثل النقطة (0, 0) موضع غرفة الإدارة في مدرسة هند، والنقطة (4, -3) موضع المختبر، والنقطة (0, 4) موضع المكتبة، فأجيب عن السؤالين الآتيين:

أَرْسُمُ مُسْتَوَى إِحْدَاثِيًّا، ثُمَّ أُعِنِّ عَلَيْهِ مَوْقِعَ كُلِّ مِنَ الإِدَارَةِ وَالْمَخْتَبِ وَالْمَكْتَبَةِ.

أَحَدِّدُ الرُّبُعَ الَّذِي تَقْعُ فِيهِ كُلُّ نَقْطَةٍ، أَوِ الْمَحْوَرَ الَّذِي تَقْعُ عَلَيْهِ كُلُّ مِنْهَا.

7

8

9

10

11

هندسة: أَرْسُمْ مُسْتَوًى إِحْدَائِيًّا، ثُمَّ أَعْيِنْ عَلَيْهِ مَوْقِعَ كُلِّ مِنَ النَّقَاطِ:

12

، $A(3, 4)$ ، $B(3, -2)$ ، $C(-2, -4)$ ، $D(-2, 6)$ ، ثُمَّ أَصْلُ بَيْنَهَا بِقِطَاعٍ مُسْتَقِيمَةٍ،

لِأَكْوَنَ الشَّكْلَ $ABCD$ ، ثُمَّ أَذْكُرْ اسْمَ الشَّكْلِ النَّاتِجِ.



مساجد: تُمَثِّلُ النَّقْطَةُ $(0, 0)$ مَوْقِعَ الْمَسْجِدِ فِي الْحَيِّ

13

الَّذِي يَقْطُنُ فِيهِ يَزِيدُ. سَارَ يَزِيدُ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ خَمْسَ وَحَادَاتٍ غَرْبًا وَوَحْدَاتٍ شِمَالًا. مَا إِحْدَائِيَّاتُ

مَوْقِعِ مَنْزِلِهِ؟

مهارات التفكير العليا

أَكْشِفُ الْخَطَا: أكتشف الخطأ في قول مراد وأصححه.

14

يُمْكِنُ تَعْيِينُ النَّقْطَةِ $(-5, 4)$ عَلَى الْمُسْتَوَى
الْإِحْدَائِيِّ، بَدْءًا بِنَقْطَةِ الْأَصْلِ، وَالَّتَّحَرُّكُ 5 وَحَادَاتٍ
إِلَى الْيُمْنِينِ، ثُمَّ 4 وَحَادَاتٍ إِلَى الْأَعْلَى



تَحْدِيد: أَكْتُبُ إِحْدَائِيَّاتِ النَّقْطَةِ الَّتِي تَبْعُدُ 3 وَحَادَاتٍ إِلَى الْيُمْنِينِ، وَ8 وَحَادَاتٍ إِلَى
الْأَعْلَى مِنَ النَّقْطَةِ $(-5, -5)$.

15

مَسَأَلَةٌ مَفْتوحةٌ: أَكْتُبُ زَوْجًا مُرَتَّبًا، يَكُونُ فِيهِ إِحْدَائِيٌّ x أَكْبَرُ مِنْ إِحْدَائِيٍّ y ، وَيَقْعُ فِي
الرُّبُعِ الثَّالِثِ.

16

أَكْشِفُ الْمُخْتَلِفَ: أُحَدِّدُ الزَّوْجَ الْمُرَتَّبَ الْمُخْتَلِفَ، مُبِرِّراً إِجَابَتِي.

$(0, -6)$

$(4, 0)$

$(5, 2)$

$(0, 0)$

تَحْدِيد: أَكْتُبُ إِحْدَائِيَّاتِ رُؤُوسِ الْمُرَبَّعِ الَّذِي طُولُ ضِلْعِهِ 4 وَحَادَاتٍ، وَيَقْطَعُ قُطْرًا
فِي نَقْطَةِ الْأَصْلِ.

18

أَكْتُبُ فِقْرَةً أَصِفُّ فِيهَا إِحْدَائِيَّاتِ النَّقَاطِ الَّتِي تَقْعُ عَلَى الْمَحْوَرِ x .

19

أتذكر


رينيه ديكارت هو عالم رياضيات اخترع نظاماً رياضياً سمي باسمه وهو (نظام الإحداثيات الديكارتية)، الذي شكل النواة الأولى لـ(الهندسة التحليلية).

فكرة الدرس

أَرْسِمُ اِنْسِحَابًا عَلَى الْمُسْتَوَى الإِحْدَائِيِّ.

المصطلحات

الانسحاب.




استكشف

أَصِفُّ الْإِنْسَحَابَ الَّذِي نَقَلَ الطَّائِرَةَ عَلَى الْمُسْتَوَى الإِحْدَائِيِّ مِنَ الْمَوْقِعِ A إِلَى الْمَوْقِعِ B.

الانسحاب (translation) هو انتقال الشكل من مكان إلى آخر دون تغيير أبعاده أو تدويره.

مثال 1

أَصِفُّ كُلَّ اِنْسِحَابٍ مِمَّا يَأْتِي مُعْتَمِدًا عَلَى الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ:



1 $D \rightarrow B$

3 وحدات إلى اليسار.

2 $B \rightarrow A$

3 وحدات إلى اليسار، و3 وحدات إلى الأسفل.

3 $A \rightarrow D$


6 وحدات إلى اليمين، و3 وحدات إلى الأعلى.

أتحقق من فهمي:

4 $E \rightarrow D$

5 $E \rightarrow C$

6 $C \rightarrow B$




LEARN 2 BE

لِإِجْرَاءِ اِنْسِحَابٍ شَكْلٍ بِمِقْدَارٍ a وَحْدَةً أُفْقيًّا، وَ b وَحْدَةً رَأْسِيًّا عَلَى الْمُسْتَوِيِّ الْإِحْدَاثِيِّ، أُحَرِّكُ كُلَّ رَأْسٍ مِنْ رُؤُوسِهِ بِمِقْدَارٍ a وَحْدَةً أُفْقيًّا، وَ b وَحْدَةً رَأْسِيًّا.

مَثَلٌ 2

أَرْسِمُ ΔABC الَّذِي إِحْدَاثَيْاتُ رُؤُوسِهِ $(A(-2,4), B(0,1), C(3,2))$ ، ثُمَّ أَجْدُ إِحْدَاثَيَاتِ رُؤُوسِهِ تَحْتَ تَأْثِيرِ:


انْسِحَابٍ 4 وَحَدَاتٍ إِلَى الْيَمِينِ، وَ 3 وَحَدَاتٍ إِلَى الْأَعْلَى.



الْخُطْوَةُ 1 أَرْسِمُ الْمُثَلَّثَ عَلَى الْمُسْتَوِيِّ الْإِحْدَاثِيِّ كَمَا يَأْتِي:

- أَحَدِّدُ النَّقَاطَ الَّتِي تُمَثِّلُ رُؤُوسَ الْمُثَلَّثِ عَلَى الْمُسْتَوِيِّ الْإِحْدَاثِيِّ.
- أَصِلُّ بَيْنَ النَّقَاطِ لِأَرْسِمِ الْمُثَلَّثَ.

الْخُطْوَةُ 2 أَسْحَبُ كُلًا مِنْ رُؤُوسِ الْمُثَلَّثِ 4 وَحَدَاتٍ إِلَى الْيَمِينِ، وَ 3 وَحَدَاتٍ إِلَى الْأَعْلَى.



أَيُّ إِنَّ إِحْدَاثَيَاتِ رُؤُوسِ الصُّورَةِ هِيَ:

$$A''(5, 10), B''(7, 7), C''(10, 8)$$

الوحدة 4

أتحقق من فهمي:



2

انسحاب وحدة واحدة إلى اليمين، و3 وحدات إلى الأسفل.

3

انسحاب 4 وحدات إلى اليسار، و5 وحدات إلى الأعلى.

الأحظ في المثال السابق أن إحداثي النقطة $(4, -2)$ بالانسحاب 4 وحدات إلى اليمين، و3 وحدات إلى الأعلى قد أصبحا $(2, 7)$ أي إن:


$$A(-2, 4) \rightarrow A'(-2+4, 4+3) \rightarrow A'(2, 7)$$

انسحاب زوج مرتبت على المستوى الإحداثي

مفهوم أساسى



- بالكلمات** لإجراء انسحاب للزوج المترتب (x, y) بمقدار a وحدة أفقياً، و b وحدة رأسياً على المستوى الإحداثي، أجمع a مع الإحداثي x ، و b مع الإحداثي y



- بالرموز** $(x, y) \rightarrow (x+a, y+b)$

إذا كانت a موجبة فالانسحاب إلى اليمين، وإذا كانت سالبة فالانسحاب إلى اليسار.
إذا كانت b موجبة فالانسحاب إلى الأعلى، وإذا كانت سالبة فالانسحاب إلى الأسفل.

يمكنني تحديد صورة نقطة على المستوى الإحداثي تحت تأثير انسحاب معطى من دون أن أرسم.

مثال 3

أحد صور النقاط المعطاة إحداثياتها في ما يأتى تحت تأثير انسحاب مقداره 4 وحدات إلى اليسار، و10 وحدات إلى الأعلى:

1 $A(6, 8)$

$$(x, y) \rightarrow (x-4, y+10)$$

$$A(6, 8) \rightarrow A'(6-4, 8+10)$$

$$A(6, 8) \rightarrow A'(2, 18)$$

قاعدة الانسحاب

أعرض الإحداثيين

إحداثيا الصورة

2

 $B(4, -9)$

$$(x, y) \rightarrow (x-4, y+10)$$

$$B(4, -9) \rightarrow B'(4-4, -9+10)$$

$$B(4, -9) \rightarrow B'(0, 1)$$

قاعدة الانسحاب

أعراض الإحداثيات

إحداثيات الصورة

تحقق من فهمي:

أجد صور النقط المعطاة إحداثياتها في ما يأتي تحت تأثير انسياب مقداره 3 وحدات إلى اليمين، و 4 وحدات إلى الأسفل:

3

 $S(0, -3)$

4

 $K(4, -10)$

5


 $N(10, 4)$

6

 $M(-16, 8)$

اتدرُّب واحل المسائل

أصنف كُلَّ انسياب مِمَّا يأتِي مُعتمِداً عَلَى الشَّكْلِ أدْنَا:



$$1 \quad B \rightarrow A$$

$$2 \quad F \rightarrow E$$


$$3 \quad E \rightarrow B$$

$$4 \quad B \rightarrow F$$


إرشاد

يمثل الحرف قبل السهم الأصل، والحرف بعده يمثل الصورة.

5



6




إرشاد

أصنف عمليَّة الانسياب، بدءاً بالانسياب الأفقي (يميناً، أو يساراً)، ثم الانسياب الرأسي (إلى أعلى، أو إلى أسفل).

الوحدة 4

آنـسـخ الشـكـل عـلـى وـرـقـة مـرـبـعـاتـ، ثـمـ أـرـسـمـ إـحـدـاـثـيـاتـ رـؤـوسـ صـورـةـ الشـكـلـ التـالـيـ، تـحـتـ تـأـثـيرـ اـنـسـحـابـ مـقـدـارـهـ وـحـدـاتـ إـلـى الـيـسـارـ، وـ4ـ وـحدـاتـ إـلـى الـأـسـفـلـ.

7



أـرـسـمـ الـمـرـبـعـ الـذـي إـحـدـاـثـيـاتـ رـؤـوسـهـ: $A(0,0)$, $B(2,0)$, $C(2,2)$, $D(0,2)$. على المـسـطـوـيـ الـإـحـدـاشـيـ، ثـمـ أـجـدـ إـحـدـاـثـيـاتـ رـؤـوسـهـ تـحـتـ تـأـثـيرـ اـنـسـحـابـ الـمـعـطـيـ فـي كـلـ مـمـا يـأـتـيـ:

أتذكر

الـمـرـبـعـ شـكـلـ رـبـاعـيـ تـطـابـقـ جـمـيعـ أـصـلـاـعـهـ وـزـوـاـيـاـهـ، وـكـلـ مـنـهـ قـائـمـةـ.

6ـ وـحدـاتـ إـلـى الـأـعـلـىـ.

8

5ـ وـحدـاتـ إـلـى الـيـمـينـ، وـوـحدـاتـ إـلـى الـأـعـلـىـ.

9

وـحدـةـ وـاحـدـةـ إـلـى الـيـسـارـ، وـ4ـ وـحدـاتـ إـلـى الـأـسـفـلـ.

10

أـجـدـ صـورـ النـقـاطـ الـمـعـطـاـةـ إـحـدـاـثـيـاتـهـ فـي ما يـأـتـيـ تـحـتـ تـأـثـيرـ اـنـسـحـابـ مـقـدـارـهـ 3ـ وـحدـاتـ إـلـى الـيـمـينـ، وـ5ـ وـحدـاتـ إـلـى الـأـسـفـلـ:

11 $(-4, 6)$

12 $(2, 8)$

13 $(0, -5)$

أـجـريـ اـنـسـحـابـ لـشـكـلـ رـبـاعـيـ، إـحـدـاـثـيـاتـ رـؤـوسـهـ:

14

أـجـدـ إـحـدـاـثـيـاتـ كـلـ مـنـ الرـؤـوسـ: $A(-5, 4)$, $B(-2, 0)$, $C(1, 4)$, $D(-3, 5)$. فـكـانـ إـحـدـاـثـيـاتـ الرـأـسـ A' .

إـحـدـاـثـيـاتـ كـلـ مـنـ الرـؤـوسـ: B' , C' , D' ، ثـمـ أـصـفـ الـإـنـسـحـابـ.

إـذـاـ كـانـتـ $L'(-3, 1)$, $M'(0, 4)$, $N'(2, 4)$ ، ثـمـ تـمـثـلـ إـحـدـاـثـيـاتـ رـؤـوسـ صـورـةـ مـثـلـثـ LMN تـحـتـ تـأـثـيرـ اـنـسـحـابـ مـقـدـارـهـ وـحـدـاتـ إـلـى الـيـمـينـ، وـ3ـ وـحدـاتـ إـلـى الـأـعـلـىـ، فـأـجـدـ إـحـدـاـثـيـاتـ رـؤـوسـ الـمـثـلـثـ الـأـصـلـيـ.

15

16

تَبْرِيرٌ: أُجْرِيَ انسِحَابٌ لِّشَكْلٍ بِاسْتِعْمَالِ الْقَاعِدَةِ $(x-3, y+6)$, ثُمَّ أُجْرِيَ انسِحَابٌ آخرٌ لِلشَّكْلِ النَّاتِيجِ مِنْ عَمَلِيَّةِ الْانسِحَابِ الْأُولَى بِاسْتِعْمَالِ الْقَاعِدَةِ $(x+3, y-6)$. أَذْكُرُ المَوْقِعَ النَّهَائِيَّ لِلشَّكْلِ مِنْ دُونِ رَسْمٍ، مُبِرّرًا إِجَابَتِي.

17

أَكْتَشِفُ الْخَطَاً: أَجْرِيَ خَالِدٌ انسِحَابًا لِلنَّقْطَةِ A , مِقْدَارُهُ وَحْدَتَانِ إِلَى الْأَسْفَلِ، وَوَحْدَةٌ إِلَى اليمينِ. هَلْ حَلَّ خَالِدٌ صَحِحًّا؟ أُبَرّرُ إِجَابَتِي.

$$\begin{array}{l} A(3,1) \longrightarrow A'(3-2,1+1) \longrightarrow A''(1,2) \\ \text{الصورة هي: } A''(1,2) \end{array}$$

18

تَحْدِيدٌ: أَجْرِيَ انسِحَابٌ مِقْدَارُهُ 5 وَحَدَاتٍ إِلَى اليمينِ، وَوَحْدَتَيْنِ إِلَى الْأَسْفَلِ، لِلْمُثَلَّثِ الَّذِي إِحْدَاثِيَّاتُ رُؤُوسِهِ: $A(0,-3), B(2,-1), C(-3,3)$. إِذَا أَجْرِيَ انسِحَابٌ لِصُورَةِ الْمُثَلَّثِ، مِقْدَارُهُ 3 وَحَدَاتٍ إِلَى اليسارِ، وَ8 وَحَدَاتٍ إِلَى الْأَسْفَلِ، فَأَجِدُ إِحْدَاثِيَّاتِ صُورَةِ الْمُثَلَّثِ الْآخِيرَةِ.

19

أَكْتَشِفُ الْمُخْتَلِفَ: أَيُّ قَوَاعِدِ الْإِنْسِحَابِ الْأَتِيَّةِ مُخْتَلِفَةٌ عَنِ الْبَقِيَّةِ؟ مُبِرّرًا إِجَابَتِي.

$(x-6, y+10)$

$(x+7, y)$

$(x, y+8)$

أَكْتَبُ أكتب خطوات إجراء انسِحَابٌ لِلزَّوْجِ الْمُرَتَّبِ (x, y) بِمِقْدَارِ 5 وَحَدَاتٍ لليمينِ، وَ3 وَحَدَاتٍ لِلأسفل عَلَى الْمُسْتَوَى الْحُدَافِيِّ.

20

إِرْشَاد

لِإِجْرَاءِ انسِحَابِيْنِ مُتَتَالِيْنَ عَلَى شَكْلٍ؛ أَطْبَقْ قَاعِدَةَ الْانسِحَابِ الْأُولَى عَلَى الشَّكْلِ الْأَصْلِيِّ أَوْلًا، ثُمَّ أَطْبَقْ قَاعِدَةَ الْانسِحَابِ الثَّانِيَّةَ عَلَى صُورَةِ الشَّكْلِ الْأَصْلِيِّ.



أستكشف

زارَتْ سُندُسٌ مَعْرِضاً لِبَيْعِ البَلَاطِ، فَشَاهَدَتْ بَلَاطاً مَعْرُوضاً كَمَا في الصُّورَةِ الْمُجَوَّرَةِ. مَا الْبَلَاطُ الَّتِي تُمَثِّلُ انْعِكَاسًا أُفْقِيًّا لِلْبَلَاطِ رَفِيم؟


فكرة الدرس

أَرْسَمْتُ انْعِكَاسًا عَلَى الْمُسْتَوَى الْأَهْدَافِيِّ.


المصطلحات

الإنعكاس، محور الإنعكاس.

الإنعكاس (reflection) هو تحويل هندسي ينقل الشكل من إحدى جهتي محور الإنعكاس (line of reflection) إلى الجهة الأخرى على بعد تقيسه من المحور، من دون تغيير أبعاد الشكل أو تدويره، خلافاً للاتجاه الذي يتغير (ينقلب).




يمثل الشكل المجاور انعكاساً للشكل $ABCD$ حول المحور m , ويلاحظ أن القطعة المستقيمة الواصلية بين كل نقطتين وصورتها تعمد المحور m الذي ينصفها. ولهذا، فإن صورة الشكل $ABCD$ بالإنعكاس حول m هي: $A' B' C' D'$. ولأن D يقع على محور الإنعكاس؛ فإنه يقع هو وصورته على النقطة نفسها.



لإجراء إنعكاس شكل حول المحور x , أو حول المحور y , أجد المسافة التي تبعد عن محور الإنعكاس لكل رأس من رؤوسه، ثم أحدد النقطة التي تقابلها على الجهة الأخرى من محور الإنعكاس، وتمايلها في البعد نفسه.

مُثَلَّثٌ إِحْدَاثِيُّاتُ رُؤُوسِهِ هِيَ: $A(1,1), B(1,4), C(3,4)$. أَكْتُبُ إِحْدَاثِيَّاتِ صُورِ رُؤُوسِهِ بِالِانْعِكَاسِ حَوْلَ الْمِحْوَرِ x , ثُمَّ أَرْسِمُ الْمُثَلَّثَ وَصُورَتَهُ.



الخطوة 1 أَرْسِمُ الْمُثَلَّثَ عَلَى الْمُسْتَوِيِّ الِإِحْدَاثِيِّ كَمَا يَأْتِي:

- أُعِينُ النَّقَاطِ الَّتِي تُمَثِّلُ رُؤُوسَ ΔABC عَلَى الْمُسْتَوِيِّ الِإِحْدَاثِيِّ.
- أَصِلُّ بَيْنَ النَّقَاطِ؛ لِأَرْسِمِ الْمُثَلَّثَ.

الخطوة 2 أَجِدُّ عَدَدَ الْوَحدَاتِ يِيَنَ كُلُّ رَأْسٍ مِنْ رُؤُوسِ الْمُثَلَّثِ وَمِحْوَرِ الِانْعِكَاسِ (الْمِحْوَرِ x)؛ لِأَحْدَدِ إِحْدَاثِيَّاتِ صُورِ الرُّؤُوسِ كَمَا يَأْتِي:

- الرَّأْسُ $A(1,1)$ يَقَعُ عَلَى بُعْدِ وَحْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَوْقَ الْمِحْوَرِ x ; لِذَلِكَ تَكُونُ صُورَتُهُ عَلَى بُعْدِ وَحْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَسْفَلَ الْمِحْوَرِ x .
- الرَّأْسَانِ $B(1,4)$ $C(3,4)$ يَقَعَانِ عَلَى بُعْدِ 4 وَحدَاتٍ فَوْقَ الْمِحْوَرِ x ; لِذَلِكَ تَكُونُ صُورَةُ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى بُعْدِ 4 وَحدَاتٍ أَسْفَلَ الْمِحْوَرِ x .

الخطوة 3 أَصِلُّ بَيْنَ الرُّؤُوسِ الْجَدِيدَةِ، فَتَتْبُعُ صُورَةُ ΔABC ; أَيْ $\Delta A'B'C'$

إِذْنُ، إِحْدَاثِيَّاتُ صُورِ رُؤُوسِ الْمُثَلَّثِ بِالِانْعِكَاسِ حَوْلَ الْمِحْوَرِ x هِيَ:

$$A'(1,-1), B'(1,-4), C'(3,-4)$$

أَتَحْقُقُ مِنْ فَهْمِي:

$A(-4,-3), B(-4,-1), C(-1,-1), D(-1,-3)$ $ABCD$ مُسْتَطِيلٌ إِحْدَاثِيَّاتُ رُؤُوسِهِ هِيَ:

أَكْتُبُ إِحْدَاثِيَّاتِ صُورِ رُؤُوسِهِ بِالِانْعِكَاسِ حَوْلَ الْمِحْوَرِ x , ثُمَّ أَرْسِمُ الْمُسْتَطِيلَ وَصُورَتَهُ.

أَلْاحِظُ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ أَنَّ إِحْدَاثِيَّيِّ النُّقطَةِ $(1,1)$ A بِالِانْعِكَاسِ حَوْلَ الْمِحْوَرِ x قَدْ أَصْبَحَ $(1,-1)$ A' أَيْ إِنَّ:

$$A(1,1) \longrightarrow A'(1,-1)$$


الوحدة 4

مفهوم أساسى



انعکاس زوج مرتبت على المستوى الأحداثي.

- لإجراء انعکاس للزوج المرتبت (y, x) حول المحور x , أعكس إشارة الأحداثي y .
- لإجراء انعکاس للزوج المرتبت (y, x) حول المحور y , أعكس إشارة الأحداثي x .




- انعکاس النقطة (y, x) حول المحور x هو:
 $(x, y) \rightarrow (x, -y)$
- انعکاس النقطة (y, x) حول المحور y هو:
 $(x, y) \rightarrow (-x, y)$

لإجراء انعکاس شكل حول محور باستعمال الأحداثيات، أجد إحداثيات صورة كل رأس من رؤوسه بتطبيق قاعدة الانعکاس حول ذلك المحور x أو y

مثال 2

شكل رباعي إحداثيات رؤوسه هي: $L(5,5), M(6,2), N(3,1), K(2,5)$. أكتب إحداثيات صور رؤوسه بالانعکاس حول المحور y , ثم أرسم الشكل وصورته.



الانعکاس حول المحور y :

$$\begin{aligned} (x,y) &\rightarrow (-x,y) \\ L(5,5) &\rightarrow L'(-5,5) \\ M(6,2) &\rightarrow M'(-6,2) \\ N(3,1) &\rightarrow N'(-3,1) \\ K(2,5) &\rightarrow K'(-2,5) \end{aligned}$$

إذن، إحداثيات رؤوس الشكل الرباعي $LMNK$ بالانعکاس حول المحور y هي:

$$L'(-5,5), M'(-6,2), N'(-3,1), K'(-2,5)$$

تحقق من فهمي:



ABC مُثَلَّثٌ إِحْدَاثِيَّاتُ رُؤُوسِهِ هِيَ: $A(-4, -3)$, $B(-4, -1)$, $C(-1, -1)$. أَكْتُبُ إِحْدَاثِيَّاتُ صُورِ رُؤُوسِهِ بِالْأَنْعِكَاسِ حَوْلَ الْمَحْوَرِ x ، ثُمَّ أَرْسِمُ الْمُثَلَّثَ وَصُورَتَهُ.


يُحافظُ الْأَنْعِكَاسُ حَوْلَ مَحْوَرِ عَلَى قِيَاسَاتِ الْأَطْوَالِ وَالزَّوَايا لِلشَّكْلِ، فَيَكُونُ الْأَصْلُ وَالصُّورَةُ مُتَمَاثِلَيْنَ تَمَامًا.

LEARN 2 BE

مثال 3

يُمَثِّلُ الشَّكْلُ الْمُجَاوِرُ الْمُسْتَطِيلَ $FGHJ$ الَّذِي إِحْدَاثِيَّاتُ رُؤُوسِهِ:

$$:F(2,2), G(7,2), H(7,6), J(2,6)$$



أُمِثِّلُ بِيَانِيًّا الْمُسْتَطِيلَ $F'G'H'J'$ الَّذِي هُوَ اَنْعِكَاسُ الْمُسْتَطِيلِ $FGHJ$ حَوْلَ الْمَحْوَرِ x .

1

أَجِدُّ إِحْدَاثِيَّاتِ النَّقَاطِ: J' , G' , H' , F' ، بِتَطْبِيقِ الْقَاعِدَةِ الْمَنَاسِبَةِ ثُمَّ أُمِثِّلُ الْمُسْتَطِيلَ $J'G'H'F'$ بِيَانِيًّا:


2

$$F(2,2) \longrightarrow F'(2,-2)$$

$$G(7,2) \longrightarrow G'(7,-2)$$

$$H(7,6) \longrightarrow H'(7,-6)$$

$$J(2,6) \longrightarrow J'(2,-6)$$



أُقَارِنُ أَطْوَالَ أَضْلاعِ الْمُسْتَطِيلِ $FGHJ$ بِأَطْوَالِ أَضْلاعِ الْمُسْتَطِيلِ $F'G'H'J'$.

2

ما زَادَ أَطْوَالَ أَضْلاعِ الْمُسْتَطِيلِ $FGHJ$ ؟

أَعْدُ الْوَحدَاتِ فِي الْمُسْتَوِيِّ الْإِحْدَاثِيِّ لِإِيجَادِ أَطْوَالِ أَضْلاعِ الْمُسْتَطِيلِ $FGHJ$:

$$GH=FJ=4, FG=HJ=5$$

ثُمَّ أَجِدُّ أَطْوَالَ أَضْلاعِ الْمُسْتَطِيلِ $J'G'H'F'$:

$$G'H'=F'J'=4, F'G'=H'J'=5$$

أتذكر

الْمُسْتَطِيلُ شَكْلٌ رُبَاعِيٌّ، كُلُّ ضِلَاعٍ مُتَقَابِلَيْنِ فِيهِ مُطَابِقَانِ، وَجَمِيعُ زَوَايَاتِهِ قَائِمةٌ.

الوحدة 4

بالمقارنة، أستنتج أن الانعكاس حول المحور لا يحافظ على أطوال الأضلاع؛ أي إن أطوال أضلاع الصورة تساوي أطوال أضلاع نظيراتها في الشكل الأصلي.

أقارن قياسات الزوايا في المستطيل $FGHJ$ بقياسات الزوايا في المستطيل $J'G'H'F$. ماذا أستنتج؟

3

بما أن $FGHJ$ مستطيل، فإن زواياه الأربع قائمة. أقيس زوايا المستطيل $J'G'H'F$ باستعمال المنشقة، فاجد أن:


$$m\angle F' = m\angle G' = m\angle H' = m\angle J' = 90^\circ$$

بالمقارنة، أستنتج أن الانعكاس حول المحور لا يحافظ على قياسات الزوايا؛ أي إن قياسات زوايا الصورة تساوي قياسات زوايا نظيراتها في الشكل الأصلي.

تحقق من فهمي: يمثل الشكل المجاور للمثلث ABC الذي إحداثيات رؤوسه:



$$A(-6, -6), B(-2, -6), C(-2, -3)$$



أمثل بيانياً المثلث $A'B'C'$ الذي هو انعكاس المثلث ABC حول المحور x .

4

أقارن أطوال أضلاع المثلث ABC بأطوال أضلاع المثلث $A'B'C'$. ماذا أستنتج؟

5

أقارن قياسات الزوايا في المثلث ABC بقياسات الزوايا في المثلث $A'B'C'$. ماذا أستنتج؟


6

للانعكاس على المستوى الإحداثي كثير من التطبيقات الحياتية.

مثال 4: من الحياة

أعدت مصممة أزياء تصميماً لقميص باستعمال شكل سداسي، رؤوسه: $P(0,0), Q(-2,0), R(-1,3), S(-4,3), T(-2,5), V(0,5)$ ، ثم عكست الشكل السداسي حول المحور y لعمل التصميم المطلوب. أجد إحداثيات الصورة، ثم أمثل التصميم على المستوى الإحداثي.

أجري انعكاساً لـ كل رأسٍ من رؤوسِ الشكلِ السادسِ حولَ المُحَوَّرِ y كما يُأتي:



$$(x,y) \longrightarrow (-x,y)$$

$$P(0,0) \longrightarrow P'(0,0)$$

$$Q(-2,0) \longrightarrow Q'(2,0)$$

$$R(-1,3) \longrightarrow R'(1,3)$$


$$S(-4,3) \longrightarrow S'(4,3)$$

$$T(-2,5) \longrightarrow T'(2,5)$$

$$V(0,5) \longrightarrow V'(0,5)$$

أي إن إحداثيات الصورة بالانعكاس حول المحوّر y هي:

$$P'(0,0), Q'(2,0), R'(1,3), S'(4,3), T'(2,5), V'(0,5)$$



اتحقق من فهمي:

رسم مهندّش كل سماكة على المستوى الإحداثي المجاور، رؤوسه: A, B, C, D, E, F . أجد إحداثيات صورة رؤوس شكل السماكة بالانعكاس حول المحوّر x ، ثم أمثلها على المستوى الإحداثي.


اكتُب إحداثيات صورة رؤوس كل شكلٍ مما يأتي بالانعكاس حول المحوّر x ، ثم أمثل الشكلَ وصوريته:

- 1 $A(3,2), B(4,4), C(1,3)$
- 2 $M(-2,1), N(3,0), P(2,2)$
- 3 $H(2,-2), J(4,-1), K(6,-3), L(5,-4)$
- 4 $D(-2,-5), E(0,-1), F(2,-1), G(0,-5)$

أتدرّب وأحل المسائل

إرشاد

تكون صورة النقطة التي تقع على محور الانعكاس هي النقطة نفسها.



الوحدة 4

أكتب إحداثيات صور رؤوس كل شكل ممما يأتي بالانعكاس حول المحوّل، ثم أمثل الشكل وصوريه:

5 $Q(-4,2), R(-2,4), S(-1,1)$

6 $T(4,-2), U(4,2), V(6,-2)$


7 $W(2,-1), X(5,-2), Y(5,-5), Z(2,-4)$

8 $J(2,2), K(7,4), L(9,-2), M(3,-1)$

أرسم على المستوى الإحداثي شكلًا ثمانينًا، إحداثياته:

$A(2,2), B(3,2), C(1,3), D(1,4), E(2,5), F(3,5), G(4,4), H(4,3)$

بعد ذلك أرسم صورة الانعكاس له حول المحوّل y ، ثم أكتب إحداثيات رؤوسه بعد عملية الانعكاس.




يمثل الشكل المجاور صالة عرض للمفروشات، فيها مرآة ضخمة على الحائط (المحوّل y). أجد إحداثيات صورة الطاولة بالانعكاس على المرآة، ثم أمثلها بيانياً.

9

10

يمثل الشكل أدناه المربع $WXYZ$ الذي إحداثيات رؤوسه:

$W(1,1), X(1,5), Y(5,5), Z(5,1)$



يمثل بيانياً المربع $WXYZ$ الذي هو انعكاس المربع $WXYZ$ حول المحوّل y .

11

12

أقارن أطوال أضلاع المربع $WXYZ$ بـأطوال أضلاع المربع $WXYZ$. ماذا أستنتج؟

أتذكر

يحافظ الانعكاس حول محور على قياسات الأطوال والزوايا للشكل، فيكون الأصل والصورة متماثلين تماماً.

أُحدّد مُحَوَّر الْانْعِكَاسِ إِذَا عَلِمْتُ نُقْطَةً وَصُورَتُها فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:


13) $A(-3,5) \rightarrow A'(3,5)$

14) $B(2,-2) \rightarrow B'(2,2)$

15) $C(-4,1) \rightarrow C'(4,1)$

مهارات التفكير العليا

اكتشف الخطأ: التَّرَم أَحْمَد بِالْتَّنَفِيدِ الدَّقِيقِ لِمَبَادِئِ انْعِكَاسِ الْمُثَلَّثِ ABC حَوْلَ الْمُحَوَّرِ y ، وَسَمِّيَ رُؤُوسِ المُثَلَّثِ النَّاتِجِ كَمَا فِي الرَّسْمِ أَدْنَاهُ. هَلْ تَسْوِيَةُ الرُّؤُوسِ صَحِيحَةٌ؟ أَوْ ضَعِيفَةٌ؟ إِجَابَتِي.



16)

تحدد: رَسَمْتُ آمِنَةُ عَلَى الْمُسْتَوِيِ الْإِحْدَاثِيِّ مُثَلَّثًا رُؤُوسُهُ: $A(1,1)$, $B(2,3)$, $C(4,2)$. ثُمَّ عَكَسَتِ الْمُثَلَّثَ حَوْلَ الْمُحَوَّرِ y لِيَتُتَّسِّعَ الْمُثَلَّثُ: $A''B''C'$. ثُمَّ عَكَسَتِ الْمُثَلَّثَ $A''B''C'$ حَوْلَ الْمُحَوَّرِ x لِيَتُتَّسِّعَ الْمُثَلَّثُ $A'''B'''C'''$.

أَجِدُّ إِحْدَاثِيَّاتِ كُلِّ مِنَ النَّقَاطِ: A'' , B'' , C'' , A' , B' , C' , A''' , B''' , C''' .

أُقَارِنُ الْإِحْدَاثِيَّاتِ، ثُمَّ أُبَيِّنُ كَيْفَ يُمْكِنُ إِيجَادُ إِحْدَاثِيَّاتِ النَّقَاطِ: $A'''B'''C'''$ مُبَاشِرَةً مِنْ A,B,C .

إرشاد

لِإِجْرَاءِ انْعِكَاسِينِ مُتَتَالِيْنِ عَلَى شَكْلٍ؛ أَطْبَقْ قَاعِدَةَ الْانْعِكَاسِ الْأُولَى عَلَى الشَّكْلِ الْأَصْلِيِّ أَوْلًا، ثُمَّ أَطْبَقْ قَاعِدَةَ الْانْعِكَاسِ الثَّانِيَةَ عَلَى صُورَةِ الشَّكْلِ الْأَصْلِيِّ.

17)

18)

الوحدة 4

تَحْدِيدٌ: أَجِدُّ إِحْدَاثِيَّاتِ كُلِّ شَكْلٍ مِمَّا يَأْتِي بَعْدَ إِجْرَاءِ عَمَلِيَّةِ الْانْعِكَاسِ وَالْإِنْسَابِ الْأَتَيْتَيْنِ:



انْعِكَاسُ شَبِيهِ الْمُنْحَرِفِ حَوْلَ الْمَحْوَرِ x ، ثُمَّ إِجْرَاءِ انْسَابٍ لِلصُّورَةِ بِمُقْدَارٍ وَحْدَتَيْنِ إِلَى الْيُسْارِ، وَثَلَاثَ وَحَدَاتٍ إِلَى الْأَعْلَى.

19




انْسَابُ الْمُثَلَّثِ وَحْدَةً وَاحِدَةً إِلَى الْيَمِينِ، وَخَمْسَ وَحَدَاتٍ إِلَى الْأَسْفَلِ، ثُمَّ إِجْرَاءِ انْعِكَاسٍ لِلصُّورَةِ حَوْلَ الْمَحْوَرِ y .

20



تَبْرِيرٌ: فِي السُّؤَالَيْنِ السَّابِقَيْنِ، هَلِ الشَّكْلُ الْأَصْلِيُّ يُطَابِقُ الصُّورَةَ النَّهَايَيْةَ بَعْدَ عَمَلِيَّتَيِّ الْانْعِكَاسِ وَالْإِنْسَابِ؟ أُبَرِّرُ إِجَابَتِي.

21



تَبْرِيرٌ: ظَاهِرٌ فِي الرَّسْمِ الْمُجاوِرِ الْمُسْتَوِيِّ الْأَحْدَاثِيِّ مِنْ دُونِ الْمَحْوَرَيْنِ x وَ y . أَرْسُمْهُمَا بِحِيثُ تَكُونُ النُّقْطَةُ B هِيَ صُورَةُ النُّقْطَةِ A بِالْانْعِكَاسِ حَوْلَ الْمَحْوَرِ x ، وَالنُّقْطَةُ D هِيَ صُورَةُ النُّقْطَةِ A بِالْانْعِكَاسِ حَوْلَ الْمَحْوَرِ y .

22

كَيْفَ أَجْرَى انْعِكَاسًا لِلشَّكْلِ عِلْمَتْ إِحْدَاثِيَّاتُ رُؤُوسِهِ حَوْلَ الْمَحْوَرِ x عَلَى الْمُسْتَوِيِّ الْأَحْدَاثِيِّ؟

أَكْتَبْ

23

إِرشاد

لِإِجْرَاءِ عَمَلِيَّةِ اِنْسَابِ شَمَّ انْعِكَاسٍ مُتَتَالِيْنَ عَلَى شَكْلٍ؛ اِجْرِيَ الْانْسَابَ أَوْلًا عَلَى الشَّكْلِ الْأَصْلِيِّ، ثُمَّ اِجْرِيَ الْانْعِكَاسَ عَلَى صُورَةِ الشَّكْلِ الْأَصْلِيِّ.

وَلِإِجْرَاءِ عَمَلِيَّةِ انْعِكَاسِ شَمَّ اِنْسَابٍ مُتَتَالِيْنَ عَلَى شَكْلٍ؛ اِجْرِيَ الْانْعِكَاسَ أَوْلًا عَلَى الشَّكْلِ الْأَصْلِيِّ، ثُمَّ اِجْرِيَ الْانْسَابَ عَلَى صُورَةِ الشَّكْلِ الْأَصْلِيِّ.

خصائص الانعكاس

الهدف: أَحدِّدُ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الشَّكْلِ وَصُورَتِهِ تَحْتَ تَأْثِيرِ الإِنْعَكَاسِ بِاستِعْمَالِ بَرْمَجِيَّاتِ الْحَاسُوبِ.


أَسْتَعْمِلُ بَرْمَجِيَّةَ جِيوجِبرا (GeoGebra) لِإِجْرَاءِ انْعَكَاسٍ لِأَيِّ شَكْلٍ عَلَى الْمُسْتَوِيِّ الْإِحْدَاثِيِّ؛ فَهِيَ مَجَانِيَّةُ، وَسَهْلَةُ الْإِسْتِعْمَالِ. أَسْتَعْمِلُ الرَّابِطَ www.geogebra.org/download لِتَشْبِيهِ نُسْخَةَ Classic 6 GeoGebra مِنْ هَذِهِ الْبَرْمَجِيَّةِ فِي جَهَازِ الْحَاسُوبِ. يُمْكِنُنِي أَيْضًا اسْتِعْمَالُ النُّسْخَةِ الْمُتَوَافِرَةِ فِي شَبَكَةِ الإِنْتَرْنِتِ مِنْ دونِ حَاجَةٍ إِلَى تَشْبِيهِهَا فِي جَهَازِ الْحَاسُوبِ عَنْ طَرِيقِ الرَّابِطِ الْآتِيِّ: www.geogebra.org/classic

نشاط 1

أَسْتَعْمِلُ بَرْمَجِيَّةَ جِيوجِبرا لِإِيجَادِ صُورَةِ الْمُثَلَّثِ الَّذِي إِحْدَاثِيَّاتُ رُؤُوسِهِ: $A(2,1), B(4,3), C(2,3)$. بَعْدَ إِجْرَاءِ انْعَكَاسٍ حَوْلَ مَحْوَرِ y.

- الخطوة 1**: أدخل إحداثيات رؤوس المثلث ABC .
- أنقر على خيار ، ثم أكتب إحداثيات الرأس A ، ثم انقر على إدخال ، ثم أكتب إحداثيات الرأسين B و C بالطريقة نفسها.
 - اظهر إحداثيات الرؤوس بـ ، ثم اختار منها خيار ، ثم انقر على خيار

- الخطوة 2**: أرسم المثلث ABC .
- اختر أيقونة من شريط الأدوات ، ثم انقر على نقطة الزوج الأول في المستوى الإحداثي ثم الثاني ثم الثالث ثم عد وأنقر الأول لإغلاق الشكل.




الوحدة 4

أَحَدُّدِ مَحْوَرَ الْإِنْعِكَاسِ:

الخطوة 3

- أَخْتَارُ أَيْقُونَةً مِنْ شَرِيطِ الأَدَواتِ، ثُمَّ أَخْتَارُ مِنْهَا خَيَارَ . Reflect about Line
- أَنْقُرُ وَسْطَ الْمُثَلَّثِ، ثُمَّ مَحْوَرَ الْإِنْعِكَاسِ (y)، فَتَظَهُرُ صُورَةُ الْمُثَلَّثِ بِالْإِنْعِكَاسِ حَوْلَ الْمَحْوَرِ y .



أَحْلَلُ النَّاتِئَ:

لِمُقَارَنَةِ قِيَاسَاتِ الْمُثَلَّثِ ABC وَصُورَتِهِ:

- أَجِدُّ أَطْوَالَ أَضْلاعِ الْمُثَلَّثِ ABC وَأَطْوَالَ أَضْلاعِ صُورَتِهِ $A'B'C'$ ، بِاسْتِعْمَالِ أَدَاءِ قِيَاسِ أَطْوَالِ الأَضْلاعِ , ثُمَّ أَنْقُرُ الضَّلْعَ الْمَطْلُوبَ. مَاذَا الْأَحَدُ؟
- أَجِدُّ قِيَاسَاتِ زَوَایَا الْمُثَلَّثِ ABC وَقِيَاسَاتِ زَوَایَا صُورَتِهِ $A'B'C'$ ، بِاسْتِعْمَالِ أَدَاءِ قِيَاسِ الزَّوَایَا، ثُمَّ أَنْقُرُ ضِلْعَیِ الزَّاوِیَةِ الْمَطْلُوبَةِ. مَاذَا الْأَحَدُ؟

أَتَدْرِبُ

أَسْتَعْمِلُ بِرْمَجِيَّةً جِيوجِبرا لِإِجْرَاءِ انْعِكَاسِ حَوْلَ الْمَحْوَرِ x لِلْمُثَلَّثِينِ الَّذِينِ أُعْطِيَتْ إِحْدَاثِيَّاتُ رُؤُوسِهِمَا فِي مَا يَأْتِي:

- 1 $A(-5, -8), B(-7, -3), C(-4, -7)$
- 2 $F(1, 1), G(3, 5), H(2, 6)$

3

أَسْتَعْمِلُ بِرْمَجِيَّةً جِيوجِبرا لِإِجْرَاءِ انْعِكَاسِ حَوْلَ الْمَحْوَرِ y لِلشَّكْلِ الرُّبَاعِيِّ الَّذِي

رُؤُوسُهُ:

$$L(-7, -1), M(-5, -3), N(-2, 2), K(-3, 4)$$



استكشف


أراد اللاعب A إمبار الكُرة إلى أحد اللاعبين B أو C أيهما أقرب إليه؟ لماذا؟

فكرة الدرس

أتعرّفُ الدّائِرَةُ وَأَجْزَاءُهَا، ثُمَّ أرسمُها.

المصطلحات

الدّائِرَةُ، المَرْكَزُ، القُطْرُ، نِصْفُ القُطْرِ، الْمُحيطُ، الْوَتْرُ، الْقَوْسُ، الْقَوْسُ الْأَكْبَرُ، الْقَوْسُ الْأَصْغَرُ



أفكِرْ

كم نصف قطر في الدائرة؟
كم قطرًا في الدائرة؟


الدّائِرَةُ (circle) هي مجموعة كل النقاط على المستوى، التي تبعد المسافة نفسها عن نقطٍ ثابتة تسمى **المرْكَز** (center). **نصف القطر** (radius) هو القطعة المستقيمة التي تصل المرکز بأي نقطة على الدائرة، ويرمز إلى طوله بالرموز r . **القطر** (diameter) هو أي قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على الدائرة مروزاً بمرکزها، ويرمز إلى طوله بالرموز d .

مُحيط الدائرة (circumference) هو الطول حول الدائرة، ويرمز إليه بالرموز C .

علاقة القطر بنصف القطر

مفهوم أساسيٌّ

بالنماذج



- **بالكلمات** طول قطر الدائرة (d) يساوي مثلي طول نصف قطرها (r) ، أو طول نصف قطر الدائرة (r) يساوي نصف طول قطرها (d).


$$d = 2r$$

$$r = d \div 2$$

الوحدة 4

مثال 1

إذا كان طول قطر دائرة 18 cm، فما طول نصف قطرها؟



$$r = d \div 2$$


$$r = 18 \div 2$$

$$r = 9 \text{ cm}$$

طول نصف قطر الدائرة

$$d = 18$$

أقسم



$$d = 2r$$

$$d = 2 \times 6$$

$$d = 12 \text{ m}$$

طول قطر الدائرة



$$r = 6$$

أقسم


إذا كان طول نصف قطر دائرة 18 km، فما طول قطرها؟

4


أتحقق من فهمي:



3





اللُّوَرْ (chord) هو قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على الدائرة.




القوس (arc) هو جزءٌ من الدائرة، التي علية النقطتان B, C اللتان تقسمانها إلى **قوسٌ أصغر** (minor arc)، و**قوسٌ أكبر** (major arc).

مثال 2

أسمى جزء الدائرة الملون باللون الأحمر في كلٍ مما يأتي:



استعمل رسم الدائرة المجاور لأسمى كلاً مما يأتي:



وتر: PZ, UT





نصف قطر: SR, RT, UR, RZ

قطر: ST, UZ

ملحوظة: قد توجد حلول أخرى.

تحقق من فهمي:


أسمى جزء الدائرة الملون باللون الأحمر في كلٍ مما يأتي:



الوحدة 4

أَسْتَعْمِلُ رَسْمَ الدَّائِرَةِ الْمُجاوِرِ لِأَسْمَىٰ وَتَرَا، وَنَصْفَ قُطْرٍ، وَقُطْرًا


7



يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ الْمِسْطَرَةِ وَالْفِرْجَارِ لِرَسْمِ دَائِرَةٍ عُلِّمَ طُولُ نَصْفِ قُطْرِهَا، وَيُمْكِنُ أَيْضًا تَحْدِيدُ بَعْضِ أَحْزَاءِ الدَّائِرَةِ عَلَيْهَا.


مثال 3

أَرْسُمْ دَائِرَةً طُولُ نَصْفِ قُطْرِهَا 3 cm ، ثُمَّ أَرْسُمْ فِيهَا وَتَرَا، مُحَدِّدًا عَلَى الدَّائِرَةِ الْقَوْسَ الْأَكْبَرَ وَالْقَوْسَ الْأَصْغَرَ النَّاتِجَيْنِ مِنَ الْوَتَرِ.




أَفْتَحْ الْفِرْجَارَ فُتْحَةً مِقْدَارُهَا 3 cm

الخطوة 1



أَحَدَدْ نَقْطَةَ الْمَرْكَزِ، وَأَبْلَتْ رَأْسَ الْفِرْجَارِ فِيهَا، ثُمَّ أَرْسُمْ الدَّائِرَة.

الخطوة 2



أَرْسُمْ وَتَرَا، ثُمَّ أَحَدَدْ الْقَوْسَ الْأَكْبَرَ وَالْقَوْسَ الْأَصْغَرَ النَّاتِجَيْنِ مِنْهُ.

الخطوة 3


أَرْسُمْ دَائِرَةً طُولُ نَصْفِ قُطْرِهَا 5 cm ، ثُمَّ أَرْسُمْ فِيهَا وَتَرَا، مُحَدِّدًا عَلَى الدَّائِرَةِ الْقَوْسَ الْأَكْبَرَ وَالْقَوْسَ الْأَصْغَرَ النَّاتِجَيْنِ مِنَ الْوَتَرِ.

اتدقق من فهمي:




أُسَمِّي جُزْءُ الدَّائِرَةِ الْمُلَوَّنُ بِاللَّوْنِ الْأَحْمَرِ فِي كُلِّ مِمَا يَأْتِي:


1




2



3




4



اعْتِمَادًا عَلَى الرَّسْمِ أَدْنَا، أَصْبِعْ إِشَارَةً (✓) بِجَانِبِ الْعِبَارَةِ الصَّحِيحَةِ، وَإِشَارَةً (✗) بِجَانِبِ الْعِبَارَةِ غَيْرِ الصَّحِيحَةِ فِي مَا يَأْتِي، ثُمَّ أَصْبِبْ غَيْرِ الصَّحِيحِ مِنْهَا:

عِنْدَ رَسْمِ الدَّائِرَةِ، يُفْتَحُ الْفِرْجَارُ فُتْحَةً بِمِقْدَارٍ طُولِ نِصْفِ قُطْرِهِ. ()



5 قُطْرٌ فِي الدَّائِرَةِ. ()

6 هُوَ أَطْوَلُ وَتَرٌ فِي الدَّائِرَةِ. ()

7 نِصْفُ قُطْرٍ فِي الدَّائِرَةِ. ()


8 طُولُ قُطْرِ الدَّائِرَةِ هُوَ 2 cm. ()

إِرْشَادٌ

القطعة المحصورة بين النقطتين A و B هي قطعة مستقيمة، ونرمز لها بالرمز \overline{BA} أو \overline{AB} ، والنقطتان A و B هما طرفاها.




الوحدة 4



إذا كان طول قطر دائرة 4 m ، فما طول نصف قطرها؟

10



إذا كان طول نصف قطر دائرة 12 cm ، فما طول قطرها؟


11

أَرْسُمْ دَائِرَةً طُولُ نِصْفِ قُطْرِهَا 4 cm ، ثُمَّ أَرْسُمْ فِيهَا وَتَرًا، مُحَدِّدًا عَلَى الدَّائِرَةِ الْقَوْسَ الْأَكْبَرَ وَالْقَوْسَ الْأَصْغَرَ النَّاتِجَيْنِ مِنَ الْوَتَرِ.

12

إرشاد

القوس الأصغر هو القوس القريب من الوتر، والقوس الأكبر هو القوس بعيد عنه.



قُطْرٌ.

13

ثَلَاثَةُ أَنْصَافٍ أَقْطَارٍ.

14

أَرْبَعَةُ أَوْتَارٍ.

15

قَوْسٌ أَصْغَرُ.

16

قَوْسٌ أَكْبَرُ.

17


أَمْلأُ الْفَرَاغَ بِمَا هُوَ مُنَاسِبٌ فِي الْجَدْوَلِ الْأَتَيِ:

18

نِصْفُ الْقُطْرِ	الْقُطْرُ
26.5 cm	
	$37 \frac{1}{2}$ mm
$52 \frac{2}{5}$ m	
	99.8 cm
	192.6 mm

19

تَبَرِّيْر: قالت جنى: إن كل قطر هو وتر في الدائرة، هل قولها صحيح؟ أبْرُر إجابتي.



20

إذا كان طول قطر الدائرة B يساوي 12 cm، فما طول قطر الدائرة A ؟

21

إذا كان طول قطر الدائرة A يساوي 12 cm، فما طول نصف قطر الدائرة B ؟

22

إذا كان طول قطر الدائرة A يساوي 6 cm، فما طول قطر الدائرة B ؟

23

إذا كان طول قطر الدائرة B يساوي 6 cm، فما طول نصف قطر الدائرة A ؟

تحدّ: أرسم مثلثاً كبيراً، وأسمه PQR ، ثم أقوم بالإنشاءات الهندسية التالية:

أرسم عموداً منصفاً لكل ضلع من أضلاع ΔPQR ، وأسمّ نقطة التقائه هذه الأعمدة C

24

أرسم دائرة مركزها C ، ونصف قطرها CP

25

كيف ترسم دائرة علماً طول قطرها يساوي مسطّرة وأفْرِجار؟

26



أتعلّم

تلقي الأعمدة المنصفة
لأضلاع المثلث في نقطة
واحدة.

فكرة الدرس

أَنْصَفُ قِطْعَةً مُسْتَقِيمَةً وَزاوِيَّةً.
أَرْسُمُ مُسْتَقِيمَاتٍ مُتَوَازِيَّةً
وَمُتَعَامِدَةً.

المطلحات

الإنشاءات الهندسية، العمود
المُنَصَّفُ، منصف الزاوية.




رَسَمَتِ الْمُهَنْدِسَةُ سُعادُ قِطْعَةً مُسْتَقِيمَةً عَلَى بَطَاقَةٍ كَمَا فِي الشَّكْلِ أَمْجَابِرِهِ إِذَا أَرَادَتْ رَسْمَ قِطْعَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ عَمَودِيَّةٍ تُنَصَّفُهَا بِاسْتِعْمَالِ الْمِسْطَرَةِ وَالْفِرْجَارِ فَقُطْعَةٌ فَكِيفَ يُمْكِنُهَا عَمَلُ ذَلِكَ؟

الإنشاءات الهندسية (geometric constructions) هي أشكال هندسية يمكن رسمها باستعمال المسطرة غير المدرجة والفرجار؛ أي لا تستعمل المسطرة لقياس الأطوال، ولا تستعمل المنقلة لقياس الزوايا، وإنما تستعمل حافة المسطرة لرسم المستقيم والشعاع والقطعة المستقيمة، ويستعمل الفرجار لرسم الدوائر وأقواسها فقط.

العمود المنصف (perpendicular bisector) لقطعة مستقيمة هو مسند عمودي على القطعة المستقيمة في نقطتها المنتصف، يقسمها قطعتين متساويتين متطابقتين، ويمكن استعمال الفرجار لإنشاء عمود منصف لقطعة مستقيمة.


مثال 1

أَرْسُمُ قِطْعَةً مُسْتَقِيمَةً طُولُهَا 8 cm، ثُمَّ أَنْشِئُ مَنْصَفًا عَمَودِيًّا لَهَا بِاسْتِعْمَالِ الْمِسْطَرَةِ وَالْفِرْجَارِ.



أَسْتَعْمَلُ الْمِسْطَرَةَ لِرَسْمِ قِطْعَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ طُولُهَا 8 cm، ثُمَّ أَسْمِيَّهَا \overline{AB} .

الخطوة 1



أَفْتَحُ الْفِرْجَارَ فُتْحَةً تَزِيدُ عَلَى نِصْفِ الْقِطْعَةِ الْمَرْسُومَةِ \overline{AB} ، ثُمَّ أَثْبِتُ رَأْسَهُ عِنْدَ النُّقْطَةِ A، ثُمَّ أَرْسُمُ قَوْسًا كَبِيرًا يَقْطِعُ الْقِطْعَةَ \overline{AB} .


الخطوة 2

الخطوة 3

أَضَعْ رَأْسَ الْفِرْجَارِ عِنْدَ النُّقْطَةِ B مِنْ دُونِ تَغْيِيرِ مِقْدَارِ فُتْحَتِهِ، ثُمَّ أَرْسِمْ قَوْسًا كَبِيرًا آخَرَ يَقْطُعُ الْقِطْعَةَ AB ، فَيَتَقَاطِعُ الْقَوْسَانِ فِي نُقطَتَيْنِ (إِذَا لَمْ يَتَقَاطِعُ الْقَوْسَانِ مَرَّتَيْنِ، فَأَنَّا كَدُّ أَنَّهُمَا امْتَدَّا عَلَى نَحْوِ كَافِ).

الخطوة 4

أَرْسِمْ خَطًّا مُسْتَقِيمًا يَمْرُّ بِنُقطَتَيْ تَقَاطِعِ الْقَوْسَيْنِ، وَيُعَدُّ الْمُنْصَفُ الْعَمُودِيَّ لِلْقِطْعَةِ.



اتحقق من فهمي: أَرْسِمْ قِطْعَةً مُسْتَقِيمَةً طُولُهَا 6 cm، ثُمَّ أَنْشِئْ مُنَصَّفًا عَمُودِيًّا لَهَا



بِاسْتِعْمَالِ الْمِسْطَرَةِ وَالْفِرْجَارِ.

منصف الزاوية (angle bisector) هُوَ شَعَاعٌ يُقْسِمُ الزَّاوِيَةَ إِلَى زَاوِيَتَيْنِ مُتَطَابِقَتَيْنِ، وَيُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ الْفِرْجَارِ لِرَسِمِ مُنَصَّفِ الزَّاوِيَةِ.

مثال 2


أَرْسِمْ زَاوِيَةً قِيَاسُهَا 70° ، ثُمَّ أَنْصِفُهَا بِاسْتِعْمَالِ الْمِسْطَرَةِ وَالْفِرْجَارِ.

الخطوة 1 أَسْتَعْمِلُ الْمِنْقَلَةَ لِرَسِمِ زَاوِيَةٍ قِيَاسُهَا 70°




الخطوة 2 أَثْبَتْ رَأْسَ الْفِرْجَارِ عِنْدَ رَأْسِ الزَّاوِيَةِ A ، ثُمَّ أَرْسِمْ قَوْسًا يَتَقَاطِعُ مَعَ ضِلَاعِي $\angle A$ ، ثُمَّ أَسْمِي نُقطَتَيْ التَّقَاطِعِ B, C .

الوحدة 4




أثبتت رأس الفرجار عند النقطة B ، ثم أرسم قوساً داخل $\angle A$.

الخطوة 3



أثبتت رأس الفرجار عند النقطة C ، من دون تغيير مقدار فتحته، ثم أرسم قوساً يقطع القوس المرسوم من النقطة B .

الخطوة 4



أسمى نقطة تقاطع القوسين D ، واستعمل المستطرة لرسم منصف الزاوية.

الخطوة 5

اتحقق من فهمي:

أرسم زاوية قياسها 120° ، ثم أنصفها باستعمال المستطرة والفرجار.

تعلمتُ كيف أرسم مستقيمين متعددين باستعمال المستطرة والمثلث قائم الزاوية. والآن أستطيع استعمال المستطرة والفرجار لإنشاء عمود على قطعة مستقيمة من نقطة واقعه عليه، أو نقطة خارجه.

مثال 3

أرسم مستقيماً عمودياً على المستقيم l من النقطة P .



1

$P \bullet$




الخطوة 1

أفتح الفرجار فتحةً مُناسبةً، ثم أثبت رأسه عند النقطة P ، ثم أرسم قوساً يقطع المستقيم l في النقطتين A, B .





الخطوة 2

فتح الفرجار فتحةً تزيد على نصف المسافة AB ، ثم أرسم قوساً من النقطة A ، ثم أرسم قوساً آخر من النقطة B ؛ على أنْ يتقاطع القوسان في النقطة Q .




الخطوة 3

استعمل المسطرة لرسم المستقيم المار بـالنقطتين P و Q ، فينتج المستقيم \overleftrightarrow{PQ} العمودي على المستقيم l .



الخطوة 1


أفتح الفرجار فتحةً مُناسبةً، ثم أثبت رأسه عند النقطة P ، ثم أرسم قوساً يقطع المستقيم m في النقطتين A, B .



الخطوة 2

أفتح الفرجار فتحةً تزيد على نصف المسافة AB ، ثم أرسم قوساً من النقطة A ، ثم أرسم قوساً آخر من النقطة B ؛ على أنْ يتقاطع القوسان في النقطة C .

الوحدة 4



أَسْتَعْمِلُ الْمِسْطَرَةَ لِرَسْمِ الْمُسْتَقِيمِ الْمَارِ بِالنُّقُطَتَيْنِ P وَ C ، فَيَتَبَعُ الْمُسْتَقِيمُ \overleftrightarrow{PC} الْعَمُودِيُّ عَلَى الْمُسْتَقِيمِ m .


الخطوة 3

تحقق من فهمي:



أَرْسِمْ مُسْتَقِيمًا عَمُودِيًّا عَلَى الْقِطْعَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ \overline{AB} مِنَ النُّقطَةِ C .

3



أَرْسِمْ مُسْتَقِيمًا عَمُودِيًّا عَلَى الْقِطْعَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ \overline{AB} مِنَ النُّقطَةِ D .

4

يُمْكِنُنِي اسْتِعْمَالُ الْمِسْطَرَةِ وَالْمُثَلَّثِ الْقَائِمِ الزَّاوِيَةِ لِرَسْمِ مُسْتَقِيمٍ مُوازٍ لِلْمُسْتَقِيمِ آخَرَ مِنْ نُقْطَةٍ مُعْطَاةٍ.

مثال 4



أَسْتَعْمِلُ الْمِسْطَرَةَ وَالْمُثَلَّثَ الْقَائِمِ الزَّاوِيَةِ لِرَسْمِ مُسْتَقِيمٍ مُوازٍ لِلْمُسْتَقِيمِ \overleftrightarrow{AB} ، وَيَبْعُدُ عَنْهُ مَسَافَةً 4 cm.

أُحَرِّكُ الْمُنْثَلَّ إِلَى أَعْلَى حَتَّى يَصِلَ

عِنْدَ تَدْرِيجِ 4 cm مِنَ الْمِسْطَرَةِ، وَأَرْسِمْ قِطْعَةً مُسْتَقِيمَةً

أَسْفَلَ الْمُثَلَّثِ.



الخطوة 2

أَضْعُ أَحَدَ طَرَفِيِّ الْزَّاوِيَةِ الْقَائِمَةِ

لِلْمُثَلَّثِ الْقَائِمِ عَلَى الْمُسْتَقِيمِ \overleftrightarrow{AB} ، ثُمَّ أَضْعُ الْمِسْطَرَةَ

مُلَاصِقَةً لِلضَّلِعِ الثَّانِي لِلْزَّاوِيَةِ الْقَائِمَةِ بِحِيثُ يَكُونُ صَفْرٌ


تَدْرِيجُ الْمِسْطَرَةِ عَلَى الْخَطِّ تَمَامًا.



الخطوة 3


أكمل رسم القطعة إلى مستقيم باستعمال المسطرة وأسمه \overleftrightarrow{CD}

ينتج المستقيم CD موازياً للمستقيم AB ، ويبعد عنه مسافة 4 cm



تحقق من فهمي:

استعمل المسطرة والمثلث القائم الزاوية لرسم مستقيم مواز للمستقيمه MN ، ويعبر بالنقطة E .



اتدرُّب وأحل المسائل

أرسم قطعة مستقيمة طولها 12 cm ثم أنشئ منصفا عمودياً لها باستعمال المسطرة والفرجار.

أرسم زاوية قياسها 80° ، ثم أنصفها باستعمال المسطرة والفرجار.

أرسم زاوية حادة، ثم أنصفها باستعمال المسطرة والفرجار.


أرسم زاوية منفرجة، ثم أنصفها باستعمال المسطرة والفرجار.

أرسم مستقيما عمودياً على المستقيم AB من النقطة C .

اتذَّكر

قياس الزاوية القائمة يساوي 90° تماماً، والزاوية الحادة قياسها من 0° إلى أقل من 90° ، أمّا الزاوية المنفرجة فيقياسها أكبر من 90° وأصغر من 180° ، وأخيراً الزاوية المستقيمة قياسها يساوي 180° ، وتبدو كخط مستقيم تماماً.

الوحدة 4



أَرْسِمْ مُسْتَقِيمًا عَمْدِيًّا عَلَى الْمُسْتَقِيمِ \overleftrightarrow{GH} مِنَ النُّقْطَةِ J .

6

أَسْتَعْمِلُ الْمِسْطَرَةَ وَالْمُثَلَّثَ الْقَائِمَ الزَّاوِيَّةَ لِرَسِمْ مُسْتَقِيمٍ مُوازٍ لِلْمُسْتَقِيمِ \overleftrightarrow{AB} , وَيَعْدُ
عَنْهُ مَسَافَةً 6 cm.

7

كَمْ مُسْتَقِيمًا يُمْكِنْ رَسْمُهُ بِحِيثُ يَكُونُ مُوازِيًّا لِلْمُسْتَقِيمِ \overleftrightarrow{AB}
بَدْءًا بِالنُّقْطَةِ C ؟

8

وَقَفَ مُحَمَّدٌ عِنْدَ النُّقْطَةِ T مُوَاجِهًا الشَّارِعَ الَّذِي يُمَثِّلُهُ الْمُسْتَقِيمُ \overleftrightarrow{AB} :

9


أَرْسِمْ الْمُسْتَقِيمَ الَّذِي يُمَثِّلُ أَقْصَرَ مَسَافَةً يَقْطَعُهَا مُحَمَّدٌ
لِلْوُصُولِ إِلَى الشَّارِعِ.

10

أَرْسِمْ الْمُسْتَقِيمَ الَّذِي يُمَثِّلُ الطَّرِيقَ الَّذِي يَسْلُكُهُ مُحَمَّدٌ مِنْ دُونِ أَنْ يَقْطَعَ الشَّارِعَ مَهْمَا ابْتَدَأَ.

أَتَعْلَمُ

عِنْدَ رَسِمْ مُسْتَقِيمَيْنِ مُتَعَامِدَيْنِ، فَيَانَ الرَّوَايَا حَوْلَ نُقْطَةِ تَلاقيِ الْمُسْتَقِيمَيْنِ تَكُونُ مُطَابَقَةً، وَقِيَاسُ كُلِّ مِنْهَا 90° , وَيُمْكِنُ التَّسْهُلُ مِنْ صِحَّةِ الْحَلِّ باسْتِعْمَالِ الْمُنْقَلَةِ لِقِيَاسِ الرَّوَايَا النَّاتِجَةِ.



يُمَثِّلُ الرَّسِمُ الْمُجاوِرُ قِطْعَتَيْنِ مُسْتَقِيمَيْنِ مُتَعَامِدَيْنِ:



أَسْتَعْمِلُ الْفِرْجَارَ لِإِنْشَاءِ عَمْدِيَّنِ مُنَصَّفَيْنِ لِكُلِّ مِنَ الْقِطْعَتَيْنِ: \overline{BC} وَ \overline{AB}


11

ما الشَّكْلُ الرُّبَاعِيُّ النَّاتِجُ مِنْ رَسِمِ الْمُنَصَّفَيْنِ؟ أُوْضِحُ إِجَابَتِي.

12


مُنَصَّفُ $\angle NPM$ هُوَ \overrightarrow{PQ} . أَكْتُبُ جُملَةً عَدْدِيَّةً تُمَثِّلُ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ $m\angle QPM$ وَ $m\angle NPM$.

13




تَحْدِيدٌ: A هي نقطة داخل المثلث EFG . أرسم من A ثلاثة مُستقيمات متعامدة على التوالي مع أضلاع المثلث EFG , مستعملًا المثلث القائم الزاوية.

14



أَكْتَشِفُ الْخَطَّاً: يُظْهِر الرَّسْمُ الْمُجَاوِرُ كَيْفَ حَاوَلَ خالِدُ رَسْمَ مُنْصَفٍ عَمْوَدِيٍّ لِقَطْعَةِ بِاسْتِعْمَالِ الْمِسْطَرَةِ، مُحَدِّدًا مُنْصَفَهَا بِالْقِيَاسِ، ثُمَّ رَسَمَ خَطًّا مُسْتَقِيمًّا يَمْرُّ بِهِذَا الْمُنْصَفِ. أُوْضِحْ خَطًّا خالِدٌ.

15



في الشكل المجاور، أفترض أن $m\angle ABC = n$, و $\angle ABC = 2(m\angle DBC)$ $m\angle EBC = \angle DBC$

16

رسّمت سماح زاويّة على بطاقة كما في الشكل المجاور، ثم أرادت نقل الزاويّة بالقياس نفسه إلى بطاقة أخرى بِاسْتِعْمَالِ الْمِسْطَرَةِ وَالْفِرْجَارِ فَقَطْ. كَيْفَ يُمْكِنُهَا عَمَلُ ذلك؟



أشرح خطوات رسم منصف زاوية قياسها 100° بِاسْتِعْمَالِ الْمِسْطَرَةِ وَالْفِرْجَارِ.

17

إرشاد

لنقل زاويّة مرسومة بِاسْتِعْمَالِ الْمِسْطَرَةِ وَالْفِرْجَارِ فقط، ارسم أحد أضلاع الزاويّة الجديده، ثم استعمل فتحة الفرجار لايجاد قياس الزاويّة، وبفتحة الفرجار نفسها ارسم الزاويّة الجديدة، ثم ارسم الضلع الآخر.

18



فكرة الدرس




أَرْسُمُ مُثَلِّثاً بِاسْتِعْمَالِ الْمِسْطَرَةِ
وَالْمِنْقَلَةِ وَالْفِرْجَارِ.



تُسْتَعْمَلُ الْمُثَلَّثُ لِبَنَاءِ الْجُسُورِ وَالْأَبْرَاجِ؛
مَا يَزِيدُهَا فُوَّةً. لَدِي خَالِدٍ أَرْبَعُ قِطْعَ حَدِيدَةٌ،
أَطْوَالُهَا: 2 m , 3 m , 4 m , 5 m ، أيُّ
هَذِهِ الْقِطْعَ يَتَعَذَّرُ عَلَى خَالِدٍ اسْتِعْمَالُهَا لِبَنَاءِ
مُثَلِّثٍ فِي الْجِسْرِ؟

يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ الْمِسْطَرَةِ وَالْمِنْقَلَةِ وَالْفِرْجَارِ لِرَسُمِ مُثَلِّثٍ عُلِّمَتْ أَطْوَالُ أَضْلاعِهِ التَّلَاثَةِ.


مثال 1



أَسْتَعْمَلُ الْمِسْطَرَةَ وَالْفِرْجَارَ لِرَسُمِ مُثَلِّثٍ أَطْوَالُ أَضْلاعِهِ: 7 cm , 4 cm , 5 cm


أَرْسُمُ مُخَطَّطاً يُمَثِّلُ الْمُثَلَّثَ الْمَطْلُوبَ.

الخطوة 1




أَرْسُمُ الْقِطْعَةَ الْمُسْتَقِيمَةَ \overline{AB} الَّتِي طُولُهَا
7 cm بِاسْتِعْمَالِ الْمِسْطَرَةِ (أَكْتُبْ طَوْلَ الْقِطْعَةِ
الْمُسْتَقِيمَةِ أَسْفَلَهَا).

الخطوة 2




أَفْتَحُ الْفِرْجَارَ فُتْحَةً مِقْدَارُهَا 4 cm ، ثُمَّ أَثْبِتُ
رَأْسَهُ عِنْدَ النُّقْطَةِ A ، ثُمَّ أَرْسُمُ قَوْسًا (أَتَأَكُدُ أَنَّ فُتْحَةَ
الْفِرْجَارِ لَمْ تَتَغَيَّرْ).

الخطوة 3



أَفْتَحُ الْفِرْجَارَ فُتْحَةً مِقْدَارُهَا 5 cm ، ثُمَّ أَثْبِتُ رَأْسَهُ عِنْدَ النُّقْطَةِ B ، ثُمَّ
أَرْسُمُ قَوْسًا آخَرَ يَقْطَعُ الْقَوْسَ الْأَوَّلَ.

الخطوة 4



أحد نقطتاً تتقاطع القوسين، وأسميهما النقطة C ، ثم أصل بينها وبين طرفي القطعة المستقيمة باستعمال المسطرة.

الخطوة 5

اتحقق من فهمي:


استعمل المسطرة والفرجار لرسم مثلث أطوال أضلاعه: 2 cm, 4 cm, 5 cm



رشاد

عند رسم مثلث له ضلعان وزاوية مخصوصة، أو زوايتان وضلع مخصوص، أتحقق من صحة رسم الزاوية بمقارنتها قياسها بنوعها (حادية، قائمة، منفرجة).

الصلع المحصور بين زاويتين



يمكن استعمال المسطرة والمنقلة والفرجار لرسم مثلث عُلم منه قياس زاويتين، وطول ضلع محصور.


الصلع a ضلع محصور بين الزاويتين B و C

مثال 2

استعمل المسطرة والمنقلة لرسم المثلث ABC إذا كان: $BC = 8 \text{ cm}$, $m\angle B = 35^\circ$, $m\angle C = 70^\circ$


الخطوة 2

أرسم القطعة المستقيمة \overline{BC} التي طولها 8 cm باستعمال المسطرة.



الخطوة 1




أرسم مخططاً يمثل المثلث المطلوب.



الوحدة 4



الخطوة 4

أَصْعِ مَرْكَزَ الْمِنْقَلَةِ عِنْدَ النُّقْطَةِ C ، ثُمَّ أَرْسِمْ زَوْيَةً قياسُهَا 70° ، ثُمَّ أَحْدِدْ نُقْطَةً تَقَاطِعُ ضِلْعَي الرَّاوِيَتَيْنِ الْمَرْسُومَتَيْنِ، وَأَسْمِيَهَا A .



الخطوة 3

أَصْعِ مَرْكَزَ الْمِنْقَلَةِ عِنْدَ النُّقْطَةِ B ، ثُمَّ أَرْسِمْ زَوْيَةً قياسُهَا 35°




الخطوة 5

يَتَجَزُّ مُثَلَّثٌ طُولُ أَحَدِ أَضْلاعِهِ 8 cm ، وَقِيَاسُ الرَّاوِيَتَيْنِ فِي طَرَفَيِّ هَذَا الضَّلْعِ

أتدقق من فهمي:

أَسْتَعْمِلُ الْمِسْطَرَةَ وَالْمِنْقَلَةَ لِرَسْمِ الْمُثَلَّثِ XYZ إِذَا كَانَ: $YZ = 6\text{ cm}$, $m\angle Y = 30^\circ$, $m\angle Z = 115^\circ$

الزاوية المحصورة بين ضلعين




يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ الْمِسْطَرَةِ وَالْمِنْقَلَةِ وَالْفِرْجَارِ لِرَسْمِ مُثَلَّثٍ عُلِّمَ مِنْهُ ضِلْعَانِ وَزَوْيَةٍ مَحْصُورَةٍ.

زاوية محصورة بين الضلعين b و c $\angle A$

أَسْتَعْمِلُ الْمِسْطَرَةَ وَالْمِنْقَلَةَ لِرَسْمِ الْمُثَلَّثِ LMN إِذَا كَانَ: $MN = 4.5 \text{ cm}$, $LN = 7 \text{ cm}$, $m\angle N = 75^\circ$


الخطوة 2

أَرْسِمُ الْقِطْعَةَ الْمُسْتَقِيمَةَ \overline{LN} الَّتِي طُولُهَا 7 cm بِاسْتِعْمَالِ الْمِسْطَرَةِ.




الخطوة 1

أَرْسِمُ مُخَطَّطاً يُمَثِّلُ الْمُثَلَّثَ الْمَطلُوبَ.





الخطوة 4

أَحَدِّدُ بِاسْتِعْمَالِ الْمِسْطَرَةِ طُولَ 4.5 cm عَلَى ضِلْعِ الزَّاوِيَةِ الْمَرْسُومَةِ، ثُمَّ أَحَدِّدُ النُّقطَةَ M .



الخطوة 3

أَضْعِفُ مَرْكَزَ الْمِنْقَلَةِ عِنْدَ النُّقطَةِ N ، ثُمَّ أَرْسِمُ زَاوِيَةً قِياسُها 75°



أَصِلُّ بَيْنَ النُّقطَةِ L وَالنُّقطَةِ M ، فَيُنْتَجُ الْمُثَلَّثُ الْمَطلُوبُ.

الخطوة 5

اتحقق من فهمي:



أَسْتَعْمِلُ الْمِسْطَرَةَ وَالْمِنْقَلَةَ لِرَسْمِ الْمُثَلَّثِ ABC الْمُتَطَابِقِ الضَّلْعَيْنِ، وَطُولُ كُلِّ ضِلْعٍ مِنْهُمَا 6 cm ، وَقِياسُ الزَّاوِيَةِ الْمَحْصُورَةِ بَيْنِهِمَا 100°

يُمْكِنُ اسْتَعْمَالُ الْمِسْطَرَةَ وَالْمِنْقَلَةَ وَالْفِرْجَارِ لِرَسْمِ مُثَلَّثٍ عُلِمَ مِنْهُ ضِلْعَانِ وَزَاوِيَةٌ غَيْرُ مَحْصُورَةٍ.

الوحدة 4

مثال 4

أَسْتَعْمِلُ الْمِسْطَرَةَ وَالْمِنْقَلَةَ وَالْفِرْجَارَ لِرَسْمِ الْمُثَلَّثِ ABC إِذَا كَانَ: $AC = 5 \text{ cm}$, $AB = 3 \text{ cm}$, $m\angle B = 50^\circ$


الخطوة 2

أَرْسِمُ الْقِطْعَةَ الْمُسْتَقِيمَةَ \overline{AB} الَّتِي طُولُهَا 3 cm بِاسْتِعْمَالِ الْمِسْطَرَةِ.





الخطوة 1

أَرْسِمُ مُخَطَّطاً يُمَثِّلُ الْمُثَلَّثَ الْمَطلُوبَ.




الخطوة 4

أَفْتُحُ الْفِرْجَارَ فَتَحَّةً مِقْدَارُهَا 5 cm , ثُمَّ أَثْبِتُ رَأْسَهُ عِنْدَ النُّقْطَةِ A , ثُمَّ أَرْسِمُ قَوْسًا يَقْطَعُ \overrightarrow{BC} فِي C .



الخطوة 3

أَصْبِعُ مَرْكَزَ الْمِنْقَلَةِ عِنْدَ النُّقْطَةِ B , ثُمَّ أَرْسِمُ زَاوِيَةً قِيَاسُهَا 50°



الخطوة 5

أَرْسِمُ \overline{AC} , فَيَكُونُ الْمُثَلَّثُ الْمَطلُوبُ.

أَسْتَعْمِلُ الْمِسْطَرَةَ وَالْمِنْقَلَةَ وَالْفِرْجَارَ لِرَسْمِ الْمُثَلَّثِ IJH إِذَا كَانَ: $JH = 8 \text{ cm}$, $IJ = 5 \text{ cm}$, $m\angle H = 43^\circ$

اتحقق من فهمي:



أَسْتَتِّنْجُ مِنَ الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ حَالَاتِ رَسْمِ الْمُثَلِّثِ بِحَسْبِ مُعْطِيَاتِهَا هِيَ:

1 إِذَا عِلِّمْتَ أَطْوَالَ أَضْلاعِ الْمُثَلِّثِ التَّلَاثَةِ.

2 إِذَا عِلِّمَ قِيَاسُ زَاوِيَتَيْنِ فِي الْمُثَلِّثِ، وَطَوْلُ الضَّلْعِ الْمَحْصُورِ بَيْنَهُمَا.

3 إِذَا عِلِّمَ طَوْلُ ضَلْعَيْنِ فِي الْمُثَلِّثِ، وَقِيَاسُ الزَّاوِيَةِ الْمَحْصُورَةِ بَيْنَهُمَا.

4 إِذَا عِلِّمَ طَوْلُ ضَلْعَيْنِ فِي الْمُثَلِّثِ، وَقِيَاسُ الزَّاوِيَةِ عَيْرِ الْمَحْصُورَةِ بَيْنَهُمَا.

أتدرِّبُ وأحلُّ المسائل

أَسْتَعْمِلُ الْمِسْطَرَةَ وَالْفِرْجَارَ لِرَسْمِ ΔABC , حَيْثُ:

1 $AB = 3 \text{ cm}, BC = 5 \text{ cm}, AC = 7 \text{ cm}$

2 $AB = 6 \text{ cm}, BC = 4 \text{ cm}, AC = 5 \text{ cm}$

أَسْتَعْمِلُ الْمِسْطَرَةَ وَالْمِنْقَلَةَ لِرَسْمِ ΔABC , حَيْثُ:

3 $AB = 6 \text{ cm}, m\angle CAB = 40^\circ, m\angle CBA = 60^\circ$

4 $AB = 5 \text{ cm}, m\angle CAB = 30^\circ, m\angle CBA = 50^\circ$

أَسْتَعْمِلُ الْمِسْطَرَةَ وَالْمِنْقَلَةَ وَالْفِرْجَارَ لِرَسْمِ ΔABC , حَيْثُ:

5 $AB = 4 \text{ cm}, AC = 6 \text{ cm}, m\angle BAC = 50^\circ$

6 $AB = 5 \text{ cm}, AC = 4 \text{ cm}, m\angle BAC = 60^\circ$

أَسْتَعْمِلُ الْمِسْطَرَةَ وَالْمِنْقَلَةَ وَالْفِرْجَارَ لِرَسْمِ ΔABC , حَيْثُ:

7 $AB = 5 \text{ cm}, AC = 6 \text{ cm}, m\angle ABC = 35^\circ$

8 $AB = 6 \text{ cm}, AC = 4 \text{ cm}, m\angle ABC = 40^\circ$

أَسْتَعْمِلُ الْمِسْطَرَةَ وَالْمِنْقَلَةَ لِرَسْمِ مُرَبَّعٍ، طَوْلُ ضَلْعِهِ 3 cm

إِرشاد

عِنْدَمَا أَرْسُمُ الزَّاوِيَةَ الْمُعْطَى قِيَاسُها، أَصْبُعُ الْمِنْقَلَةَ فِي الْمَكَانِ الْمُنْسِبِ، وَأَخْتَارُ الْقِيَاسَ الصَّحِيحَ الْمُعْطَى بِدِقَّةً.

الوحدة 4

أَرْسُمْ بِدِقَّةٍ ΔABC ، حَيْثُ $AB = 8 \text{ cm}$, $BC = 5.5 \text{ cm}$, $AC = 4 \text{ cm}$ ، ثُمَّ أَرْسُمْ

عَلَى الشَّكْلِ نَفْسِهِ كَلَّا مِمَا يَأْتِي:


10. مُنَصَّفَ الزَّاوِيَةِ BAC .

11. المُنَصِّفَ الْعَمُودِيَّ لِلْقِطْعَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ AB .



مهارات التفكير العليا

اكتشف الخطأ: أرادت مَنَار رَسْمَ مُثَلِّثٍ، فَبَدَأَتْ بِرَسْمِ إِحْدَى زَوَالِيَّاتِ الْمُوضَحةِ أدناه. قَالَتْ لَهَا زَمِيلُهَا سُندُسُ: إِنَّكِ سَتَرْسُمِينَ مُثَلِّثًا حَادَ الزَّوَالِيَّا هَلْ مَا قَالَهُ سُندُسُ صَحِيحٌ؟ أَرْسَمْ مُثَلِّثَيْنِ يَحْقِقُانِ الْمُطلُوبَ، مَا نَوْعُ كُلِّ مِنْهُمَا؟ أَبْرُرْ إِجَابَتِي.



تَبَرِّرُ: مُثَلِّثَيْنِ مُخْتَلِفَانِ، يَشْتَرِكُانْ بِطُولِيْ ضَلَاعِيْنِ، طُولُ الْأَوَّلِ 13 وَحْدَةً، وَطُولُ الْثَّانِي 16 وَحْدَةً، وَزَاوِيَّةٌ غَيْرٌ مَحْصُورَةٌ بَيْنَهُمَا، قِيَاسُهَا 50° ، أَرْسَمْ مُثَلِّثَيْنِ يَحْقِقُانِ الْمُطلُوبَ، مَا نَوْعُ كُلِّ مِنْهُمَا؟ أَبْرُرْ إِجَابَتِي.

تَحدِّدُ: أَرْسَمْ مُثَلِّثًا أَطْوَالَ أَضْلاعِهِ: 5 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. وَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَيَّ ذَلِكَ، فَأَبْرُرْ إِجَابَتِي.

مَسَالَةٌ مَفْتوحةٌ: أَرْسَمْ المُثَلِّثَ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي بِحَسْبِ الزَّوَالِيَّا الْمُعْطَاةِ إِنْ أَمْكَنَ:

15. $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$

16. $100^\circ, 55^\circ, 25^\circ$

17. $60^\circ, 60^\circ, 80^\circ$

إرشاد

عِنْدَمَا أَرْسَمْ مُثَلِّثًا فِيهِ زَاوِيَّاتٌ وَضِلْعٌ مَحْصُورٌ، أَتَحَقَّقُ مِنْ دَقَّةِ الرَّسْمِ عَنْ طَرِيقِ قِيَاسِ الزَّاوِيَّةِ الثَّالِثَةِ الَّتِي لَمْ يُعْطَ قِيَاسُهَا فِي الْمُسَالَةِ بِاسْتِعْمَالِ الْمُنْقَلَةِ، ثُمَّ أَجْمَعُ هَذَا الْقِيَاسَ مَعَ الْقِيَاسَيْنِ الْمُعْلَمَيْنِ، بِحِيثُ يَكُونُ الْمُجْمُوعُ 180°


أَشْرُحْ خُطُواتِ رَسْمِ مُثَلِّثٍ بِاسْتِعْمَالِ الْمِسْطَرَةِ وَالْفِرْجَارِ.

أَكْتُبْ

اختبار الوحدة

اعتماداً على الإنشاء الهندسي الآتي، أي العبارات التالية صحيحة:


- a) $m\angle ABD = \frac{1}{2} m\angle CBD$
- b) $m\angle ABD = m\angle ABC$
- c) $m\angle ABD = m\angle CBD$
- d) $m\angle CBD = \frac{1}{2} m\angle ABD$




6

يبين الشكل الآتي إنشاء عمود منصف للقطعة AB. أي العبارات التالية ليست صحيحة:

- a) $AC = CB$
- b) $AC = 2AB$
- c) $CB = \frac{1}{2} AB$
- d) $AC + CB = AB$




7



أجد إحداثيات صورة رؤوس الشكل CJKM بالانعكاس حول المحوّر x، ثم أمثلها على المستوى الإحداثي.


8



أعين رؤوس صورة الشكل الآتي تحت تأثير انسحاب مقداره 5 وحدات إلى اليسار، و3 وحدات إلى الأسفل ثم أرسم المثلث الناتج.

9

اختار رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:



استعمل الشكل الآتي للإجابة

عن الأسئلة التي تليه:

- a) AC
- b) DE
- c) DB
- d) CE

أي مما يلي لا يمثل قطر في الدائرة:

- a) AE
- b) BD
- c) BC
- d) DE

أي مما يلي لا يمثل نصف قطر في الدائرة:

- a) AC
- b) BC
- c) AE
- d) CD

صورة النقطة (-4, 2) بالانعكاس حول المحور x هي:

- a) (-4, 2)
- b) (-2, 4)
- c) (-2, -4)
- d) (2, 4)


مثلث إحداثيات رؤوسه هي: $\triangle ABC$ مرسوم على المربع $C(1, 3), B(4, 2), A(2, 5)$.

الانسحاب الذي قاعده: $(x, y) \rightarrow (x+3, y-2)$:

- a) (-1, 3)
- b) (5, 3)
- c) (5, 8)
- d) (3, 5)

الوحدة 4

أي قواعد الانسحاب التالية نقلت المثلث ABC إلى $A'B'C'$ في الشكل الآتي:



14

- a) $(x,y) \rightarrow (2x, 3y)$
- b) $(x,y) \rightarrow (x-2, y+3)$
- c) $(x,y) \rightarrow (-x, -y)$
- d) $(x,y) \rightarrow (x+2, y-3)$

في أي الحالات الآتية يمكن رسم مثلث وحيد:

15

- a) $AB = 4 \text{ cm}, BC = 8 \text{ cm}, m\angle C = 60^\circ$
- b) $BC = 5.2 \text{ cm}, m\angle B = 90^\circ, m\angle C = 110^\circ$
- c) $XY = 5 \text{ cm}, YZ = 7 \text{ cm}, m\angle Y = 60^\circ$
- d) $m\angle A = 90^\circ, m\angle B = 40^\circ, m\angle C = 50^\circ$

طول نصف قطر دائرة 3cm . ما طول قطر دائرة

آخرى إذا كان طول نصف قطرها ثلاثة أمثال طول
نصف قطر الدائرة الأولى؟

16

- a) 18 cm
- b) 9 cm
- c) 6 cm
- d) 12 cm

استعمل المسطرة والمنقلة لرسم مثلث، طول ضلع فيه 5 cm ، وقياس الزاويتين على هذا الضلع $45^\circ, 30^\circ$

10

استعمل المسطرة والمثلث القائم الزاوية لرسم مُستقيم يوازي \overleftrightarrow{AB} ، ويمر بالقطة M .

11

$M \bullet$



تدريب على الاختبارات الدولية:

إذا كانت صورة انعكاس النقطة $J(-1,11)$ حول محاور هي $(-1,-11)^J$, فما صورة انعكاس النقطة $D(5,-5)$ حول المحور نفسه؟

12

- | | |
|------------|-------------|
| a) (-5, 5) | b) (5, 5) |
| c) (5, -5) | d) (-5, -5) |

أي زوج من النقاط الآتية يمثل انعكاساً للآخر حول المحور y ؟

13

- a) $A(7,8), A'(-7,-8)$
- b) $B(6,7), B'(6,-7)$
- c) $C(9,4), C'(9,-4)$
- d) $D(-8,5), D'(8,5)$