



الرياضيات

الصف الثاني عشر - الفرع العلمي

الفصل الدراسي الأول

12



إجابات كتاب التمارين

الناشر: المركز الوطني لتطوير المنهج



06-5376262 / 237



06-5376266



P.O.Box: 2088 Amman 11941



@nccdjor



feedback@nccd.gov.jo



www.nccd.gov.jo



إجابات كتاب التمارين - مادة الرياضيات - الصف الثاني عشر العلمي فـ ١

الوحدة الأولى: التفاضل

أستعد لدراسة الوحدة

إيجاد المشقة باستعمال التعريف العام صفة ٦

	$f(x) = 3x - 8$ $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ = $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x+h) - 8 - 3x + 8}{h}$ = $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h}{h} = 3$
١	$f(x) = 4x^3 + 3x$ $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ = $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{4(x+h)^3 + 3(x+h) - 4x^3 - 3x}{h}$ = $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{4(x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3) + 3x + 3h - 4x^3 - 3x}{h}$ = $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{4x^3 + 12x^2h + 12xh^2 + 4h^3 + 3x + 3h - 4x^3 - 3x}{h}$ = $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{12x^2h + 12xh^2 + 4h^3 + 3h}{h}$ = $\lim_{h \rightarrow 0} (12x^2 + 12xh + 4h^2 + 3)$ = $12x^2 + 3$



3

$$\begin{aligned}f(x) &= \frac{1}{x^2 - 4} \\f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(x+h)^2 - 4} - \frac{1}{x^2 - 4}}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 - 4 - (x+h)^2 + 4}{h(x^2 - 4)((x+h)^2 - 4)} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x-x-h)(x+x+h)}{h(x^2 - 4)((x+h)^2 - 4)} \\&\quad - h(2x+h) \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h(2x+h)}{h(x^2 - 4)((x+h)^2 - 4)} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(2x+h)}{(x^2 - 4)((x+h)^2 - 4)} \\&= \frac{-2x}{(x^2 - 4)^2}\end{aligned}$$

مشتقة اقتران القوة صفة 6

4 $f'(x) = 21x^2$

5 $f'(x) = 16x^{\frac{1}{3}}$

6 $f'(x) = 6x - \frac{5}{2}x^{-\frac{1}{2}} = 6x - \frac{5}{2\sqrt{x}}$

7 $f(x) = -3x^{-7}$

$f'(x) = 21x^{-8} = \frac{21}{x^8}$

8 $f(x) = x^5 - 2x^3$

$f'(x) = 5x^4 - 6x^2$

9 $y = 7x^{-3} + 3x^{-1} - 2$

$$\frac{dy}{dx} = -21x^{-4} - 3x^{-2} = -\frac{21}{x^4} - \frac{3}{x^2}$$

مشتقة الاقتران $y = (ax + b)^n$ صفة 7

10 $\frac{dy}{dx} = 6(2x-3)^5(2) = 12(2x-3)^5$



11	$y = (9 - 3x)^{\frac{1}{2}} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}(9 - 3x)^{-\frac{1}{2}}(-3) = -\frac{3}{2\sqrt{9 - 3x}}$
12	$y = (4x + 1)^{-\frac{1}{2}} \rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2}(4x + 1)^{-\frac{3}{2}}(4) = -\frac{2}{\sqrt{(4x + 1)^3}}$
إيجاد معادلة المماس عند نقطة ما صفرة 8	
13	$f'(x) = 2(3x + 2)(3) = 18x + 12$ $f'(-1) = 18(-1) + 12 = -6$ $y - y_1 = m(x - x_1) \rightarrow y - 1 = -6(x + 1)$ ميل المماس: $\rightarrow y = -6x - 5$ معادلة المماس:
14	$y - 1 = \frac{1}{6}(x + 1) \rightarrow y = \frac{1}{6}x + \frac{7}{6}$ بما أن ميل المماس هو 6 – إذن ميل العمودي هو $\frac{1}{6}$ معادلة العمودي على المماس:



الدرس الأول: الاشتتقاق

1	<p>f غير قابل للاشتتقاق عند القيم $x_1, x_2, x_3, x_4, x_6, x_9, x_{10}$ بسبب وجود زاوية لمنحنى الاقتران عند كل منها رغم أنه متصل، و f غير قابل للاشتتقاق عند القيم x_5, x_7 وذلك لأنه غير متصل عندهما، والاتصال شرط ضروري.</p>
2	$f(x) = 9e^x + \frac{1}{3}x^{-\frac{1}{2}}$ $f'(x) = 9e^x - \frac{1}{6}x^{-\frac{3}{2}} = 9e^x - \frac{1}{6\sqrt{x^3}}$
3	$f(x) = 2e^x + x^{-2}$ $f'(x) = 2e^x - 2x^{-3} = 2e^x - \frac{2}{x^3}$
4	$f'(x) = \frac{\pi}{2} \cos x + \sin x$
5	$f(x) = 2e^x + x , \quad x = 2$ $f(2) = 2e^2 + 2$ $f'(x) = 2e^x + 1$ $f'(2) = 2e^2 + 1$ <p>ميل المماس:</p> $y - 2e^2 - 2 = (2e^2 + 1)(x - 2)$ $y = (2e^2 + 1)x - 2e^2$ <p>معادلة المماس:</p>
6	$f'(x) = 3 + \cos x$ <p>عند المماس الأفقي يكون $f'(x) = 0$</p> $3 + \cos x = 0 \rightarrow \cos x = -3$ <p>وهذه المعادلة ليس لها حل لأن $-1 \leq \cos x \leq 1$.</p> <p>إذن، لا توجد مماسات أفقية لمنحنى f.</p>
7	$s(t) = 3t^2 - t^3 , t \geq 0$ $v(t) = 6t - 3t^2$ <p>السرعة:</p> $a(t) = 6 - 6t$ <p>التسارع:</p>



		يكون الجسم في حالة سكون عندما $v(t) = 0$
8	$v(t) = 6t - 3t^2 = 0 \rightarrow 3t(2 - t) = 0 \rightarrow t = 0, t = 2$ $s(0) = 0, s(2) = 12 - 8 = 4$	إذن يكون الجسم في حالة سكون لحظي عندما يكون في كل من المواقع: $s = 0 \text{ m}, s = 4 \text{ m}$
9	$f(x) = \ln x^2 = 2 \ln x, x = e^2$ $f(e^2) = 2 \ln e^2 = 4 \rightarrow (e^2, 4)$ $f'(x) = \frac{2}{x}$ $f'(e^2) = \frac{2}{e^2}$ $y - 4 = \frac{2}{e^2}(x - e^2) \rightarrow y = \frac{2}{e^2}x + 2$	ميل المماس: معادلة المماس:
10	$f'(x) = \frac{2}{x} = 3 \rightarrow x = \frac{2}{3}$	ميل المستقيم الذي معادلته 0 $6x - 2y + 5 = 0$ يساوي 3
11	$f'(x) = 2 \cos x + 4 \sin x$ $f'(0) = 2 \cos 0 + 4 \sin 0 = 2$	
12	$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \sin \frac{\pi}{2} - 4 \cos \frac{\pi}{2} = 2$ $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \frac{\pi}{2} + 4 \sin \frac{\pi}{2} = 4$ $y - 2 = 4\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow y = 4x - 2\pi + 2$	نجد الإحداثي y عندما $x = \frac{\pi}{2}$ ميل المماس: معادلة المماس:



الدرس الثاني: مشتقاً الضرب والقسمة والمشتقات العليا

1	$f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$
2	$f'(x) = \csc x \cot x - \cos x$
3	$f(x) = \frac{x^2 + cx}{x^2 + c}, x \neq 0$ $f'(x) = \frac{(2x+c)(x^2+c) - 2x(x^2+cx)}{(x^2+c)^2} = \frac{2cx - cx^2 + c^2}{(x^2+c)^2}, x \neq 0$
4	$f'(x) = -x \csc^2 x + \cot x$
5	$f'(x) = 4 - x^2 \sec^2 x - 2x \tan x$
6	$f'(x) = \frac{-x^2 \sin x - 2x \cos x}{x^4} = \frac{-x \sin x - 2 \cos x}{x^3}$
7	$f(x) = x - \frac{4x}{x+3}$ $f'(x) = 1 - \frac{4(x+3) - 4x}{(x+3)^2} = 1 - \frac{12}{(x+3)^2}$
8	$f'(x) = \frac{-6 \cos^2 x - (3 - 3 \sin x)(-2 \sin x)}{(2 \cos x)^2} = \frac{-6 + 6 \sin x}{4 \cos^2 x}$
9	$f'(x) = (x+1)e^x + e^x = (x+2)e^x$
10	$f'(x) = -x^2 \sin x + 2x \cos x$ $f'(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi^2}{4}$ $y - 0 = -\frac{\pi^2}{4}(x - \frac{\pi}{2}) \rightarrow y = -\frac{\pi^2}{4}x + \frac{\pi^3}{8}$ ميل المماس: معادلة المماس:
11	$f'(x) = \frac{(\cos x)(\cos x) + \sin x(1 + \sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1 + \sin x}{\cos^2 x}$ $f'(\pi) = \frac{1}{1} = 1$ $y + 1 = 1(x - \pi) \rightarrow y = x - \pi - 1$ ميل المماس: معادلة المماس:
12	$f'(x) = \frac{2x^2 - 4x^2 + 2x}{x^4} = \frac{-2x + 2}{x^3} = 0 \rightarrow x = 1$ $(1, f(1)) = (1, 1)$ النقطة المطلوبة هي:



13	$h'(x) = \frac{2x(x^2 + 1) - 2x^3}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2} = 0 \rightarrow x = 0$ $(0, h(0)) = (0, 0)$ النقطة المطلوبة هي:
14	$g(x) = \frac{8(x - 2)}{e^x}$ $g'(x) = \frac{8e^x - 8e^x(x - 2)}{e^{2x}} = \frac{8e^x(3 - x)}{e^{2x}} = \frac{8(3 - x)}{e^x} = 0 \rightarrow x = 3$ $(3, g(3)) = \left(3, \frac{8}{e^3}\right)$ النقطة المطلوبة هي:
15	$u'(1) = f(1)g'(1) + g(1)f'(1) = 2 \times 1 + 3 \times \frac{1}{3} = 3$
16	$v'(4) = \frac{g(4)f'(4) - f(4)g'(4)}{(g(4))^2} = \frac{2 \times \frac{1}{3} - 3 \times 1}{(2)^2} = -\frac{7}{12}$
17	$f'(x) = x \sec x \tan x + \sec x = \sec x (1 + x \tan x)$
18	$f'(x) = \frac{x \times \frac{1}{x} - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2} = \frac{1}{x^2} - \frac{\ln x}{x^2}$ $f''(x) = -\frac{2}{x^3} - \frac{x^2 \times \frac{1}{x} - 2x \ln x}{x^4} = \frac{-3 + 2 \ln x}{x^3}$
19	$a(t) = \frac{-20}{(2t + 15)^2}$ $a(5) = \frac{-20}{(10 + 15)^2} = -0.032 \text{ ft/s}^2$
20	$a(20) = \frac{-20}{(40 + 15)^2} \approx -0.007 \text{ ft/s}^2$
21	$A = \sqrt{t}(6t + 5) = 6t^{\frac{3}{2}} + 5t^{\frac{1}{2}}$ $\frac{dA}{dt} = 9t^{\frac{1}{2}} + \frac{5}{2}t^{-\frac{1}{2}} = 9\sqrt{t} + \frac{5}{2\sqrt{t}} \text{ cm}^2/\text{s}$



الدرس الثالث: قاعدة السلسلة

1	$f'(x) = -10e^{-0.1x}$
2	$f'(x) = 2x \cos(x^2 + 1)$
3	$f'(x) = -2 \cos x \sin x = -\sin 2x$
4	$f'(x) = -2 \sin 2x + 2 \sin x$
5	$f(x) = \log_3 \frac{x\sqrt{x-1}}{2} = \log_3 x + \frac{1}{2} \log_3(x-1) - \log_3 2$ $f'(x) = \frac{1}{x \ln 3} + \frac{1}{2(x-1) \ln 3}$
6	$f(x) = 2(\cot(\pi x + 2))^2$
7	$f'(x) = -4\pi \cot(\pi x + 2) \csc^2(\pi x + 2)$
8	$f'(x) = \frac{3x^2}{x^3 + 2}$
9	$f'(x) = 2 \times \frac{x^2}{x^3 + 2} \times \frac{2x(x^3 + 2) - 3x^4}{(x^3 + 2)^2}$ $= \frac{2x^2}{x^3 + 2} \times \frac{4x - x^4}{(x^3 + 2)^2} = \frac{8x^3 - 2x^6}{(x^3 + 2)^3}$
10	$f'(x) = x^2 \times \frac{-1}{2\sqrt{20-x}} + 2x\sqrt{20-x}$ $= \frac{-x^2}{2\sqrt{20-x}} + 2x\sqrt{20-x} = \frac{80x - 5x^2}{2\sqrt{20-x}}$
11	$f'(x) = \frac{2e^{x^2} \cos(2x+1) - 2xe^{x^2} \sin(2x+1)}{e^{2x^2}}$ $= \frac{2 \cos(2x+1) - 2x \sin(2x+1)}{e^{x^2}}$
12	$f'(x) = -(3^{\cot x} \ln 3) \csc^2 x$



13	$\frac{dy}{dx} = 10 \cos 5x + 12 \sin 3x$ $\left. \frac{dy}{dx} \right _{x=\frac{\pi}{2}} = -12$	ميل المماس:
14	$f'(x) = 6x(x^2 + 2)^2$ $f'(-1) = -54$ $x = -1 \rightarrow y = f(-1) = 27$ $y - 27 = -54(x + 1) \rightarrow y = -54x - 27$	معادلة المماس:
15	$f'(x) = 3 \sec^2 3x$ $f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 6$ $x = \frac{\pi}{4} \rightarrow y = f\left(\frac{\pi}{4}\right) = -1$ $y + 1 = 6\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \rightarrow y = 6x - \frac{3\pi}{2} - 1$	ميل المماس: معادلة المماس:
16	$f'(x) = 3 \cos x - 3 \sin^2 x \cos x$ $= 3 \cos x (1 - \sin^2 x)$ $= 3 \cos x (\cos^2 x)$ $= 3 \cos^3 x$	
17	$f''(x) = -9 \cos^2 x \sin x$	



<p>18</p> $\frac{dy}{dt} = b \cos t$ $\frac{dx}{dt} = -a \sin t$ $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{b \cos t}{-a \sin t} = -\frac{b}{a} \cot t$ $\left. \frac{dy}{dx} \right _{x=\frac{\pi}{4}} = -\frac{b}{a} \cot \frac{\pi}{4} = -\frac{b}{a}$ $t = \frac{\pi}{4} \rightarrow x = a \cos \frac{\pi}{4} = \frac{a}{\sqrt{2}}, \quad y = b \sin \frac{\pi}{4} = \frac{b}{\sqrt{2}}$ $y - \frac{b}{\sqrt{2}} = -\frac{b}{a} \left(x - \frac{a}{\sqrt{2}} \right) \rightarrow y = -\frac{b}{a} x + \sqrt{2}b$ $x = 0 \rightarrow y = \sqrt{2}b$	<p>ميل المماس:</p> <p>معادلة المماس:</p>
<p>19</p> $y = e^{ax}$ $\frac{dy}{dx} = ae^{ax} = 1 \rightarrow e^{ax} = \frac{1}{a}$ $\rightarrow ax = \ln \frac{1}{a} = -\ln a$ $\rightarrow x = \frac{-\ln a}{a}$ $\rightarrow y = e^{a(\frac{-\ln a}{a})} = e^{-\ln a} = (e^{\ln a})^{-1} = \frac{1}{a}$ $P \left(\frac{-\ln a}{a}, \frac{1}{a} \right)$	<p>إذن، النقطة المطلوبة هي:</p>
<p>20</p> $y - \frac{1}{a} = -1 \left(x + \frac{\ln a}{a} \right) \rightarrow y = -x - \frac{\ln a}{a} + \frac{1}{a}$ $\rightarrow y + x = -\frac{\ln a}{a} + \frac{1}{a} \rightarrow k = \frac{1 - \ln a}{a}$	<p>ميل العمودي على المماس عند النقطة P يساوي -1</p> <p>معادلة العمودي على المماس هي:</p>
<p>21</p> $h(x) = \sqrt{4 + 3f(x)} = (4 + 3f(x))^{\frac{1}{2}}$ $h'(x) = \frac{1}{2}(3f'(x))(4 + 3f(x))^{-\frac{1}{2}} = \frac{3f'(x)}{2\sqrt{4 + 3f(x)}}$ $h'(1) = \frac{3f'(1)}{2\sqrt{4 + 3f(1)}} = \frac{12}{2\sqrt{25}} = \frac{6}{5}$	
<p>22</p> $f'(x) = 2e^{2x} - 2e^{-2x}$ $f''(x) = 4e^{2x} + 4e^{-2x} = 4(e^{2x} + e^{-2x}) = 4f(x)$	



23	$f'(x) = 4 \cos 4x - 4 \sin 4x$ $f''(x) = -16 \sin 4x - 16 \cos 4x$ $= -16(\sin 4x + \cos 4x) = -16f(x)$ $f''(x) + 16f(x) = 0$
24	$\frac{dy}{d\theta} = -2 \sin \theta$ $\frac{dx}{d\theta} = 2 \sin \theta \cos \theta$ $\frac{dy}{dx} = \frac{-2 \sin \theta}{2 \sin \theta \cos \theta} = -\sec \theta$
25	$\frac{dy}{dx} = \sqrt{2} \rightarrow -\sec \theta = \sqrt{2} \rightarrow \sec \theta = -\sqrt{2} \rightarrow \cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ <p>عندما $\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, فإن:</p> $x = \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, y = 2 \cos \theta = 2 \times -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$ $y + \sqrt{2} = \sqrt{2} \left(x - \frac{1}{2} \right) \rightarrow y = \sqrt{2}x - \frac{3}{\sqrt{2}}$ <p>معادلة المماس:</p>
26	$\frac{dy}{dx} = -\sec \theta = -\frac{1}{\cos \theta}$ <p>يكون المماس موازياً لمحور y عندما يكون $\frac{dy}{dx}$ غير معروف، أي عندما $\cos \theta = 0$</p> <p>و عندها يكون:</p> $x = \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - 0 = 1, y = 2 \cos \theta = 2 \times 0 = 0$ <p>فانقطة المطلوبة هي: $(1, 0)$</p>
27	$a(t) = -1.5t^2 e^{-0.05t^2} + 15e^{-0.05t^2} = 15e^{-0.05t^2}(1 - 0.1t^2)$ $a(t) = 0 \rightarrow 1 - 0.1t^2 = 0 \rightarrow t^2 = 10 \rightarrow t = \sqrt{10}$ $v(\sqrt{10}) = 15\sqrt{10}e^{-0.5} = \frac{15\sqrt{10}}{\sqrt{e}} \text{ m/s}$
28	$f(u) = u^5 + 1 \rightarrow f'(u) = 5u^4$ $u = g(x) = \sqrt{x} \rightarrow g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ $(fog)'(1) = f'(g(1)) \times g'(1) = f'(1) \times \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$
29	$f(u) = u + \frac{1}{\cos^2 u} \rightarrow f'(u) = 1 + \frac{2 \cos u \sin u}{\cos^4 u} = 1 + 2 \sec^2 u \tan u$ $u = g(x) = \pi x \rightarrow g'(x) = \pi$ $(fog)'(\frac{1}{4}) = f'\left(g\left(\frac{1}{4}\right)\right) \times g'\left(\frac{1}{4}\right) = f'\left(\frac{\pi}{4}\right) \times \pi = 5\pi$



30 $\frac{dy}{dt} = -4 \sin 2t, \quad \frac{dx}{dt} = 10 \cos t$ $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-4 \sin 2t}{10 \cos t} = -\frac{4}{5} \sin t, \quad -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$	<p>يكون المماس عند أعلى نقطة في المحنى المعطى أفقياً، إذن ميله يساوي صفرًا</p> $\frac{dy}{dx} = 0 \rightarrow \sin t = 0 \rightarrow t = 0$ <p>أو أن قيمة x عند أعلى نقطة تساوي صفرًا، إذن:</p> $10 \sin t = 0 \rightarrow t = 0$ <p>أو أن قيمة y عند أعلى نقطة تساوي 4، إذن:</p> $2 + 2 \cos 2t = 4 \rightarrow 2 \cos 2t = 2 \rightarrow \cos 2t = 1 \rightarrow t = 0$
31 $\frac{dy}{dt} = -3 \sin t, \quad \frac{dx}{dt} = 4 \cos 2t$ $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-3 \sin t}{4 \cos 2t}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$ <p>$(x, y) = (0, 0) \rightarrow (2 \sin 2t, 3 \cos t) = (0, 0) \rightarrow \sin 2t = 0$ و $\cos t = 0$</p> <p>$\sin 2t = 0 \rightarrow t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$</p> <p>$\cos t = 0 \rightarrow t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$</p>	<p>يتتحقق الشرطان معًا عندما عندما $t = \frac{3\pi}{2}$ أو $t = \frac{\pi}{2}$</p>
32 $\left. \frac{dy}{dx} \right _{t=\frac{\pi}{2}} = \frac{-3}{-4} = \frac{3}{4}$ $\left. \frac{dy}{dx} \right _{t=\frac{3\pi}{2}} = \frac{3}{-4} = -\frac{3}{4}$	<p>إذن أحد فرعي المعادلة ميله عند نقطة الأصل $\frac{3}{4}$ والآخر ميله $-\frac{3}{4}$</p>



الدرس الرابع: الاشتتقاق الضمني

1	$3x^3y^2 \frac{dy}{dx} + 3x^2y^3 = 0 \rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$
2	$x \frac{dy}{dx} + y = \left(1 + \frac{dy}{dx}\right) \cos(x+y)$ $\rightarrow x \frac{dy}{dx} - \cos(x+y) \frac{dy}{dx} = -y + \cos(x+y) \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-y + \cos(x+y)}{x - \cos(x+y)}$
3	$4y^3 \frac{dy}{dx} - 2y \frac{dy}{dx} = 10 \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{10}{4y^3 - 2y} = \frac{5}{2y^3 - y}$
4	$x \cos y \frac{dy}{dx} + \sin y + y \sin x - \cos x \frac{dy}{dx} = 0 \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\sin y + y \sin x}{\cos x - x \cos y}$
5	$-\csc^2 y \frac{dy}{dx} = 1 - \frac{dy}{dx} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1 - \csc^2 y} = \frac{-1}{\cot^2 y} = -\tan^2 y$
6	$\frac{x \frac{dy}{dx} + y}{2\sqrt{xy}} + 1 + 2y \frac{dy}{dx} = 0 \rightarrow x \frac{dy}{dx} + y + 2\sqrt{xy} + 4y\sqrt{xy} \frac{dy}{dx} = 0$ $\rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{y + 2\sqrt{xy}}{x + 4y\sqrt{xy}}$
7	$2x + 3x \frac{dy}{dx} + 3y + 2y \frac{dy}{dx} = 1 + 3 \frac{dy}{dx}$ $\rightarrow 4 + 6 \frac{dy}{dx} - 3 - 2 \frac{dy}{dx} = 1 + 3 \frac{dy}{dx} \rightarrow \frac{dy}{dx} = 0$ $y + 1 = 0(x - 2) \rightarrow y = -1$ معادلة المماس: $(x, y) = (2, -1)$
8	$xe^y \frac{dy}{dx} + e^y + \frac{y}{x} + \ln x \frac{dy}{dx} = 0$ $e^{\ln 2} \frac{dy}{dx} + e^{\ln 2} + \ln 2 + 0 = 0$ $2 \frac{dy}{dx} + 2 + \ln 2 = 0 \rightarrow \frac{dy}{dx} = -1 - \frac{1}{2} \ln 2$ $y - \ln 2 = \left(-1 - \frac{1}{2} \ln 2\right)(x - 1)$ $y = \left(-1 - \frac{1}{2} \ln 2\right)x + 1 + \frac{3}{2} \ln 2$ معادلة المماس: $(x, y) = (1, \ln 2)$



	$4x \frac{dy}{dx} + 4y = 0$	
9	$4 \frac{dy}{dx} + 9 = 0 \rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{9}{4}$ $y - \frac{9}{4} = -\frac{9}{4}(x - 1) \rightarrow y = -\frac{9}{4}x + \frac{9}{2}$	نوعٌ $(x, y) = (1, \frac{9}{4})$ معادلة المماس:
10	$x + \frac{1}{4}y \frac{dy}{dx} = 0$	نوعٌ $(x, y) = (1, 2)$ معادلة المماس:
11	$x^2 \frac{dy}{dx} + 2xy - 4 = 0 \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{4 - 2xy}{x^2} = 4x^{-2} - 2yx^{-1}$ $\frac{d^2y}{dx^2} = -8x^{-3} + 2yx^{-2} - 2x^{-1} \frac{dy}{dx}$ $= -8x^{-3} + 2yx^{-2} - 2x^{-1}(4x^{-2} - 2yx^{-1})$ $= -16x^{-3} + 6yx^{-2} = -\frac{16}{x^3} + \frac{6y}{x^2}$	
12	$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0 \rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} = -xy^{-1}$ $\frac{d^2y}{dx^2} = xy^{-2} \frac{dy}{dx} - y^{-1}$ $= xy^{-2}(-xy^{-1}) - y^{-1}$ $= -x^2y^{-3} - y^{-1}$ $= -\frac{x^2}{y^3} - \frac{1}{y} = -\frac{x^2 + y^2}{y^3} = -\frac{8}{y^3}$	



	$2y \frac{dy}{dx} = 3x^2$
13	$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2}{2y}$ $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{12xy - 6x^2 \frac{dy}{dx}}{4y^2} = \frac{12xy - 6x^2 \times \frac{3x^2}{2y}}{4y^2} = \frac{12xy^2 - 9x^4}{4y^3}$
14	$y = (x)^{x^2} \rightarrow \ln y = \ln(x)^{x^2}$ $\rightarrow \ln y = x^2 \ln x$ $\rightarrow \frac{dy}{dx} = x^2 \times \frac{1}{x} + 2x \ln x$ $\rightarrow \frac{dy}{dx} = xy + 2xy \ln x$ $x = 2 \rightarrow y = (2)^{2^2} = 16 \rightarrow (2, 16)$ $\left. \frac{dy}{dx} \right _{x=2} = 2 \times 16 + 2 \times 2 \times 16 \ln 2 = 32 + 64 \ln 2$ ميل المماس: $y - 16 = (32 + 64 \ln 2)(x - 2)$ معادلة المماس:
15	$3(x+y)^2 \left(1 + \frac{dy}{dx} \right) = 2x + \frac{dy}{dx}$ $3 \left(1 + \frac{dy}{dx} \right) = 2 + \frac{dy}{dx} \rightarrow 3 + 3 \frac{dy}{dx} = 2 + \frac{dy}{dx}$ $\rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2}$ ميل المماس: بما أن ميل المماس هو $-\frac{1}{2}$ ، فإن ميل العمودي على المماس هو 2 $y - 0 = 2(x - 1) \rightarrow y = 2x$ معادلة العمودي على المماس:



16 $y = x(\ln x)^x \rightarrow \ln y = \ln(x(\ln x)^x)$
 $\rightarrow \ln y = \ln x + x \ln(\ln x)$
 $\rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} + x \times \frac{1}{\ln x} + \ln(\ln x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{\ln x} + \ln(\ln x)$
 $\rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \frac{y}{\ln x} + y \ln(\ln x)$
 $x = e \rightarrow y = e(\ln e)^e = e^e \rightarrow (e, e)$
 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=e} = \frac{e}{e} + \frac{e}{1} = 1 + e$

ميل المماس:

$y - e = (1 + e)(x - e) \rightarrow y = (1 + e)x - e^2$ معادلة المماس:

17 $y = (x - 2)^{x+1} \rightarrow \ln y = (x + 1) \ln(x - 2)$
 $\rightarrow \frac{dy}{dx} = (x + 1) \times \frac{1}{x - 2} + \ln(x - 2)$
 $\rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y(x + 1)}{x - 2} + y \ln(x - 2)$
 $= \frac{(x - 2)^{x+1}(x + 1)}{x - 2} + (x - 2)^{x+1} \ln(x - 2)$
 $= (x - 2)^x(x + 1) + (x - 2)^{x+1} \ln(x - 2)$

18 $y = \frac{x^{10}\sqrt{x^2 + 5}}{\sqrt[3]{8x^2 + 2}} \rightarrow \ln y = 10 \ln x + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 5) - \frac{1}{3} \ln(8x^2 + 2)$
 $\rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{10}{x} + \frac{x}{x^2 + 5} - \frac{16x}{3(8x^2 + 2)}$
 $\rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x^{10}\sqrt{x^2 + 5}}{\sqrt[3]{8x^2 + 2}} \left(\frac{10}{x} + \frac{x}{x^2 + 5} - \frac{16x}{3(8x^2 + 2)} \right)$



<p>19</p> $y = (\cos x)^x \rightarrow \ln y = x \ln(\cos x)$ $\rightarrow \frac{dy}{dx} = x \times \frac{-\sin x}{\cos x} + \ln(\cos x)$ $\rightarrow \frac{dy}{dx} = (\cos x)^x (-x \tan x + \ln(\cos x))$	<p>نفرض أن المماس المار بالنقطة $(0, 4)$ يلاقي المنحنى عند النقطة (x, y) الواقعة عليه.</p> $\frac{1}{2}x + \frac{2}{9}y \frac{dy}{dx} = 0$ $\rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{1}{2}x}{\frac{2}{9}y} = -\frac{9x}{4y}$ $\rightarrow 4y^2 = -9x^2 + 36x$ $4y^2 = 36 - 9x^2$ $\rightarrow -9x^2 + 36x = 36 - 9x^2 \rightarrow x = 1$ $\rightarrow y = \pm \frac{\sqrt{36 - 9x^2}}{2} = \pm \frac{\sqrt{36 - 9}}{2} = \pm \frac{3\sqrt{3}}{2}$ $\rightarrow P_1 = \left(1, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right), P_2 = \left(1, -\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$ $\frac{dy}{dx} \Big _{P_1} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{dy}{dx} \Big _{P_2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ $y - 0 = -\frac{\sqrt{3}}{2}(x - 4) \rightarrow y = -\frac{\sqrt{3}}{2}x + 2\sqrt{3}$ $y - 0 = \frac{\sqrt{3}}{2}(x - 4) \rightarrow y = \frac{\sqrt{3}}{2}x - 2\sqrt{3}$
<p>20</p> $x^2 + xy + y^2 = 7$ $y = 0 \rightarrow x = \pm\sqrt{7} \rightarrow P_1 = (\sqrt{7}, 0), P_2 = (-\sqrt{7}, 0)$ $x^2 + xy + y^2 = 7 \rightarrow 2x + x \frac{dy}{dx} + y + 2y \frac{dy}{dx} = 0 \rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2x + y}{x + 2y}$ $\frac{dy}{dx} \Big _{P_1} = -\frac{2\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = -2, \frac{dy}{dx} \Big _{P_2} = -\frac{-2\sqrt{7}}{-\sqrt{7}} = -2$	<p>لبن ميل المماس يساوي $\frac{y-0}{x-4}$ إذن،</p> <p>وبضرب طرفي معادلة المنحنى في 36 نجد أن:</p> <p>النقطتان هما:</p> <p>ميل المماس:</p> <p>معادلة المماس الأول:</p> <p>معادلة المماس الثاني:</p> <p>ميلا المماسين متساويان، إذن هذان المماسان متوازيان.</p>
<p>21</p> $x^2 + xy + y^2 = 7$ $y = 0 \rightarrow x = \pm\sqrt{7} \rightarrow P_1 = (\sqrt{7}, 0), P_2 = (-\sqrt{7}, 0)$ $x^2 + xy + y^2 = 7 \rightarrow 2x + x \frac{dy}{dx} + y + 2y \frac{dy}{dx} = 0 \rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2x + y}{x + 2y}$ $\frac{dy}{dx} \Big _{P_1} = -\frac{2\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = -2, \frac{dy}{dx} \Big _{P_2} = -\frac{-2\sqrt{7}}{-\sqrt{7}} = -2$	<p>لبن ميل المماس يساوي $\frac{y-0}{x-4}$ إذن،</p> <p>وبضرب طرفي معادلة المنحنى في 36 نجد أن:</p> <p>النقطتان هما:</p> <p>ميل المماس:</p> <p>معادلة المماس الأول:</p> <p>معادلة المماس الثاني:</p> <p>ميلا المماسين متساويان، إذن هذان المماسان متوازيان.</p>



الوحدة الثانية: تطبيقات التفاضل

أستعد لدراسة الوحدة

حل المثلث باستعمال قانون جيوب التمام صفحة 14

$$24^2 = 12^2 + 15^2 - 2 \times 12 \times 15 \cos x$$

$$1 \quad \cos x = \frac{12^2 + 15^2 - 24^2}{2 \times 12 \times 15} = \frac{-207}{360} \rightarrow x \approx 2.18 \text{ rad} \approx 125.1^\circ$$

$$2 \quad x^2 = 32^2 + 45^2 - 2 \times 32 \times 45 \cos 37^\circ \rightarrow x \approx 27.37$$

$$3 \quad x^2 = 15^2 + 22^2 - 2 \times 15 \times 22 \cos 102^\circ \rightarrow x \approx 29.1$$

حل المعادلات المثلثية صفحة 14

$$4 \quad \tan 2x + 1 = 0 \rightarrow \tan 2x = -1 \rightarrow 2x = \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, \frac{11\pi}{4}, \frac{15\pi}{4}$$

$$\rightarrow x = \frac{3\pi}{8}, \frac{7\pi}{8}, \frac{11\pi}{8}, \frac{15\pi}{8}$$

$$5 \quad 2 \sin^2 x + \sin x = 0 \rightarrow \sin x (2 \sin x + 1) = 0$$

$$\rightarrow \sin x = 0 \text{ or } \sin x = -\frac{1}{2}$$

$$\rightarrow x = 0, \pi, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$$


$$6 \quad 1 - \cos x = \frac{1}{2} \rightarrow \cos x = \frac{1}{2} \rightarrow x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$$



تحديد فترات التزايد وفترات التناقص صفة 15

7 $f'(x) = 12x - 6$

$f'(x) = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2}$



الاقتران متناقص في $(-\infty, \frac{1}{2})$ ومتزايد في $(\frac{1}{2}, \infty)$

8 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x + 3$

$f'(x) = 3x^2 - 6x + 4$

$\Delta = 36 - 48 = -12 < 0$

ليس للمشتقة أصفار وإشارتها مماثلة لإشارة معامل x^2 لجميع الأعداد الحقيقية، أي أن:


فلاقتران متزايد على \mathbb{R} $f'(x) > 0$

9 $f(x) = x^2 - 8x^4$

$f'(x) = 2x - 32x^3$

$f'(x) = 0 \rightarrow 2x(1 - 16x^2) = 0$

$\rightarrow x = 0, x = \pm \frac{1}{4}$



الاقتران f متزايد على $(0, \frac{1}{4})$ $(-\infty, -\frac{1}{4})$

الاقتران f متناقص على $(-\frac{1}{4}, 0)$ $(\frac{1}{4}, \infty)$



الدرس الأول: المعدلات المرتبطة

$$\frac{dV}{dt} = 8 \quad \text{المعطى:}$$

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{r=12} \quad \text{المطلوب:}$$

1

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \rightarrow \frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}$$

$$\rightarrow \left. \frac{dV}{dt} \right|_{r=12} = 576\pi \left. \frac{dr}{dt} \right|_{r=12} = 8 \rightarrow \left. \frac{dr}{dt} \right|_{r=12} = \frac{8}{576\pi} = \frac{1}{72\pi} \text{ cm/s}$$

2

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{V=1435} \quad \text{المطلوب:}$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} = \left(\frac{3V}{4\pi} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{r=12} = \frac{1}{3} \left(\frac{3V}{4\pi} \right)^{-\frac{2}{3}} \times \frac{3}{4\pi} \left. \frac{dV}{dt} \right|_{r=12}$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{3(1435)}{4\pi} \right)^{-\frac{2}{3}} \times \frac{3}{4\pi} \times 8$$

$$= \frac{2}{\pi} \left(\frac{4305}{4\pi} \right)^{-\frac{2}{3}} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{4\pi}{4305} \right)^{\frac{2}{3}}$$

$$= \frac{2}{\pi} \times \sqrt[3]{\left(\frac{4\pi}{4305} \right)^2} \approx 0.01 \text{ cm/s}$$

حل آخر:

$$\sqrt[3]{\frac{3(1435)}{4\pi}} \approx 7 \text{ cm} \quad \text{عندما يكون الحجم } 1435 \text{ cm}^3 \text{ يكون طول نصف القطر } 7 \text{ cm}$$

نستعمل العلاقة بين المعدلين من السؤال 1 السابق

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}$$

$$\left. \frac{dV}{dt} \right|_{r=7} = 196\pi \left. \frac{dr}{dt} \right|_{r=7} = 8 \rightarrow \left. \frac{dr}{dt} \right|_{r=7} = \frac{8}{196\pi} \approx 0.01 \text{ cm/s}$$




3	$t = 33.5 \rightarrow V = 8 \times 33.5 = 268 \text{ cm}^3$ $\sqrt[3]{\frac{3(268)}{4\pi}} \approx 4 \text{ cm}$ يكون طول نصف القطر $\approx 4 \text{ cm}$ $\rightarrow \frac{dV}{dt} \Big _{r=4} = 64\pi \frac{dr}{dt} \Big _{r=4} = 8 \rightarrow \frac{dr}{dt} \Big _{r=4} = \frac{8}{64\pi} = \frac{1}{8\pi} \approx 0.04 \text{ cm/s}$
4	$V = IR$ $\frac{dV}{dt} = I \frac{dR}{dt} + R \frac{dI}{dt}$ $\frac{dV}{dt} = 1, \frac{dI}{dt} = -\frac{1}{3}$ المعطى: $I = 2, V = 12$ المطلوب: عندما $12 = 2R + 6(-\frac{1}{3})$, فإن $R = 6$, $I = 2$, $V = 12$, بالتعويض في المعادلة أعلاه ينتج أن: $1 = 2 \frac{dR}{dt} + 6(-\frac{1}{3}) \rightarrow \frac{dR}{dt} = 1.5 \Omega/s$
5	 معلوم أن مساحة المثلث تساوي نصف ناتج ضرب طولي أي ضلعين في جيب الزاوية المحصورة بينهما. $A = \frac{1}{2}abs \sin C$ إذا كان θ ثابت، حيث s ثابت: $A = \frac{1}{2}s^2 \sin \theta$
6	$A = \frac{1}{2}s^2 \sin \theta \rightarrow \frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}s^2 \cos \theta \frac{d\theta}{dt}$ $\rightarrow \frac{dA}{dt} \Big _{\theta=\frac{\pi}{6}} = \frac{1}{2}s^2 (\cos \frac{\pi}{6})(\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{3}}{8}s^2$
7	$y = \frac{10}{1+x^2} \rightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{-20x}{(1+x^2)^2} \frac{dx}{dt} \rightarrow \frac{dy}{dt} \Big _{x=20} = \frac{-1200}{(401)^2} \approx -0.007 \text{ cm/s}$ المعطى: $\frac{dx}{dt} = 3$ و المطلوب: $\frac{dy}{dt} \Big _{x=20}$



المعطى : $\frac{dL}{dt} = 300$ و المطلوب : $\frac{dx}{dt}\Big|_{L=10}$

8

$$L^2 = x^2 + 49 \rightarrow x = \sqrt{L^2 - 49}$$
$$\rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{L \frac{dL}{dt}}{\sqrt{L^2 - 49}}$$
$$\rightarrow \frac{dx}{dt}\Big|_{L=10} = \frac{10 \times 300}{\sqrt{100-49}} = \frac{3000}{\sqrt{51}} \approx 420 \text{ km/h}$$





الدرس الثاني: القيم القصوى والتقليل

1	<p>القيم الحرجة هي: $x = -2$, $x = 2$ لأن المشتقّة الأولى غير موجودة عند كل منها، و كذلك 0</p> <p>لأن المشتقّة الأولى تساوي صفرًا عندما للاقتران قيمة عظمى محلية هي: $f(0) = 2$ وله قيمة صغرى محلية ومطلقة هي: $f(-2) = f(2) = 0$</p>
2	$f'(x) = -2 \cos x \sin x = -\sin 2x$ $f'(x) = 0 \rightarrow \sin 2x = 0 \rightarrow x = \frac{\pi}{2}, x = \pi$ <p>يوجد قيمة حرجة وحيدة في الفترة $(\pi, \frac{\pi}{2})$ هي $\frac{\pi}{2}$</p> <p>نقارن قيمة الاقتران عند النقطة الحرجة مع قيمته عند طرفي المجال</p> $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 + \cos^2 \frac{\pi}{4} = \frac{3}{2}$ $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 + \cos^2 \frac{\pi}{2} = 1$ $f(\pi) = 1 + \cos^2 \pi = 2$ <p>القيمة العظمى المطلقة للاقتران f هي: 2</p> <p>القيمة الصغرى المطلقة للاقتران f هي: 1</p>
3	$f'(x) = 6x(x^2 - 4)^2$ $f'(x) = 0 \rightarrow 6x(x^2 - 4)^2 = 0 \rightarrow x = 0, x = \pm 2$ <p>يوجد قيمتان حرجة في الفترة $(-2, 3)$ هي $0, 2$</p> <p>نقارن قيم الاقتران عند النقط الحرجة مع قيمته عند طرفي المجال</p> $f(-2) = 0$ $f(0) = -64$ $f(2) = 0$ $f(3) = 125$ <p>القيمة العظمى المطلقة للاقتران f هي: 125</p> <p>القيمة الصغرى المطلقة للاقتران f هي: -64</p>



$$f'(x) = 1 - 2 \cos x$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow \cos x = \frac{1}{2} \rightarrow x = \frac{\pi}{3}, x = \frac{5\pi}{3}, x = -\frac{\pi}{3}, x = -\frac{5\pi}{3}$$

نقارن قيم الاقتران عند النقط الحرجية مع قيمته عند طرفي المجال

$$f(-2\pi) = -2\pi \approx -6.28$$

$$f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\pi}{3} + \sqrt{3} \approx 0.68$$

$$f\left(-\frac{5\pi}{3}\right) = -\frac{5\pi}{3} - \sqrt{3} \approx -6.97$$

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3} - \sqrt{3} \approx -0.68$$

$$f\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{5\pi}{3} + \sqrt{3} \approx 6.97$$

$$f(2\pi) = 2\pi \approx 6.28$$

القيمة العظمى المطلقة للاقتران f هي: $f\left(\frac{5\pi}{3}\right) \approx 6.97$

القيمة الصغرى المطلقة للاقتران f هي: $f\left(-\frac{5\pi}{3}\right) \approx -6.97$

$$f'(x) = \frac{x}{x+3} + \ln(x+3)$$

بدراسة إشارة كل من $\frac{x}{x+3}$ و $\ln(x+3) > 0$ نجد أن $\frac{x}{x+3}$ مما يعني أن 0

، لذا نبحث عن قيم يكون عندها $f'(x)$ غير موجودة في الفترة المعطاة

$\frac{x}{x+3}$ غير معروف عندما $x = -3$ ، $x = -3$ وهو خارج مجال

الاقتران، وبما أن $0 > f'(x)$ ، والاقتران متصل في مجاله، فإنه يأخذ القيم القصوى عند طرفي مجاله.

نقارن قيمتي الاقتران عند $x = 0$ ، $x = 3$

$$f(0) = 0$$

$$f(3) = 3 \ln 6$$

القيمة العظمى المطلقة للاقتران f هي: $f(3) = 3 \ln 6$

القيمة الصغرى المطلقة للاقتران f هي: $f(0) = 0$



$$f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = \pm 2$$

$f'(x)$ غير موجودة عندما $x = 0$ والاقتران غير معروف عنها فلا تعدد قيمة حرجه.

إذن القيمة الحرجية الوحيدة في الفترة $(-8, -1)$ هي: $x = -2$

نقارن قيمة الاقتران عند النقطة الحرجية مع قيمته عند طرفي المجال.

6

$$f(-8) = -8 - \frac{1}{2} = -8.5$$

$$f(-2) = -2 - 2 = -4$$

$$f(-1) = -1 - 4 = -5$$

القيمة العظمى المطلقة للأقتران f هي: -4

القيمة الصغرى المطلقة للأقتران f هي: -8.5

$$f'(x) = 5e^x - 2e^{2x}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow e^x(5 - 2e^x) = 0 \rightarrow e^x = \frac{5}{2} \rightarrow x = \ln \frac{5}{2}$$

إذن القيمة الحرجية الوحيدة في مجاله هي: $x = \ln \frac{5}{2}$

نقارن قيمة الاقتران عند النقطة الحرجية مع قيمته عند طرفي المجال.

7

$$f(-1) = 5e^{-1} - e^{-2} = \frac{5}{e} - \frac{1}{e^2} \approx 1.70$$

$$f\left(\ln \frac{5}{2}\right) = 5e^{\ln \frac{5}{2}} - e^{2 \ln \frac{5}{2}} = 5e^{\ln \frac{5}{2}} - e^{\ln \frac{25}{4}} = \frac{25}{2} - \frac{25}{4} = \frac{25}{4} = 6.25$$

$$f(2) = 5e^2 - e^4 \approx -17.65$$

القيمة العظمى المطلقة للأقتران f هي: $\frac{25}{4}$


القيمة الصغرى المطلقة للأقتران f هي: -17.65



$$f'(x) = \cos x - \sin x$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow \tan x = 1 \rightarrow x = \frac{\pi}{4}, x = \frac{5\pi}{4}$$

8



للاقتران قيمة عظمى محلية هي: $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$

وله قيمة صغرى محلية هي: $f\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}$

الاقتران f متزايد على $\left(\frac{5\pi}{4}, 2\pi\right)$ ، و


الاقتران f متناقص على $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$

$$f'(x) = \frac{x-5-x}{(x-5)^2} = \frac{-5}{(x-5)^2}$$

9

$f'(x) \neq 0$ وإشارتها سالبة لجميع الأعداد الحقيقية في مجال الاقتران لأن البسط سالب والمقام

موجب ، $f'(x)$ غير موجودة عندما $x = 5$ و f غير معرف عندها



الاقتران f متناقص على $(-\infty, 5)$ ولا يوجد له قيم قصوى.




$$f'(x) = \frac{2}{3}x(x^2 - 1)^{-\frac{2}{3}} = \frac{2x}{3\sqrt[3]{(x^2 - 1)^2}}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = 0$$

$x = \pm 1$ غير موجودة عندما $f'(x)$

إذن القيم الحرجة هي: $x = 0, x = \pm 1$



للاقتران قيمة صغرى محلية هي: $f(0) = -1$


الاقتران f متزايد على $(0, \infty)$ و متناقص على $(-\infty, 0)$

مجال f هو \mathbb{R} لأن العبارة $(x^2 - 3x + 4)$ مميزة سالب، وإشارتها موجبة لكل عدد حقيقي x

$$f'(x) = \frac{2x - 3}{x^2 - 3x + 4}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = \frac{3}{2}$$

إذن القيمة الحرجة هي: $x = \frac{3}{2}$



للاقتران قيمة صغرى محلية هي: $f\left(\frac{3}{2}\right) = \ln \frac{7}{4}$

الاقتران f متزايد على $\left(-\infty, \frac{3}{2}\right)$ و متناقص على $\left(\frac{3}{2}, \infty\right)$




$$f'(x) = -2xe^{-x^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = 0$$

إذن القيمة الحرجية هي: $x = 0$

12



للاقتران قيمة عظمى محلية هي: $f(0) = 1$


الاقتران f متزايد على $(-\infty, 0)$ ومتناقص على $(0, \infty)$

$$f'(x) = 2x(\ln 2)2^{x^2-3}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x = 0$$

إذن القيمة الحرجية هي: $x = 0$

13




للاقتران قيمة صغرى محلية هي: $f(0) = \frac{1}{8}$

الاقتران f متزايد على $(0, \infty)$ ومتناunsch على $(-\infty, 0)$

$$f'(x) = 12x^2 - 6x - 6$$

$$f''(x) = 24x - 6$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow x = \frac{1}{4}$$



الاقتران f مقعر للأعلى في $(\infty, \frac{1}{4})$ ومقعر للأسفل في $(-\infty, \frac{1}{4})$

وله نقطة انعطاف هي: $\left(\frac{1}{4}, \frac{83}{8}\right)$

14




$$f'(x) = 6x^5 - 12x^3$$

$$f''(x) = 30x^4 - 36x^2$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow 6x^2(5x^2 - 6) = 0 \rightarrow x = 0, x = \pm \sqrt{\frac{6}{5}}$$

15



الاقتران f مقعر للأعلى في $\left(-\sqrt{\frac{6}{5}}, \sqrt{\frac{6}{5}}\right)$ ومقعر للأسفل في $\left(-\infty, -\sqrt{\frac{6}{5}}\right)$ و $\left(\sqrt{\frac{6}{5}}, \infty\right)$


وله نقطتا انعطاف هما: $\left(\sqrt{\frac{6}{5}}, -\frac{324}{125}\right), \left(-\sqrt{\frac{6}{5}}, -\frac{324}{125}\right)$

$$f'(x) = (4 - 4x)(2 + 2x - x^2)$$

$$f''(x) = -4(2 + 2x - x^2) + (4 - 4x)(2 - 2x) = 12x^2 - 24x$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow 12x(x - 2) = 0 \rightarrow x = 0, x = 2$$

16



الاقتران f مقعر للأعلى في $(0, 2)$ و $(2, \infty)$ ومقعر للأسفل في $(-\infty, 0)$

وله نقطتا انعطاف هما: $(2, 4), (0, 4)$




$$f'(x) = \frac{-x^2}{\sqrt{4-x^2}} + \sqrt{4-x^2} = \frac{4-2x^2}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$f''(x) = \frac{-4x\sqrt{4-x^2} - (4-2x^2) \times \frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}}{4-x^2} = \frac{-12x+2x^3}{(4-x^2)\sqrt{4-x^2}}$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow 2x(x^2 - 6) = 0 \rightarrow x = 0, x = \pm\sqrt{6}$$

17

مجال هذا الاقتران هو $[2, -2]$ ، فالعدادان $\pm\sqrt{6}$ خارج مجاله.



الاقتران f مقعر للأعلى في $(-2, 0)$ ومقعر للأسفل في $(0, 2)$


وله نقطة انعطاف هي: $(0, 0)$

$$f'(x) = 2x + \frac{2}{x^3}$$

$$f''(x) = 2 - \frac{6}{x^4}$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow x^4 = 3 \rightarrow x = \pm\sqrt[4]{3}$$

18



الاقتران f مقعر للأعلى في $(0, \sqrt[4]{3})$ و $(-\sqrt[4]{3}, 0)$ ومقعر للأسفل في $(-\infty, -\sqrt[4]{3})$ و $(-\sqrt[4]{3}, 0)$

وله نقطتا انعطاف هما: $(-\sqrt[4]{3}, \frac{2}{\sqrt[4]{3}})$ و $(\sqrt[4]{3}, \frac{2}{\sqrt[4]{3}})$




19

$$f'(x) = 2 - \sec^2 x$$

$$f''(x) = -2 \sec^2 x \tan x = -\frac{2 \sin x}{\cos^2 x}$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow \sin x = 0 \rightarrow x = 0$$


غير موجودة عندما $\cos x = 0$ ، لكن 0 في الفترة المحددة بالسؤال $f''(x)$



الاقتران f مقعر للأعلى في $(0, \frac{\pi}{2})$ ومقعر للأسفل في $(-\frac{\pi}{2}, 0)$

وله نقطة انعطاف هي $(0, 0)$

20



للاقتران قيمة صغرى محلية عند: $x = -4$

للاقتران قيمة عظمى محلية عند: $x = 2$

21

الاقتران f متزايد على $(2, \infty)$ ومتناقص على $(-\infty, -4)$ ومتناصف على $(-4, 2)$



$$f'(x) = 2 \cos x - 2 \sin 2x = 2 \cos x - 4 \sin x \cos x$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 2 \cos x (1 - 2 \sin x) = 0$$

$$\rightarrow \cos x = 0 \text{ or } \sin x = \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow x = \frac{\pi}{2}, x = \frac{3\pi}{2}, x = \frac{\pi}{6}, x = \frac{5\pi}{6}$$

$$x = \frac{\pi}{2}, x = \frac{3\pi}{2}, x = \frac{\pi}{6}, x = \frac{5\pi}{6} \quad \text{إذن القيمة الحرجة هي:}$$

$$f''(x) = -2 \sin x - 4 \cos 2x$$

$$22 \quad f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -2 + 4 = 2 > 0$$

$$f''\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 2 + 4 > 0$$

$$f''\left(\frac{\pi}{6}\right) = -1 - 2 < 0$$

$$f''\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -1 - 2 < 0$$

للاقتران قيمة صغرى محلية هي: $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -3$

للاقتران قيمة عظمى محلية هي: $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{3}{2}$

$$f(x) = x^3 + \frac{48}{x}, x \neq 0$$

$$f'(x) = 3x^2 - \frac{48}{x^2} = \frac{3x^4 - 48}{x^2}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x^4 = 16 \rightarrow x = \pm 2$$

إذن القيم الحرجة هي: $x = \pm 2$

23

$$f''(x) = 6x + \frac{96}{x^3}$$

$$f''(-2) = -12 - 12 < 0$$

$$f''(2) = 12 + 12 > 0$$

للاقتران قيمة صغرى محلية هي: $f(2) = 32$

للاقتران قيمة عظمى محلية هي: $f(-2) = -32$



24	$f'(x) = (x^2 - 3)e^x + 2xe^x = e^x(x^2 + 2x - 3)$ $f'(x) = 0 \rightarrow (x-1)(x+3) = 0 \rightarrow x = 1, x = -3$ $x = 1, x = -3$ إذن القيم الحرجة هي:
25	$f''(x) = e^x(2x+2) + e^x(x^2 + 2x - 3) = e^x(x^2 + 4x - 1)$ $f''(-3) = \frac{-4}{e^3} < 0$ $f''(1) = 4e > 0$
26	$f(1) = -2e$ للاقتران قيمة صغرى محلية هي: $f(-3) = \frac{6}{e^3}$ للاقتران قيمة عظمى محلية هي:
27	$f'(x) = 2ax + b$ عند النقطة $(3, 12)$ توجد قيمة عظمى محلية، إذن هي نقطة حرجة، ومنه $0 = f'(3) = 6a + b$ (1) $f'(0) = 1 \rightarrow c = 1$ $f(3) = 9a + 3b + c = 12 \rightarrow 9a + 3b = 11$ (2) بطرح المعادلة (2) من ناتج ضرب المعادلة (1) في 3 نجد أن: $9a = -11 \rightarrow a = -\frac{11}{9}, b = \frac{22}{3}$
28	يكون الجسم في حالة سكون عندما $v(t) = 0$ ، أي يوجد مماس أفقي لمنحنى $s(t)$ نلاحظ من الشكل أنه يوجد مماس أفقي عندما $s' = 0$
29	يتحرك الجسم في الاتجاه الموجب عندما $s'(t) > 0$ أي $v(t) > 0$ وهذا يتحقق عندما يكون $s(t)$ متزايداً أي في الفترة $(1, 3)$ ، ويتحرك الجسم في الاتجاه السالب عندما يكون $s'(t) < 0$ أي $v(t) < 0$ متناقصاً أي في الفترة $(3, 5)$
30	تتزايد $v(t)$ عندما يكون $a(t) = s''(t) > 0$ ، وهذا يحصل عندما يكون منحنى s مقعر للأسفل ، لكن حسب الشكل فإن منحنى s مقعر للأسفل على مجاله، إذن سرعة الجسم المتوجه لا تتزايد أبداً، بل متناقص على $(1, 5)$



<p>29</p> $f'(x) = 12x^3 + 3ax^2 + 2bx + c$ $f(0) = -9 \rightarrow d = -9$ $f'(0) = 0 \rightarrow c = 0$ $f(-2) = -73 \rightarrow 48 - 8a + 4b - 9 = -73 \rightarrow -2a + b = -28 \dots (1)$ $f'(-2) = 0 \rightarrow -96 + 12a - 4b = 0 \rightarrow 3a - b = 24 \dots \dots \dots (2)$ <p style="text-align: right;">بجمع المعادلتين نجد أن:</p> $a = -4, b = -36$
<p>30</p> $f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 72x$ $f'(x) = 0 \rightarrow 12x(x^2 - x - 6) = 0$ $\rightarrow 12x(x - 3)(x + 2) = 0$ $\rightarrow x = 0, x = 3, x = -2$ <p style="text-align: center;">النقطة الثالثة على منحنى الاقتران التي لها مماس أفقي هي (3, -198)</p>
<p>31</p> $f''(x) = 36x^2 - 24x - 72$ $f''(-2) = 120 > 0$ $f''(0) = -72 < 0$ $f''(3) = 180 > 0$ <p style="text-align: center;">إذن النقطة (-2, -73) هي نقطة قيمة صغرى محلية والنقطة (0, -9) هي نقطة قيمة عظمى محلية والنقطة (3, -198) هي نقطة قيمة صغرى محلية</p>
<p>32</p> <p>يكون الجسم في حالة سكون عندما $t = 5$ s ، أي عندما $v(t) = 0$</p>
<p>33</p> <p>يتحرك الجسم في الاتجاه الموجب عندما $v(t) > 0$ أي في الفترة (5, 12) ، ويتحرك الجسم في الاتجاه السالب عندما يكون $v(t) < 0$ أي في الفترة (0, 5)</p>
<p>34</p> <p>كما هو واضح من الشكل فإن $v(t)$ تتزايد دوماً على الفترة (0, 12)</p>



ملاحظة هامة:

يرجى تعديل نص السؤال في كتاب التمارين بتغيير العبارة (ونقطة انعطاف عندما $x=1$)
إلى: (ونقطة انعطاف عند $((1,5)$

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx$$

$$f''(x) = 6ax + 2b$$

$$f'(2) = 0 \rightarrow 12a + 4b = 0 \rightarrow 3a + b = 0 \dots \dots \dots (2)$$

$$f''(1) = 0 \quad \rightarrow 6a + 2b = 0 \quad \rightarrow 3a + b = 0 \dots\dots(2)$$

بطرح المعادلة (3) من المعادلة (1) نجد أن:

بـطـرـح 3 أـمـثـالـ المـعـادـلـةـ (2) مـنـ المـعـادـلـةـ (4) نـجـدـ أـنـ:



$$-2a = 6 \rightarrow a = -3$$

وتعويض قيمة a في المعادلة (2) نجد أن: $b = 9$

$$c = -1 \quad \text{المعادلة (3) نجد أن:}$$



الدرس الثالث: تطبيقات القيم القصوى

1	$A = \frac{1}{2}ab \sin \theta$, $0 < \theta < \pi$ $\frac{dA}{d\theta} = \frac{1}{2}ab \cos \theta$ $\frac{dA}{d\theta} = 0 \rightarrow \cos \theta = 0 \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$	
2	<p>ليكن x طول ضلع القاعدة المربعة، h ارتفاع الخزان، A مساحة سطحه، V حجمه.</p> $V = x^2 h = 500 \rightarrow h = \frac{500}{x^2}$ $A = x^2 + 4xh = x^2 + 4x \times \frac{500}{x^2} = x^2 + \frac{2000}{x}$ $\frac{dA}{dx} = 2x - \frac{2000}{x^2}$ $\frac{dA}{dx} = 0 \rightarrow 2x^3 = 2000 \rightarrow x = 10$	
3	<p>إذن تكون مساحة سطح الخزان أقل ما يمكن عندما تكون الأبعاد كالتالي:</p> $x = 10 \text{ m}, h = 5 \text{ m}$	

حيث n عدد صحيح غير سالب



لتكن المسافة بين الجسيمين $f(t)$

$$f(t) = |S_2 - S_1| = \left| \sin\left(t + \frac{\pi}{3}\right) - \sin t \right| = \left| \cos\left(t + \frac{\pi}{6}\right) \right|, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$f(t) = \pm \cos\left(t + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$f'(t) = \mp \sin\left(t + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$f'(t) = 0 \rightarrow \sin\left(t + \frac{\pi}{6}\right) = 0$$

$$\rightarrow t + \frac{\pi}{6} = \pi \text{ or } 2\pi$$

$$\rightarrow t = \frac{5\pi}{6}, t = \frac{11\pi}{6}$$

4

$$\text{إذن القيم الحرجة هي: } t = \frac{5\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$$

نقارن قيمة الاقتران عند القيم الحرجة مع قيمتيه عند طرفي المجال.

$$f(0) = \left| \cos\left(0 + \frac{\pi}{6}\right) \right| = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \left| \cos\left(\frac{5\pi}{6} + \frac{\pi}{6}\right) \right| = 1$$

$$f\left(\frac{11\pi}{6}\right) = \left| \cos\left(\frac{11\pi}{6} + \frac{\pi}{6}\right) \right| = 1$$

$$f(2\pi) = \left| \cos\left(2\pi + \frac{\pi}{6}\right) \right| = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

إذن أكبر مسافة بين الجسيمين هي 1 m




لتكن A مجموع مساحتي الدائرة والمربع، r طول نصف قطر الدائرة
ليكن طول الجزء الذي تصنع منه الدائرة x cm، فإن:

$$x = 2\pi r \rightarrow r = \frac{x}{2\pi}$$

$$A(x) = \pi \left(\frac{x}{2\pi} \right)^2 + \left(\frac{24-x}{4} \right)^2$$

$$\begin{aligned} A'(x) &= 2\pi \frac{x}{2\pi} \times \frac{1}{2\pi} + 2 \left(6 - \frac{1}{4}x \right) \times -\frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{2\pi}x - 3 + \frac{1}{8}x \\ &= \left(\frac{1}{2\pi} + \frac{1}{8} \right)x - 3 \end{aligned}$$

$$A'(x) = 0 \rightarrow x = \frac{3}{\frac{1}{2\pi} + \frac{1}{8}} = \frac{24\pi}{4 + \pi}$$



إذن يكون مجموع مساحتي الدائرة والمربع أصغر ما يمكن عندما نقطع للدائرة من السلك طولاً مقداره

$$\frac{24\pi}{4 + \pi} \text{ cm}$$

للحصول على أكبر قيمة للاقتران A نقارن القيمتين A(0) و A(24)


$$A(0) = \pi \left(\frac{0}{2\pi} \right)^2 + \left(\frac{24-0}{4} \right)^2 = 36 \text{ cm}^2$$

$$A(24) = \pi \left(\frac{24}{2\pi} \right)^2 + \left(\frac{24-24}{4} \right)^2 = \frac{144}{\pi} \approx 45.8 \text{ cm}^2$$

إذن للحصول على أكبر مجموع للمساحتين نخصص السلك كله للدائرة، ولا نقطع للمربع شيئاً منه.



لتكن الأبعاد كما في الشكل أدناه:



بعد مرور t ساعة من انطلاق السياراتين يكون:

$$y = 80t, z = 50t \rightarrow x = 100 - 50t$$


$$r^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos \frac{\pi}{3} \rightarrow r^2 = x^2 + y^2 - xy$$

$$\rightarrow r^2 = (100 - 50t)^2 + (80t)^2 - (100 - 50t)(80t) \\ = 10000 - 18000t + 12900t^2$$

$$\rightarrow 2r \frac{dr}{dt} = -18000 + 25800t \rightarrow \frac{dr}{dt} = \frac{-18000 + 25800t}{2r}$$

$$\rightarrow \frac{dr}{dt} = 0 \rightarrow -18000 + 25800t = 0 \rightarrow t = \frac{90}{129} h$$

7



أقصر مسافة ممكنة بين السياراتين هي:

$$r = \sqrt{10000 - 18000 \left(\frac{90}{129} \right) + 12900 \left(\frac{90}{129} \right)^2} \approx 61 \text{ km}$$



الوحدة الثالثة: الأعداد المركبة

أستعد لدراسة الوحدة

حل معادلات كثيرات الحدود صفحة 20

1 $x^2 - 4x - 12 = 0 \rightarrow (x - 6)(x + 2) = 0 \rightarrow x = 6, x = -2$

2 $2x^3 - 6x^2 + 7x - 60 = 0$

بتجرب الأصفار النسبية المحتملة، نجد أن $x = 4$ حل لهذه المعادلة، إذن $(x - 4)$ عامل من عوامل كثير الحدود $60 - 6x^2 + 7x - 2x^3$ ، نقسم فنحصل على:

$$2x^3 - 6x^2 + 7x - 60 = (x - 4)(2x^2 + 2x + 15)$$

$$2x^3 - 6x^2 + 7x - 60 = 0 \rightarrow x = 4$$

ملاحظة: العبارة التربيعية $60 - 6x^2 + 7x - 2x^3$ مميزة سالب، أي ليس لها جذور حقيقية.

فالحل الوحيد لهذه المعادلة هو: $x = 4$

تمثيل المتجهات في المستوى الإحداثي والعمليات عليها صفحة 21

3 $\overrightarrow{AB} = \langle 2 - 4, 6 - 2 \rangle = \langle -2, 4 \rangle$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

4 $\overrightarrow{AB} = \langle 0 - (-2), 7 - 3 \rangle = \langle 2, 4 \rangle$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

معادلة الدائرة صفحة 21

5 $(x + 1)^2 + (y - 8)^2 = 25$

6 $r = \sqrt{(5 + 7)^2 + (4 - 13)^2} = \sqrt{144 + 81} = \sqrt{225} = 15$


$$(x + 7)^2 + (y - 13)^2 = 225$$

حل نظام متباينات خطية صفحة 22



$$4x + 3y \leq 12$$
$$y - 2x < 0$$

7



نرسم المستقيم $12 = 4x + 3y$ بخط متصل،
ونرسم المستقيم $0 < y - 2x$ بخط متقطع على المستوى الديكارتي نفسه
ونظلل المنطقة التي تحوي النقاط التي تحقق كلا المتباينتين.
لتتحقق من صحة الحل نعرض الزوج $(2, 0)$ في المتباينتين.

$$4(2) + 3(0) \leq 12 \rightarrow 8 \leq 12 \checkmark$$
$$0 - 2(2) < 0 \rightarrow -2 < 0 \checkmark$$

إذن الحل صحيح لأن الزوج $(2, 0)$ من منطقة الحل المظللة حقق
المتباينتين معاً.



الدرس الأول: الأعداد المركبة


1	$\sqrt{-128} = \sqrt{-1 \times 2 \times 64} = 8i\sqrt{2}$															
2	$\sqrt{-14} = \sqrt{-1 \times 14} = i\sqrt{14}$															
3	$\sqrt{-81} = \sqrt{-1 \times 81} = 9i$															
4	$\sqrt{-125} = \sqrt{-1 \times 5 \times 25} = 5i\sqrt{5}$															
5	$3\sqrt{-32} = 3\sqrt{-1 \times 2 \times 16} = 12i\sqrt{2}$															
6	$\sqrt{-\frac{28}{9}} = \sqrt{-1 \times \frac{7 \times 4}{9}} = \frac{2i\sqrt{7}}{3}$															
7	$i^7 = i^6 \times i = (i^2)^3 \times i = (-1)^3 \times i = -i$															
8	$i^{12} = (i^2)^6 = (-1)^6 = 1$															
9	$i^{98} = (i^2)^{49} = (-1)^{49} = -1$															
10	$i^{121} = i^{120} \times i = (i^2)^{60} \times i = (-1)^{60} \times i = i$															
11	<table border="1"><thead><tr><th>z</th><th>$Re(z)$</th><th>$Im(z)$</th></tr></thead><tbody><tr><td>$-4 + 6i$</td><td>-4</td><td>6</td></tr><tr><td>-3</td><td>-3</td><td>0</td></tr><tr><td>$8i$</td><td>0</td><td>8</td></tr><tr><td>$-8 + 3i$</td><td>-8</td><td>3</td></tr></tbody></table>	z	$Re(z)$	$Im(z)$	$-4 + 6i$	-4	6	-3	-3	0	$8i$	0	8	$-8 + 3i$	-8	3
z	$Re(z)$	$Im(z)$														
$-4 + 6i$	-4	6														
-3	-3	0														
$8i$	0	8														
$-8 + 3i$	-8	3														
12-23																



	$A = 4 + 5i \rightarrow A = \sqrt{16 + 25} = \sqrt{41}, \operatorname{Arg}(A) = \tan^{-1} \frac{5}{4} \approx 0.90$ $B = 3i \rightarrow B = \sqrt{9} = 3, \operatorname{Arg}(B) = \frac{\pi}{2}$ $C = 2 - 6i \rightarrow C = \sqrt{4 + 36} = 2\sqrt{10}, \operatorname{Arg}(C) = -\tan^{-1} 3 \approx -1.25$ $D = -2i \rightarrow D = \sqrt{4} = 2, \operatorname{Arg}(D) = -\frac{\pi}{2}$ 24 $E = -4 \rightarrow E = \sqrt{16} = 4, \operatorname{Arg}(E) = \pi$ $F = -5 - 4i \rightarrow F = \sqrt{25 + 16} = \sqrt{41}$ $\operatorname{Arg}(F) = -\left(\pi - \tan^{-1} \frac{4}{5}\right) \approx -2.47$ $G = -3 + 4i \rightarrow G = \sqrt{9 + 16} = 5$ $\operatorname{Arg}(G) = \pi - \tan^{-1} \frac{4}{3} \approx 2.21$
25	$2x + 1 = 7, 4 = -y + 3$ $\rightarrow x = 3, y = -1$
26	$x + 3y = 26, 2x - 4y = 32$ $\rightarrow x = 20, y = 2$
27	$ z = 6, \operatorname{Arg}(z) = \tan^{-1} \frac{0}{6} = 0$ $z = 6(\cos 0 + i \sin 0)$
28	$ z = 5, \operatorname{Arg}(z) = -\frac{\pi}{2}$ $z = 5 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right)$
29	$ z = \sqrt{12 + 4} = 4, \operatorname{Arg}(z) = -\left(\pi - \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{5\pi}{6}$ $z = 4 \left(\cos \left(-\frac{5\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{5\pi}{6} \right) \right)$




30	$ z = \sqrt{2}$, $\operatorname{Arg}(z) = \pi - \tan^{-1} 1 = \frac{3\pi}{4}$ $z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$
31	$ z = \sqrt{16+4} = 2\sqrt{5}$, $\operatorname{Arg}(z) = -\tan^{-1} \frac{1}{2} \approx -0.46$ $z = 2\sqrt{5}(\cos(-0.46) + i \sin(-0.46))$
32	$ z = 2\sqrt{17}$, $\operatorname{Arg}(z) = \tan^{-1} 4 \approx 1.33$ $z = 2\sqrt{17}(\cos 1.33 + i \sin 1.33)$
33	$6 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = 3\sqrt{3} + 3i$
34	$12(-1 + i(0)) = -12$
35	$8 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = -4 + 4i\sqrt{3}$
36	$3 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) = \frac{3}{\sqrt{2}} - \frac{3}{\sqrt{2}}i$
37	$\bar{z} = -1 + i\sqrt{5}$
38	$\bar{z} = 9 + i$
39	$\bar{z} = 2 + 8i$
40	$\bar{z} = 9i$
41	$\bar{z} = 12$
42	$\bar{z} = i - 8$





الدرس الثاني: العمليات على الأعداد المركبة

1	$9 + 3i$
2	$2 - 5i$
3	$12 + 28i$
4	$64 - 36i^2 = 100$
5	$-8 + 24\sqrt{3}i + 72 - 24\sqrt{3}i = 64$
6	$\frac{3 - i}{4 - 3i} \times \frac{4 + 3i}{4 + 3i} = \frac{15 + 5i}{25} = \frac{3}{5} + \frac{1}{5}i$
7	$z = 1 - 3i, w = 1 + i$
8	$wz = 4 - 2i \rightarrow wz = \sqrt{16 + 4} = 2\sqrt{5}$ $Arg(wz) = -\tan^{-1}\frac{1}{2} \approx -0.46$ $\frac{w}{z} = \frac{1+i}{1-3i} \times \frac{1+3i}{1+3i} = \frac{-2+4i}{10} = -\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i$ $\left \frac{w}{z}\right = \sqrt{\frac{1}{25} + \frac{4}{25}} = \frac{1}{\sqrt{5}}, Arg\left(\frac{w}{z}\right) = \pi - \tan^{-1}2 \approx 2.03$
9	$wz = 4 - 2i, \frac{w}{z} = -\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i$ 
10	$Arg(z) = \pi - \tan^{-1}\sqrt{3} = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$
11	$ z = \sqrt{(-3)^2 + (3\sqrt{3})^2} = \sqrt{9 + 27} = 6$



12	$\text{Arg}(zw) = \text{Arg}(z) + \text{Arg}(w) = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$
13	$ zw = z \times w = 6 \times 18 = 108$
14	$\sqrt{-15 + 8i} = x + iy \rightarrow -15 + 8i = (x + iy)^2$ $\rightarrow -15 + 8i = x^2 - y^2 + 2ixy$ $\rightarrow x^2 - y^2 = -15, 2xy = 8 \rightarrow y = \frac{4}{x}$ $\rightarrow x^2 - \frac{16}{x^2} = -15$ $\rightarrow x^4 + 15x^2 - 16 = 0$ $\rightarrow (x^2 + 16)(x^2 - 1) = 0 \rightarrow x = \pm 1, y = \pm 4$ $\sqrt{-15 + 8i} = \pm(1 + 4i)$
15	$\sqrt{-7 - 24i} = x + iy \rightarrow -7 - 24i = (x + iy)^2$ $\rightarrow -7 - 24i = x^2 - y^2 + 2ixy$ $\rightarrow x^2 - y^2 = -7, 2xy = -24 \rightarrow y = -\frac{12}{x}$ $\rightarrow x^2 - \frac{144}{x^2} = -7$ $\rightarrow x^4 + 7x^2 - 144 = 0$ $\rightarrow (x^2 + 16)(x^2 - 9) = 0 \rightarrow x = \pm 3, y = \mp 4$ $\sqrt{-7 - 24i} = \pm(3 - 4i)$
16	$\sqrt{105 + 88i} = x + iy \rightarrow 105 + 88i = (x + iy)^2$ $\rightarrow 105 + 88i = x^2 - y^2 + 2ixy$ $\rightarrow x^2 - y^2 = 105, 2xy = 88 \rightarrow y = \frac{44}{x}$ $\rightarrow x^2 - \frac{1936}{x^2} = 105$ $\rightarrow x^4 - 105x^2 - 1936 = 0$ $\rightarrow (x^2 + 16)(x^2 - 121) = 0 \rightarrow x = \pm 11, y = \pm 4$ $\sqrt{105 + 88i} = \pm(11 + 4i)$



	$\text{Arg}(\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} / \frac{1}{2}\right) = \tan^{-1}(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$, $ \omega = \sqrt{(\frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} = 1$
17	$\omega = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = 1\left(\cos\frac{\pi}{3} + i \sin\frac{\pi}{3}\right)$ $ \omega^3 = \omega \times \omega \times \omega = 1 \times 1 \times 1 = 1$ $\text{Arg}(\omega^3) = \text{Arg}(\omega) + \text{Arg}(\omega) + \text{Arg}(\omega) = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = \pi$ $\rightarrow \omega^3 = 1(\cos\pi + i \sin\pi) = 1$
18	$z_1 z_2 = 3 \times 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{5} + \frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{5} + \frac{\pi}{3}\right)\right) = 6\left(\cos\frac{8\pi}{15} + i \sin\frac{8\pi}{15}\right)$
19	$z_1 = 3\left(\cos\frac{\pi}{5} + i \sin\frac{\pi}{5}\right) \rightarrow \overline{z_1} = 3\left(\cos\frac{-\pi}{5} + i \sin\frac{-\pi}{5}\right)$ $z_1 \overline{z_1} = 3 \times 3\left(\cos\left(\frac{\pi}{5} - \frac{\pi}{5}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{5} - \frac{\pi}{5}\right)\right) = 9(\cos 0 + i \sin 0) = 9$
20	$z_2^3 = z_2^2 \times z_2 = 2^2\left(\cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3}\right)\right) \times z_2$ $= 4\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i \sin\frac{2\pi}{3}\right) \times 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i \sin\frac{\pi}{3}\right)$ $= 8\left(\cos\left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{3}\right)\right)$ $= 8(\cos\pi + i \sin\pi) = -8$
21	$\frac{z_2}{z_1} = \frac{2}{3}\left(\cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{5}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{5}\right)\right) = \frac{2}{3}\left(\cos\frac{2\pi}{15} + i \sin\frac{2\pi}{15}\right)$
22	$\left \frac{u - 9i}{3 + i}\right = 5 \rightarrow \frac{ u - 9i }{ 3 + i } = 5$ $\rightarrow \frac{\sqrt{u^2 + 81}}{\sqrt{9 + 1}} = 5$ $\rightarrow \sqrt{u^2 + 81} = 5\sqrt{10}$ $\rightarrow u^2 + 81 = 250$ $\rightarrow u^2 = 169 \rightarrow u = \pm 13$
	لأن u سالبة حسب المعطيات، إذن $u = -13$



حل آخر:

ويمكن كتابة الصورة القياسية للعدد $\frac{3u-9}{10} - \frac{u+27}{10} + i\frac{u-9i}{3+i}$ ثم إيجاد مقاييس هذا العدد

$$\left| \frac{u-9i}{3+i} \right| = \left| \frac{3u-9}{10} - \frac{u+27}{10} i \right|$$

$$\sqrt{\left(\frac{3u-9}{10} \right)^2 + \left(-\frac{u+27}{10} \right)^2} = 5$$

$$\left(\frac{3u-9}{10} \right)^2 + \left(-\frac{u+27}{10} \right)^2 = 25$$

$$(3u-9)^2 + (u+27)^2 = 2500$$

$$9u^2 - 54u + 81 + u^2 + 54u + 729 = 2500$$

$$10u^2 = 1690 \rightarrow u^2 = 169 \rightarrow u = \pm 13$$

وبما أن u سالبة فإن $u = -13$

بما أن $(1+4i)$ جذر للمعادلة $x^3 + 5x^2 + ax + b = 0$ ، فإنه يحقق المعادلة، أي أن:

$$(1+4i)^3 + 5(1+4i)^2 + a(1+4i) + b = 0$$

$$(1+8i+16i^2)(1+4i) + 5(1+8i+16i^2) + a(1+4i) + b = 0$$

$$(-15+8i)(1+4i) + 5(-15+8i) + a(1+4i) + b = 0$$

$$-15 - 52i - 32 - 75 + 40i + a + 4ia + b = 0$$

$$-122 + a + b + i(4a - 12) = 0$$

$$-122 + a + b = 0, 4a - 12 = 0 \rightarrow a = 3, b = 119$$

23

فالمعادلة هي: $x^3 + 5x^2 + 3x + 119 = 0$

بما أن $(1+4i)$ جذر للمعادلة، فإن $i-4$ جذر آخر لها. تكون معادلة تربيعية لها هذان الجذران:

$$(x - (1+4i))(x - (1-4i)) = (x - 1 - 4i)(x - 1 + 4i)$$

$$= x^2 - 2x + 17$$

ثم نقسم كثير الحدود $x^3 + 5x^2 + 3x + 119$ على $x^2 - 2x + 17$ فنحصل على:

$$x^3 + 5x^2 + 3x + 119 = (x^2 - 2x + 17)(x + 7)$$

الجذران الآخرين لهذه المعادلة هما: $x = -7, x = 1 - 4i$



نسبة
2-3i

$$\frac{362 - 153i}{2 - 3i} = \frac{362 - 153i}{2 - 3i} \times \frac{2 + 3i}{2 + 3i} = \frac{1183 - 780i}{13} = 91 - 60i$$

$$\sqrt{\frac{362 - 153i}{2 - 3i}} = \sqrt{91 - 60i} = x + iy$$

24

$$\rightarrow 91 - 60i = x^2 - y^2 + 2ixy$$

$$\rightarrow x^2 - y^2 = 91, 2xy = 60 \rightarrow y = -\frac{30}{x}$$

$$\rightarrow x^2 - \frac{900}{x^2} = 91$$

$$\rightarrow x^4 - 91x^2 - 900 = 0$$

$$\rightarrow (x^2 + 9)(x^2 - 100) = 0 \rightarrow x = \pm 10, y = \mp 3$$

$$\sqrt{\frac{362 - 153i}{2 - 3i}} = \pm(10 - 3i)$$

إذا كان $(4 + 3i)$ جذراً تربيعياً للعدد $(7 + 24i)$ فيجب أن تكون العبارة الآتية صحيحة:

$$(4 + 3i)^2 = 7 + 24i$$

25

نستطيع التأكيد من ذلك بالحساب:

$$(4 + 3i)^2 = 16 + 24i - 9 = 7 + 24i$$

إذن هو فعلاً أحد جذري $(7 + 24i)$ ، ويكون الجذر الآخر هو:

26

$$\theta_1 = \operatorname{Arg}(7 + 24i) = \tan^{-1} \frac{24}{7} \approx 1.287$$

$$\theta_2 = \operatorname{Arg}(4 + 3i) = \tan^{-1} \frac{3}{4} \approx 0.6435$$

$$2 \times \theta_2 = 2(0.6435) = 1.287 = \theta_1$$

$$\operatorname{Arg}(7 + 24i) = 2\operatorname{Arg}(4 + 3i) \quad \text{إذن،}$$

27

$$|7 + 24i| = \sqrt{49 + 576} = \sqrt{625} = 25$$

$$|4 + 3i| = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

$$\Rightarrow |7 + 24i| = |4 + 3i|^2$$



28	$\frac{a}{3+i} + \frac{b}{1+2i} = 1-i \Rightarrow \frac{a}{3+i} \times \frac{3-i}{3-i} + \frac{b}{1+2i} \times \frac{1-2i}{1-2i} = 1-i$ $\Rightarrow \frac{3a-ia}{10} + \frac{b-2ib}{5} = 1-i$ $\Rightarrow \frac{3}{10}a - i\frac{a}{10} + \frac{b}{5} - i\frac{2b}{5} = 1-i$ $\Rightarrow \frac{3}{10}a + \frac{b}{5} = 1 , \quad \frac{a}{10} + \frac{2b}{5} = 1$ $\Rightarrow 3a + 2b = 10 , a + 4b = 10$ $\Rightarrow b = 2 , a = 2$
29	$2z^3 - 8z^2 - 13z + 87 = 0$ <p>الأصفار النسبية المحتملة هي: $\pm 1, \pm 3, \pm 29, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{29}{2}, \pm 87, \pm \frac{87}{2}$</p> <p>بالتعميض، نجد أن العدد $-3 = z$ يحقق المعادلة لأن:</p> $2(-3)^3 - 8(-3)^2 - 13(-3) + 87 = 0$ <p>إذن $(z + 3)$ هو أحد العوامل، نجري عملية القسمة فنجد أن:</p> $2z^3 - 8z^2 - 13z + 87 = (z + 3)(2z^2 - 14z + 29) = 0$ $\rightarrow z = -3 , z = \frac{14 \pm \sqrt{-36}}{4} = \frac{3 \pm 6i}{4} = \frac{3}{4} \pm \frac{3}{2}i$ <p>إذن لهذه المعادلة 3 حلول هي: $-3, \frac{3}{4} + \frac{3}{2}i, \frac{3}{4} - \frac{3}{2}i$</p>
30	$z^3 + 4z^2 - 10z + 12 = 0$ <p>الأصفار النسبية المحتملة هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$</p> <p>بالتعميض، نجد أن العدد $-6 = z$ يحقق المعادلة لأن:</p> $(-6)^3 + 4(-6)^2 - 10(-6) + 12 = 0$ <p>إذن $(z + 6)$ هو أحد العوامل، نجري عملية القسمة فنجد أن:</p> $z^3 + 4z^2 - 10z + 12 = (z + 6)(z^2 - 2z + 2) = 0$ $\rightarrow z = -6 , z = \frac{2 \pm \sqrt{-4}}{2} = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$ <p>إذن لهذه المعادلة 3 حلول هي: $-6, 1 + i, 1 - i$</p>



بما أن $(-2 + i)$ جذر للمعادلة $z^4 + az^3 + bz^2 + 10z + 25 = 0$ ، فإن:

$$(-2 + i)^4 + a(-2 + i)^3 + b(-2 + i)^2 + 10(-2 + i) + 25 = 0$$

$$\rightarrow -7 - 24i + a(-2 + 11i) + b(3 - 4i) - 20 + 10i + 25 = 0$$

$$\rightarrow -7 - 2a + 3b - 20 + 25 + i(-24 + 11a - 4b + 10) = 0$$

$$\rightarrow -2 - 2a + 3b = 0 , -14 + 11a - 4b = 0$$

$$\rightarrow a = 2, b = 2$$

المعادلة هي: $z^4 + 2z^3 + 2z^2 + 10z + 25 = 0$

31 بما أن $(-2 + i)$ جذر لهذه المعادلة، فإن $(-2 - i)$ جذر آخر لها. تكون معادلة لها هذان الجذران:

$$(z - (-2 + i))(z - (-2 - i)) = (z + 2 - i)(z + 2 + i)$$

$$= z^2 + 4z + 5$$

ثم نقسم $z^4 + 2z^3 + 2z^2 + 10z + 25$ على $z^2 + 4z + 5$ فنحصل على:

$$z^4 + 2z^3 + 2z^2 + 10z + 25 = (z^2 + 4z + 5)(z^2 - 2z + 5)$$

$$z^2 - 2z + 5 = 0 \rightarrow z = \frac{2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$$


جذور هذه المعادلة هي: $i - 2, i + 2, -2 + i, -2 - i$



الدرس الثالث: محل الهندسي في المستوى المركب

$$|z + 5i| - 3 = 1 \rightarrow |z - (-5i)| = 4$$

المحل الهندسي الذي تمثله هذه المعادلة هو دائرة مركزها $(0, -5)$ وطول نصف قطرها 4 وحدات




المعادلة الديكارتية:

$$|z + 5i| - 3 = 1 \rightarrow |x + i(y + 5)| = 4 \rightarrow x^2 + (y + 5)^2 = 16$$

$$|z - 2 + 8i| = 13 \rightarrow |z - (2 - 8i)| = 13$$

المحل الهندسي الذي تمثله هذه المعادلة هو دائرة مركزها $(2, -8)$ وطول نصف قطرها 13 وحدة




المعادلة الديكارتية:

$$|z - 2 + 8i| = 13 \rightarrow |x - 2 + i(y + 8)| = 13$$

$$\rightarrow (x - 2)^2 + (y + 8)^2 = 169$$

$$|z + 4 - 3i| = 7 \rightarrow |z - (-4 + 3i)| = 7$$

المحل الهندسي الذي تمثله هذه المعادلة هو دائرة مركزها $(-4, 3)$ وطول نصف قطرها 7 وحدات



المعادلة الديكارتية:


$$|z + 4 - 3i| = 7 \rightarrow |x + 4 + i(y - 3)| = 7$$

$$\rightarrow (x + 4)^2 + (y - 3)^2 = 49$$



$$|z + 3 + 5i| = |z - i| \rightarrow |z - (-3 - 5i)| = |z - (i)|$$

هذه هي معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواقعه بين النقطتين $(-3, -5), (0, 1)$



4

$$|z + 3 + 5i| = |z - i| \rightarrow |(x + 3) + i(5 + y)| = |x + i(y - 1)|$$

$$\rightarrow \sqrt{(x + 3)^2 + (5 + y)^2} = \sqrt{x^2 + (y - 1)^2}$$

$$\rightarrow (x + 3)^2 + (5 + y)^2 = x^2 + (y - 1)^2$$

$$\rightarrow x^2 + 6x + 9 + y^2 + 10y + 25 = x^2 + y^2 - 2y + 1$$


$$\rightarrow 6x + 12y + 33 = 0$$

إذن معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة بالصيغة الديكارتية هي:

$$2x + 4y + 11 = 0$$

$$\frac{|z + 3i|}{|z - 6i|} = 1 \rightarrow |z + 3i| = |z - 6i| \rightarrow |z - (-3i)| = |z - (6i)|$$

هذه هي معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواقعه بين النقطتين $(0, -3), (0, 6)$



5

$$|z + 3i| = |z - 6i| \rightarrow |x + i(3 + y)| = |x + i(y - 6)|$$

$$\rightarrow \sqrt{x^2 + (3 + y)^2} = \sqrt{x^2 + (y - 6)^2}$$

$$\rightarrow x^2 + (3 + y)^2 = x^2 + (y - 6)^2$$

$$\rightarrow x^2 + 6y + 9 + y^2 = x^2 + y^2 - 12y + 36$$

$$\rightarrow 18y - 27 = 0$$

إذن معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة بالصيغة الديكارتية هي:

$$2y - 3 = 0 \rightarrow y = 1.5$$




$$|6 - 2i - z| = |z + 4i| \rightarrow |z - 6 + 2i| = |z + 4i|$$

$$\rightarrow |z - (6 - 2i)| = |z - (-4i)|$$

هذه هي معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواقعة بين النقطتين

$$(6, -2), (0, -4)$$

6



$$|z - 6 + 2i| = |z + 4i| \rightarrow |x - 6 + i(y + 2)| = |x + i(y + 4)|$$

$$\rightarrow \sqrt{(x - 6)^2 + (y + 2)^2} = \sqrt{x^2 + (y + 4)^2}$$

$$\rightarrow (x - 6)^2 + (y + 2)^2 = x^2 + (y + 4)^2$$

$$\rightarrow x^2 - 12x + 36 + y^2 + 4y + 4 = x^2 + y^2 + 8y + 16$$

$$\rightarrow 3x + y - 6 = 0$$

إذن معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة بالصيغة الديكارتية هي:


$$3x + y - 6 = 0$$

$$\text{Arg}(z + 3) = \frac{\pi}{4} \rightarrow \text{Arg}(z - (-3)) = \frac{\pi}{4}$$

المحل الهندسي لهذه المعادلة هو شعاع ينطلق من النقطة $(-3, 0)$ ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{4}$

مع المحور الحقيقي الموجب

7






8

$$\operatorname{Arg}(z + 3 - 2i) = \frac{2\pi}{3} \rightarrow \operatorname{Arg}(z - (-3 + 2i)) = \frac{2\pi}{3}$$


المحل الهندسي لهذه المعادلة هو شعاع ينطلق من النقطة $(-3, 2)$ ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{2\pi}{3}$ مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي الموجب



9


$$\operatorname{Arg}(z + 2 + 2i) = -\frac{\pi}{4} \rightarrow \operatorname{Arg}(z - (-2 - 2i)) = -\frac{\pi}{4}$$

المحل الهندسي لهذه المعادلة هو شعاع ينطلق من النقطة $(-2, -2)$ ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $-\frac{\pi}{4}$ مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي الموجب



10

$$0 \leq \operatorname{Arg}(z - 3i) \leq \frac{3\pi}{4}$$



يمثل منحني المعادلة $\operatorname{Arg}(z - 3i) = \frac{3\pi}{4}$ شعاعاً (نرسمه متصلًا بسبب وجود مساواة في المتباينة) يبدأ من النقطة $(0, 3)$ ولا يشملها، ويصنع

زاوية قياسها $\frac{3\pi}{4}$ مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي الموجب

ويمثل منحني المعادلة $0 = \operatorname{Arg}(z - 3i)$ شعاعاً (نرسمه متصلًا بسبب وجود مساواة في المتباينة) يبدأ من النقطة $(0, 3)$ ولا يشملها، ويصنع

زاوية قياسها 0 مع مستقيم يوازي المحور الحقيقي الموجب

المحل الهندسي للنقاط التي تحقق المتباينة المطلوبة هو الجزء المظلل من المستوى المركب كما في الشكل المجاور:




11

$$|z - 2i| > 2 \rightarrow |z - (2i)| > 2$$

المنحنى الحدودي لهذه المتباينة معادلته $|z - 2i| = 2$ ، وهو دائرة مركزها $(0, 2)$ وطول نصف قطرها وحدتان.

وبما أنه لا توجد مساواة في رمز المتباينة، فإننا نرسم المنحنى الحدودي متقطعاً.

أما منطقة المحل الهندسي فهي خارج الدائرة، لأن الأعداد المركبة التي تحقق المتباينة تبعد عن مركز الدائرة مسافة أكبر من طول نصف القطر.




12

$$|z| \leq 8$$

المنحنى الحدودي لهذه المتباينة معادلته $|z| = 8$ ، وهو دائرة مركزها $(0, 0)$ وطول نصف قطرها 8 وحدات.

وبما أنه توجد مساواة في رمز المتباينة، فإننا نرسم المنحنى الحدودي متصلًا.


أما منطقة المحل الهندسي فهي داخل الدائرة وعلى محيطها وليس خارجها، لأن الأعداد المركبة التي تحقق المتباينة تبعد عن مركز الدائرة مسافة تقل عن طول نصف القطر أو تساويها.



13


$$|z - 5i| = 3 \rightarrow |z - (5i)| = 3$$

المحل الهندسي الذي تمثله هذه المعادلة هو دائرة مركزها $(0, 5)$ وطول نصف قطرها 3 وحدات





14



أكبر سعة للعدد المركب z تساوي قياس الزاوية $\angle EOA$ المحصورة بين مماس الدائرة OA والمحور الحقيقي الموجب

نصف قطر الدائرة AB عمودي على المماس OA في نقطة التماس A ,

$$OA = \sqrt{(OB)^2 - (AB)^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$$

$$\tan \angle BOA = \frac{3}{4} \rightarrow \angle BOA = \tan^{-1} \frac{3}{4} \approx 0.64$$

$$\text{m } \angle EOF \approx \frac{\pi}{2} + 0.64 \approx 2.21$$

القيمة العظمى لسعة الأعداد المركبة z التي تحقق المعادلة المعطاة هي 2.21



$$|z - 1 + i| \leq 1$$

المنحنى الحدودي لهذه المتباينة معايلته $|1 - i| = \sqrt{2}$ ، وهو دائرة (ترسم بخط متصل) مركزها $(1, -1)$ وطول نصف قطرها وحدة واحدة.

أما منطقة المحل الهندسي لمجموعة النقاط التي تحقق هذه المتباينة فهي داخل الدائرة وعلى محيطها.

$$-\frac{\pi}{3} < \operatorname{Arg}(z) < 0$$


يمثل منحنى المعادلة $\operatorname{Arg}(z) = -\frac{\pi}{3}$ شعاعاً (خط متقطع) يبدأ من النقطة $(0, 0)$ ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{3}$ مع المحور الحقيقي الموجب.

ويمثل منحنى المعادلة $\operatorname{Arg}(z) = 0$ شعاعاً (رسمه متقطعاً بسبب عدم وجود مساواة في المتباينة) يبدأ من النقطة $(0, 0)$ ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها 0 مع المحور الحقيقي الموجب

15

المحل الهندسي للنقاط التي تتحقق هذه المتباينة هو الجزء من المستوى المركب المحصور بين هذين الشعاعين

أما المحل الهندسي للنقاط التي تتحقق المتباينتين معاً فهو كما في الشكل:



16

$$\operatorname{Arg}(z + 2i) = \frac{3\pi}{4}$$

$$u = -7 + 7i, v = 7 + 7i$$

$$\operatorname{Arg}(u) = \pi - \tan^{-1}\left(\frac{7}{7}\right) = \pi - \tan^{-1}(1) = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

$$\operatorname{Arg}(v) = \tan^{-1}\left(\frac{7}{7}\right) = \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}$$

17



الزاوية بين u و v تساوي $\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ ، فالقطعة المستقيمة uv قطر لهذه الدائرة،

ومركزها هو نقطة منتصف هذه القطعة وهي $\left(\frac{-7+7}{2}, \frac{7+7}{2}\right)$ أي $(0, 7)$ ، وطول نصف

$$\text{قطرها يساوي } 7 = \sqrt{(7-0)^2 + (7-7)^2}$$

$$\text{إذن، معادلة الدائرة المطلوبة هي: } |z - 7i| = 7$$



$$u = -1 - i \rightarrow u^2 = (1 + i)^2 = 2i$$

$$|z| < 2$$

المنحنى الحدوبي لهذه الممتباينة معادلته $|z| = 2$ ، وهو دائرة مركزها $(0, 0)$ وطول نصف قطرها 2 وحدات.

وبما أنه لا توجد مساواة في رمز الممتباينة، فإننا نرسم المنحنى الحدوبي متقطعاً.

أما منطقة المحل الهندسي لمجموعة النقاط التي تتحقق هذه الممتباينة فهي داخل الدائرة، لأن الأعداد المركبة التي تتحقق الممتباينة تبعد عن مركز الدائرة مسافة تقل عن طول نصف القطر.

$$|z - u^2| < |z - u| \rightarrow |z - 2i| < |z - (-1 - i)|$$


$$|z - 2i| = |z - (-1 - i)|$$

وهو المنصف العمودي للقطعة المستقيمة التي طرفاها $(-1, -1)$ و $(0, 2)$.
وبما أنه لا توجد مساواة في رمز الممتباينة، فإننا نرسم المنحنى الحدوبي متقطعاً.

نحدد جهة المنحنى الحدوبي التي تتحقق الممتباينة باختيار $0 = z$ مثلاً وتعويضه في الممتباينة،

$$18 \quad |0 - 2i| < |0 + 1 + i| \rightarrow 2 > \sqrt{2} \quad \checkmark$$

بما أن العدد 0 يتحقق الممتباينة، فإن منطقة الحلول الممكنة هي المنطقة التي تحوي $z = 0$ المظللة في الرسم أدناه.





19	<p>$z - 3i = 13$</p> <p>المحل الهندسي الذي تمثله هذه المعادلة هو دائرة مركزها $(0, 3)$ وطول نصف قطرها 13 وحدة</p> $\text{Arg}(z - 4) = \frac{\pi}{4}$ <p>المحل الهندسي لهذه المعادلة هو شعاع ينطلق من النقطة $(4, 0)$ ولا يشملها، ويصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{4}$ مع المحور الحقيقي الموجب أي أن ميله يساوي 1 ومعادلته هي : $y - 0 = 1(x - 4)$ أي : $y = x - 4$</p> <p>لإيجاد الأعداد المركبة التي تتحقق المعادلتين معاً، نجد نقاط تقاطع المنحنيين:</p> $x^2 + (y - 3)^2 = 169 \quad \text{و} \quad y = x - 4, y \geq 0, x \geq 0$ $x^2 + (x - 4 - 3)^2 = 169$ $2x^2 - 14x + 49 = 169$ $x^2 - 7x - 60 = 0$ $(x + 5)(x - 12) = 0$ $x = 12 \rightarrow y = 8$ <p>العدد المركب الذي يتحقق المعادلتين معاً هو: $z = 12 + 8i$</p>
----	--



$$|z - 3 - 2i| = 5$$

المحل الهندسي الذي تمثله هذه المعادلة هو دائرة مركزها $(3, 2)$ وطول نصف قطرها 5 وحدات

$$(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 25$$

$$|z - 6i| = |z - 7 + i|$$

هذه هي معادلة المنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواقلة بين النقطتين $(0, 6), (7, -1)$ ، الذي يمر بالنقطة $(3.5, 2.5)$ وميله 1، ومعادلته هي: $y = x - 1$ أي: $y - 2.5 = 1(x - 3.5)$
 لإيجاد الأعداد المركبة التي تحقق المعادلتين معاً، نجد نقاط تقاطع المنحنيين:

$$(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 25$$
 و $y = x - 1$ بالتعويض:


$$20 \quad (x - 3)^2 + (x - 1 - 2)^2 = 25$$

$$2x^2 - 12x + 18 = 25$$

$$2x^2 - 12x - 7 = 0$$

$$x = \frac{6 \pm 5\sqrt{2}}{2}$$

$$y = \frac{4 \pm 5\sqrt{2}}{2}$$



العدنان المركبان اللذان يتحققان المعادلتين معاً هما:

$$z_1 = \frac{6+5\sqrt{2}}{2} + \frac{4+5\sqrt{2}}{2}i, \quad z_2 = \frac{6-5\sqrt{2}}{2} + \frac{4-5\sqrt{2}}{2}i$$

المنحنى الحدوبي هنا هو المنصف العمودي للقطعة المستقيمة الواقلة بين النقطتين

21

$$(4, 1), (1, 6)$$
 ومعادلته هي: $|z - 4 - i| = |z - 1 - 6i|$

ولأن المنطقة المظللة تشمل النقاط الأقرب إلى النقطة $(4, 1)$ ، والخط الحدوبي متقطع، فإن المتباينة هي:

$$|z - 4 - i| < |z - 1 - 6i|$$

22

المنحنى الحدوبي هنا هو دائرة مركزها $(0, 3)$ وطول نصف قطرها 4 وحدات ومعادلتها هي:

$$|z - 3i| = 4$$

ولأن المنطقة المظللة تشمل النقاط الواقعة داخل الدائرة، ولأن المنحنى الحدوبي متقطع، فإن المتباينة هي:

$$|z - 3i| < 4$$

23

مركز الدائرة هو $(1, 4)$ ، وطول نصف قطرها 4 وحدات والتظليل داخلها وهي مرسومة متصلة فالممتباينة التي تصفها هي: $|z - 1 - 4i| \leq 4$

ولدينا شعاعان متصلان منطلقان من النقطة $(2, 3)$ ، السفلي يصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{4}$ مع الخط الأفقي،

والعلوي يصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{2}$ مع الخط الأفقي وتم تظليل المنطقة المحصورة بينهما، فالممتباينة التي تصف هذه المنطقة هي $\frac{\pi}{4} \leq \text{Arg}(z - 2 - 3i) \leq \frac{\pi}{2}$

إذن، نظام المتباينات الذي تمثله المنطقة المظللة هو:

$$|z - 1 - 4i| \leq 4, \quad \frac{\pi}{4} \leq \text{Arg}(z - 2 - 3i) \leq \frac{\pi}{2}$$