



R q ↑ خ  
ادارة الامتحانات والاختبارات  
قسم الامتحانات العامة



## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٢ - التكميلي

(وثيقة محمية/محظوظ)

مدة الامتحان:  $\frac{٣٠}{٢}$  س

اليوم والتاريخ: الأربعاء ٢٣/١/٢٠٢٠

رقم الجلوس:

المبحث : الرياضيات/ الورقة الثانية، ف، م، الرياضيات الإضافية

الفرع: (ابي، شرعي، معلوماتية ، صحي، فندي جامعات) رقم المبحث: 205

رقم النموذج: (١)

اسم الطالب:

ملحوظة مهمة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٤)؛ بحيث تكون إجابتك عن السؤال الأول على نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي)، وتكون إجابتك عن باقي الأسئلة على دفتر الإجابة، علماً أنّ عدد صفحات الامتحان (٥).

السؤال الأول: (١٠٠ علامة)

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة معاً يأتي، ثم ظلل بشكل غامق دائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك في هذا السؤال، علماً أنّ عدد فقراته (٢٥).

(١) إذا كان  $q$  اقترائياً متصلأً ، وكان  $s = \sqrt[3]{s^3 - s^2}$  ، فما قيمة  $\frac{1}{s}$  عند  $s = 1$  ؟

- أ) ٢ ب) ٢- ج) ٥ د) ٥-

(٢) إذا كان  $s = 7$  ، فما يساوي :

- أ)  $-s + 7$   
ب)  $-s - 7$   
ج)  $s - 7$

(٣) إذا كان  $s^2 = 14$  ، فما قيمة الثابت  $l$  ؟

- أ) ٢ ب) ٢-

(٤) إذا كان  $s^3 + 4s - 1 = 0$  ، فما يساوي :

- أ) صفر ب) ٢ ج) ٢-

(٥) إذا كان  $q$  اقترائياً قابلاً للاشتقاق ، وكان  $q(s) = s^3 - 3s^2$  ، فما قيمة  $(q(1) - q(-1))$  ؟

- أ) ٢ ب) ١ ج) صفر د) ٢-

(٦) إذا كان  $m = s^3 - 3s$  ، فما قيمة الثابت  $m$  ؟

- أ) ٤ ب) ٤ ج) ١٢ د) ١٢

(٧) إذا كان  $q(s) = \frac{3}{4}s$  ، فإن  $q(s)$  دس يساوي :

- أ)  $\frac{3}{4}$  ب)  $-\frac{3}{4}$  ج)  $\frac{4}{3}$  د)  $-\frac{4}{3}$

الصفحة الثانية/ نموذج (١)

(٨) دس يساوي :

$$\text{ب)} \frac{(س-٢)(س-٣)}{١٨} + ج$$

$$\text{د)} -\frac{(س-٢)(س-٣)}{١٨} + ج$$

$$\text{أ)} ج + \frac{(س-٢)(س-٣)}{٦}$$

$$\text{ج)} -\frac{(س-٢)(س-٣)}{٦} + ج$$

(٩)  $\frac{س^٣-٤س^٢}{س}$  دس ، س ≠ صفر يساوي :

$$\text{ب)} \frac{٤}{٣}س^٣ - س^٢ + ج$$

$$\text{د)} \frac{٤}{٣}س^٣ + س^٢ + ج$$

$$\text{أ)} س^٢ + س^٣ + ج$$

$$\text{ج)} س^٢ - س^٣ + ج$$

(١٠) قيمة  $\frac{١}{س}$  دس تساوي :

$$\text{د)} -١$$

$$\text{ج)} ١$$

$$\text{ب)} -٢$$

$$٢$$

(١١) إذا كان  $ق(s)$  دس = ٦ ،  $ه(s)$  دس = -٢ ، فما قيمة  $\frac{٢(ق(s)+ه(s))}{س}$  دس ؟

$$\text{د)} ٤$$

$$\text{ج)} ٨$$

$$\text{ب)} ١٠$$

$$١٤$$

(١٢)  $ج(s-١)$  دس يساوي :


$$\text{ب)} -ج(s-١) + ج$$

$$\text{د)} -\frac{١}{٢}ج(s-١) + ج$$

$$\text{أ)} ج(s-١) + ج$$

$$\text{ج)} \frac{١}{٢}ج(s-١) + ج$$

(١٣) معتمداً الشكل المجاور الذي يمثل منحنى الاقتران  $ق(s)$  ، إذا كانت المساحة  $M = ٢$  وحدة مساحة ، المساحة  $M = ٦$  وحدة مساحة ، فما قيمة  $\frac{٢}{س} ق(s)$  دس ؟



$$\text{ب)} -٤$$

$$\text{د)} ٨$$

$$٤$$

$$٨$$

(١٤) إذا كان ميل المماس لمنحنى الاقتران  $q$  عند النقطة  $(s, ص)$  يعطى بالعلاقة  $q'(s) = س^٣ - ١$  ، وكان منحنى الاقتران يمر بالنقطة  $(٠, -١)$  ، فما قاعدة الاقتران  $q(s)$  ؟

$$\text{ب)} q(s) = س^٣ + ١$$

$$\text{د)} q(s) = س^٣$$

$$\text{أ)} q(s) = س^٣ - ١$$

$$\text{ج)} q(s) = س^٣$$

(١٥) إذا كان ميل المماس لمنحنى الاقتران  $ص = q(s)$  عند النقطة  $(s, ص)$  يساوي  $(٢s+١)$  ، وكان منحنى الاقتران  $q$  يمر بالنقطة  $(٠, ٣)$  ، فما قيمة  $q(١)$  ؟

$$\text{د)} ٦$$

$$\text{ج)} ٥$$

$$\text{ب)} ٢$$

$$٥$$

**الصفحة الثالثة/ نموذج (١)**

١٦) بكم طريقة يمكن اختيار قميص وحذاء لشريكه من محل تجاري يبيع (٦) أنواع من القمصان و(٤) أنواع من الأحذية؟

د)  $\frac{!6}{!4 \times !2}$

ج)  $4 \times 6$

ب)  $\frac{!6}{!4 - !2}$

أ)  $!4 \times !6$

١٧) إذا كان  $(2^n)! = 24$  ، فما قيمة  $n$ ؟

د) ١

ج) ٢

ب) ٤

أ) ١٢

١٨) إذا كان  $L(6, r) = 120$  ، فما قيمة  $r$ ؟

د) ٥

ج) ٤

ب) ٣

أ) ٢

١٩) إذا كان  $(\frac{s}{3}) = (\frac{s}{4})$  ، فما قيمة  $s$ ؟

د) ١٢

ج) ٧

ب) ٤

أ) ٣

٢٠) إذا كان  $8 = \frac{!(n+2)}{!(n+1)}$  ، فما قيمة  $n$ ؟

د) ٤

ج) ٦

ب) ٨

أ) ١٠

٢١) إذا كان المتوسط الحسابي لعلامات طلبة في مادة العلوم (٦٠) والانحراف المعياري لها (٤) ، فما العلامة المعيارية

للعلامة (٥٦)؟

د) ٤

ج) ١

ب) -١

أ) -٤

٢٢) إذا كان  $(z)$  متغيراً عشوائياً طبيعياً معيارياً ، وكان  $L(z \geq 0, 8) = 0.8$  ، فما قيمة  $L(z \leq -0.2)$ ؟

د) ٠.٢

ج) ٠.٠٢

ب) ٠.٠٨

أ) ٠.٢

٢٣) إذا كان  $s$  ،  $c$  متغيرين عدد قيم كل منها (٦) ، وكان  $\sum_{r=1}^6 (s_r - \bar{s})^2 = 64$  ،  $\sum_{r=1}^6 (c_r - \bar{c})^2 = 4$

$$\sum_{r=1}^6 (s_r - \bar{s})(c_r - \bar{c}) = 12$$

د)  $\frac{1}{4}$

ج)  $\frac{3}{4}$

ب)  $\frac{3}{64}$

أ)  $\frac{1}{64}$

٢٤) إذا كان معامل ارتباط بين المتغيرين  $s$  ،  $c$  هو (٠.٧) ، فما قيمة معامل الارتباط بين  $s^*$  ،  $c^*$  حيث  $s^* = 3 - s$  ،  $c^* = 4 + c$ ؟

د) -٠.٣

ج) ٠.٣

ب) ٠.٧

أ) ٠.٧

٣	٢	١	٠	$s$
٠.١	ك٢	٠.٣	٠.٢	$L(s)$

٢٥) معتمداً الجدول المجاور الذي يمثل التوزيع الاحتمالي

للمتغير العشوائي  $s$  ، ما قيمة الثابت  $k$ ؟

ب) ٠.٨

د) ٠.٠٢

أ) ٠.٨

ج) ٠.٠٢

السؤال الثاني: (٣١ علامة)

أ) جد كلاً من التكاملات الآتية :

$$(1) \int_{s=2}^{s=3} \frac{16+s^3}{s+2} ds , s \neq -2$$

$$(2) \int_{s=3}^{s=2} (s^2 + l^3) ds , \text{ حيث } l \text{ ثابت}$$

(١٨ علامة)

$$(3) \int_{s=9}^{s=4} \frac{s^4}{s^2 + 9} ds$$

ب) إذا كان  $\int_{s=-2}^{s=2} (q(s)-1) ds = -4$  ، فجد قيمة  $\int_{s=-2}^{s=3} (q(s)-s^2) ds$  (٧ علامات)

ج) يتحرك جسم على خط مستقيم بتسارع ثابت يعطى بالقاعدة  $T(n) = 8n^2$  ، جد موقع الجسم بعد مرور ثانتين من بدء الحركة ، علماً أن سرعته الابتدائية  $U(0) = 6$  سم/ث ، وموقعه الابتدائي  $F(0) = 12$  سم . (٦ علامات)

السؤال الثالث: (٣٣ علامة)

أ) جد مساحة المنطقة المغلقة المحصورة بين منحني الاقتران  $q(s) = -s^4$  ومحور السينات (٩ علامات)

(١٤ علامة)

ب) أجب عن كل مما يأتي :

$$(1) \text{ جد قيمة : } \frac{1}{6!} \times \frac{(6, 3)}{2!} \times \frac{5}{3} \times \dots$$

(٢) جد قيمة  $n$  التي تحقق المعادلة الآتية :

$$(n+1)! = 3L(205) \left(\frac{9}{2}\right)^9$$

ج) مجموعة مكونة من (٧) معلمين و (٣) إداريين ، ما عدد الطرق التي يمكن بها تكوين لجنة ثلاثة منهم تتكون من معلمين اثنين على الأكثر؟ (١٠ علامات)

السؤال الرابع: (٣٦ علامة)

أ) صندوق يحتوي (٦) كرات حمراء ، (٤) كرات بيضاء ، سُحبت من الصندوق كرتان على التوالي مع الإرجاع ، إذا دلَّ المتغير العشوائي  $S$  على عدد الكرات الحمراء المسحوبة ، فاكتب جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي ( $S$ )  
 (١٢ علامة)

ب) إذا كانت رواتب ١٠٠٠ موظف تتبع توزيعاً طبيعياً متوسطه الحسابي ٤٠٠ دينار وانحرافه المعياري ٥٠  
 فما عدد الموظفين الذين تزيد رواتبهم على ٥٠٠ دينار؟  
 (١٠ علامات)

ملاحظة : يمكنك الاستفادة من الجدول الآتي الذي يمثل جزءاً من جدول التوزيع الطبيعي المعياري

٢	١,٥	١	٠,٥	٠	٤
٠,٩٧٧٢	٠,٩٣٣٢	٠,٨٤١٣	٠,٦٩١٥	٠,٥٠٠٠	$P(z \geq)$

ج) يبين الجدول الآتي علامات (٥) طلاب في امتحان الرياضيات (س) والعلوم (ص) ، جد معادلة خط الانحدار للتتبُّع بقيم (ص) إذا علمت قيم (س) .  
 (١٤ علامة)

رقم الطالب	الرياضيات (س)	العلوم (ص)
٥	٤	٣
٤	٧	٨
٨	٥	١٠
٢	٥	٨
١	٦	٩

«انتهت الأسئلة»