

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣

(وثيقة محمية/محدود)

س د
٣ : ٢
مدة الامتحان: ٣٠ : ٢
اليوم والتاريخ: الاثنين ١٠/٧/٢٠٢٣
رقم الجلوس:

رقم المبحث: 209

رقم النموذج: (١)

المبحث: الرياضيات (الورقة الأولى، ف١)

الفرع: العلمي + الصناعي جامعات

اسم الطالب:


ملحوظة مهمة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٥)؛ بحيث تكون إجابتك عن السؤال الأول على نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي)، وتكون إجابتك عن باقي الأسئلة على دفتر الإجابة، علماً أنّ عدد صفحات الامتحان (٦).

السؤال الأول: (١٠٠ علامة)

✦ اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة ممّا يأتي، ثمّ ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك في هذا السؤال، علماً أنّ عدد فقراته (٢٥).

• معتمداً الشكل المجاور الذي يمثل منحنى الاقتران ق المعرف على مجموعة الأعداد الحقيقية ح،

أجب عن الفقرتين ١، ٢ الآتيتين:



(١) نها (ق) (١-س) - س تساوي:

(ب) ١

(د) ٢-

(أ) صفر

(ج) ١-

(٢) نها ق (س) تساوي:

س ← ١

(د) غير موجودة

(ج) ٣

(ب) ١

(أ) ١-

(٣) إذا كان ق (س) كثير حدود يمر منحناه بالنقطة (٥، ٨) وكانت نها (٢-ل) (س) = ٤،

س ← ٢

فإنّ نها (٣ق) (٢+س) + ٦ل (س) تساوي:

س ← ٢

(د) ٣٦

(ج) ١٨

(ب) ١٢

(أ) ٣٠

(٤) نها جا (٥+س) س - ٢٥ تساوي:

س ← ٥

(د) ١٠-

(ج) ١٠

(ب) ١

(أ) ١-

الصفحة الثانية/نموذج (١)

٥) هنا $\frac{|س-٢|-٣}{س-١}$ تساوي:

- (أ) ٢ - (ب) ٢ (ج) صفر (د) غير موجودة

٦) هنا $\frac{٢جاس-١}{٣س-٣}$ تساوي:

- (أ) $\sqrt{٣}$ (ب) $-\sqrt{٣}$ (ج) $\frac{\sqrt{٣}}{٣}$ (د) $-\frac{\sqrt{٣}}{٣}$

٧) إذا كان ق (س) = $\left. \begin{array}{l} \frac{س^٢ + ٢(٢-٣س) + ٦}{٣-س} ، س \neq ٣ \\ ٤س-١ ، س = ٣ \end{array} \right\}$ ، متصلاً عند س = ٣ ، فإن قيمة الثابت له تساوي:

- (أ) ٤ - (ب) ٧ (ج) ٧ - (د) ٤

٨) إذا كان ميل القاطع لمنحنى الاقتران ق (س) المار بالنقطتين (١ ، ق (١)) ، (٤ ، ق (٤)) يساوي -٣ ، وكان ه (س) = ٢س - ق (س) ، فإن معدل التغير في الاقتران ه في الفترة [١ ، ٤] يساوي:

- (أ) ٥ (ب) ٥ - (ج) ٣ (د) ٣ -

٩) إذا كان ق (س) = $\frac{١}{جاس}$ حيث $س \in (٠ ، \frac{\pi}{٢})$ ، فإن ق $(\frac{\pi}{٤})$ تساوي:

- (أ) $\sqrt{٢}$ (ب) ٢ - (ج) ٢ (د) $-\sqrt{٢}$

١٠) إذا كان ق (٠) = ٨ ، فإن هنا $\frac{ق (٠) - ق (٧هـ)}{٤هـ}$ تساوي:

- (أ) ١٤ (ب) ١٤ - (ج) ٨ (د) ٨ -

١١) إذا كان ق (س) اقتراناً قابلاً للاشتقاق وكان ه (س) = ٢س - ق (س) ، حيث ق (٢) = ٣ ، ق (٢) = ٥ ، فإن ه (٢) تساوي:

- (أ) ٩ (ب) ٤ - (ج) ٤ (د) ٩ -

يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة / نموذج (١)

(١٢) إذا كان $v = 2^2 s$ ، فإن $\frac{v}{s} = \frac{\pi}{8}$ عندما $s = \frac{\pi}{8}$ تساوي:

- (أ) ٢ (ب) ٢- (ج) ١ (د) ١-

(١٣) إذا كان $q(s) = \sqrt{s^2 + 5}$ ، فإن $q'(s) = \frac{3-s}{s-2}$ تساوي:

- (أ) $\frac{4}{3}$ (ب) $\frac{4}{3}$ (ج) $\frac{2}{3}$ (د) $\frac{2}{3}$ -

(١٤) إذا كان $q(s) = 5s - 4(3+s)s^2$ ، فإن قيمة الثابت h التي تجعل $q'(s) = 0$ تساوي:

- (أ) ٣- (ب) ٣ (ج) ٢٤- (د) ٢٤

(١٥) إذا كان $v = 3^2 s^2 - 2s + 5$ ، فإن $\frac{v}{s} = 0$ عندما $s = 0$ تساوي:

- (أ) ٣٢ (ب) ٤٠- (ج) ٣٢- (د) ٤٠

(١٦) إذا كان $q(s) = \sqrt{s}$ ، فإن $q'(-8)$ تساوي:

- (أ) $\frac{4}{3}$ (ب) $\frac{1}{12}$ - (ج) $\frac{1}{12}$ (د) $\frac{4}{3}$ -

(١٧) إذا كان $q(s) = s\left(\frac{4}{s} - 2\right)$ ، $s \neq 0$ ، فإن $q'(-1)$ تساوي:

- (أ) ٢ (ب) ١- (ج) ١ (د) ٢-

(١٨) إذا كان $q(s) = \frac{[s] - 2}{|s|}$ ، $s \neq 0$ ، فإن $q'\left(\frac{1}{3}\right)$ تساوي:

- (أ) ٢٧- (ب) ٢٧ (ج) ٩- (د) ٩

(١٩) إذا كان q ، h اقترانين قابلين للاشتقاق وكان $h\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$ ، $h'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2$ ، $q(s) = 2s^2$ ، $h \Rightarrow c$ ،

(ق^٥ هـ) $\left(\frac{\pi}{4}\right) = 24$ ، فإن قيمة الثابت h تساوي:

- (أ) ١٢- (ب) ١٢ (ج) ٦ (د) ٦-


الصفحة الرابعة/نموذج (١)

٢٠) إذا كان هـ، ل اقترانين قابلين للاشتقاق وكان ل (س) = هـ(٢س)، هـ(٢) = ١، فإن ل $\left(\frac{\pi}{6}\right)$ تساوي:

- (أ) $\frac{4}{3\sqrt{3}}$ (ب) $\frac{4}{3\sqrt{3}}$ (ج) $\frac{4}{3\sqrt{3}}$ (د) $\frac{4}{3\sqrt{3}}$

٢١) إذا كانت معادلة العمودي على المماس لمنحنى الاقتران ق عند النقطة (١، ٤) تعطى بالعلاقة: $٣ص = ٥س + ٧$ ، فإن ق(١) تساوي:

- (أ) $\frac{3}{5}$ (ب) $\frac{5}{3}$ (ج) $\frac{5}{3}$ (د) $\frac{3}{5}$



٢٢) معتمداً الشكل المجاور الذي يمثل منحنى المشتقة الأولى للاقتران ق المعرفة على مجموعة الأعداد الحقيقية ح، فإن منحنى الاقتران ق يكون مقعراً للأسفل في الفترة:

- (أ) $[0, \infty)$ (ب) $(-\infty, 0]$ (ج) $[-2, 2]$ (د) $(-\infty, 2]$

٢٣) إذا كانت ف(ن) = $٢٠ن - ٥ن^٢$ هي العلاقة الزمنية لحركة جسيم على خط مستقيم حيث ف: المسافة بالأمتار، ن: الزمن بالثواني، فإن اللحظة الزمنية بالثواني التي يكون فيها تسارع الجسيم مثلي سرعته تساوي:

- (أ) $\frac{3}{2}$ (ب) ٣ (ج) ٥ (د) $\frac{5}{2}$

٢٤) يتحرك جسيم على خط مستقيم وفق العلاقة ف(ن) = $\sqrt{٢٠ن + ١٨}$ ، حيث ف: المسافة بالأمتار، ن: الزمن بالثواني. ما المسافة التي يقطعها الجسيم عندما تكون سرعته ٢١ / ث ؟

- (أ) ٢٣ (ب) ٢٦ (ج) ٢٩ (د) ٢١٨

٢٥) إذا كان ق(س) = $٣س - ١٢س + ١$ ، $س \in [١, ٣]$ ، فإن مجموعة قيم س الحرجة للاقتران ق هي:

- (أ) $\{٢, ٢-\}$ (ب) $\{٣, ١, ٢-\}$ (ج) $\{٣, ٢, ١\}$ (د) $\{٣, ٢, ١, ٢-\}$

السؤال الثاني: (٢٨ علامة)

(أ) جد كَلَّا مِمَّا يَأْتِي:

(۱) $\frac{2 - \sqrt{s^3 + 3}}{s - 1}$ نہا

(۱۰ علامات)

(۲) $\frac{\text{جا ۲ س} - ۲ \text{ جا س}}{\text{س}}$

(۸ علامات)

$$\left. \begin{array}{l} 2 > s > 1, \quad \frac{s-2}{s-1} \\ 3 \geq s \geq 2, \quad s - [s] \end{array} \right\} = \text{(ب) إذا كان ق(س) =}$$

، فابحث في اتصال الاقتران ق على مجاله.

(۱۰ علامات)

السؤال الثالث: (٢٤ علامة)

(أ) إذا كان $q(s) = s + \frac{1}{s}$ ، $s < 0$ ، فجد $Q(s)$ باستخدام تعريف المشتقة.

(١٢ علامة)

(ب) إذا كان $ق(س) = \left\{ \begin{array}{l} ٣س + ٩ + ب ، س \leq ١ \\ ٣س + ٣ - ب ، س > ١ \end{array} \right.$ ، وكانت $ق(١)$ موجودة ،

فجد قيمة كلاً من الثابتين a, b .

(١٢ علامة)

يتبع الصفحة السادسة

السؤال الرابع: (٢٤ علامة)

(أ) جد معادلتى المماسين لمنحنى العلاقة: $s = v^2 - 3v$ عند نقطتي تقاطع منحناها مع محور الصادات. (١٢ علامة)

(ب) إذا كان $Q(s) = 3s^2 - s^3 + 2$ ، $s \in [0, 5]$ ، فجد كلاً ممّا يأتي: (١٢ علامة)

(١) فترات التزايد وفترات التناقص لمنحنى الاقتران Q .


(٢) القيم القصوى للاقتران Q (إن وجدت) مبيئاً نوعها.

(٣) الفترة (الفترات) التي يكون فيها منحنى الاقتران Q مقعرًا للأعلى.

السؤال الخامس: (٢٤ علامة)

(أ) بالون كروي الشكل حجمه 60π سم^٣، يتناقص حجمه نتيجة تسرب الغاز منه بمعدل ثابت مقداره 4π سم^٣/ث، بحيث يبقى محافظاً على شكله الكروي. جد معدل تغير مساحة سطح هذا البالون بعد مرور ٦ ثوانٍ من بدء تسرب الغاز منه.

(١٢ علامة)



(١٢ علامة)

(ب) يمثل الشكل المجاور حائطاً عمودياً ارتفاعه ٣ أمتار، ويبعد ٣ أمتار عن أحد المنازل. جد طول أقصر سلم يصل من الأرض إلى أعلى المنزل مرتكزاً على الحائط.

﴿ انتهت الأسئلة ﴾