



٩ ٤ ت

ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤ التكميلي

٣

٤

مدة الامتحان: ٣٠ دس
اليوم والتاريخ: الإثنين ٢٠٢٤/١٢/٣٠
رقم الجلوس:

(وثيقة محمية/محدود)

المبحث: الإنتاج النباتي/الورقة الأولى، ف ١ رقم المبحث: 348
الفرع: الزراعي رقم النموذج: (١)
اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامقدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أنَّ عدد الفقرات (٤٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- النبات الذي يحمل براعمه الشمرية جانبياً على دواير ثمرة عمرها سنتان أو أكثر، أو على ثُموات الموسم السابق، ويعطي البرعم الذهري الواحد زهرة بيضاء واحدة، هو:

- (أ) المشمش (ب) اللوز (ج) البرقوق (د) الدرّاق

٢- منطقة زراعية في الأردن، مجموع ساعات البرودة فيها لا يزيد على (٣٠٠) ساعة برودة خلال فصل الشتاء، أيَّ أنواع الفاكهة الآتية يمكن زراعتها في هذه المنطقة؟

- (أ) النكتارين (ب) اللوز (ج) الكرز الحلو (د) البرقوق الياباني

٣- أصل اللوزيات الذي لا يتوافق مع أصناف الدرّاق والنكتارين:

- (أ) الدرّاق البذرّي (ب) G.F.677 (ج) البرقوق (د) اللوز البذرّي

٤- جميع العوامل الآتية مهمّة في تحديد مسافات الزراعة في اللوزيات، ما عدا:

- (أ) حجم الأشجار النهائي في مرحلة النضج (ب) نوع الأصل المطعم عليه
(ج) طريقة التربية للأشجار (د) نوع الأسمدة المستخدمة

٥- من علامات تضيّع اللوزيات الكثافة النوعية للثمرة، مثل نبات:

- (أ) الكرز (ب) اللوز (ج) الدرّاق (د) النكتارين

٦- يُعرف النمو القصير نسبياً، والذي يحمل براعم زهرية، إما جانبياً، وإما قميّاً، ويتراوح عمر هذا النمو بين سنة واحدة وبضع سنوات بـ:

- (أ) البرعم البسيط (ب) الدابرة الشمرية (ج) البرعم المختلط (د) الطرود المائية

٧- تهدف الحراثة الريفيّة لبساتين التقاحيات إلى:

- (أ) التخلّص من الأعشاب الصيفية (ب) خلط الأسمدة الكيميائية
(ج) تهيئة التربة لاستيعاب الأمطار (د) خلط الأسمدة العضوية

٨- أصل التقاح الذي تحتاج أشجاره المطعمّة عليه إلى سنوات عديدة لدخول مرحلة الإثمار، هو:

- (أ) البذرّي (ب) M26 (ج) M7 (د) M9

الصفحة الثانية

- ٩- من أصناف النقاو ديلشص، والذي يتميز بأشجاره القوية والقائمة، وإنتاجيته الجيدة، وثماره متوسطة إلى كبيرة الحجم ولونها:
- (أ) أصفر لامع
(ب) أحمر لامع
(ج) خضراء موشحة باللون الأحمر
(د) صفراء موشحة باللون الأحمر
- ١٠- جميع العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلق بالكمثرى، ما عدا:
- (أ) تحمل معظم البراعم الثمرة قميّاً على دوابر ثمرة
(ب) يعطي البراعم الذهري الواحد بين (٨-٥) أزهار
(ج) تعاني معظم أصنافها من ظاهرة المعاومة
(د) معظم أصنافها عديمة التوافق الذاتي
- ١١- من أنواع الحمضيات التي لا تحتاج إلى تلقيح وإخصاب لتكوين الثمار:
- (أ) المندلينا
(ب) برقال الفلنسيا
(ج) الكلمنتينا
(د) البوولي
- ١٢- تجود زراعة الحمضيات في المناطق المدارية الدافئة شتاءً، ويتوقف نموها عند درجة حرارة($^{\circ}\text{S}$):
- (أ) ١٠
(ب) ١٥
(ج) ٢٠
(د) ٣٠
- ١٣- من المشكلات التي تعاني منها أشجار الحمضيات عند حراستها بعمق واحد باستمرار:
- (أ) تثبيت كثير من عناصر التربة
(ب) تقطيع الجذور الصغيرة
(ج) انتشار مرض التصمّف
(د) تكون طبقة صماء تحت سطح التربة
- ١٤- تُعرف النموّات القوية والغضّة والطريّة التي تنشأ من براعم عرضية ساقنة على الساق أو الأفرع الرئيسية فوق سطح التربة بـ:
- (أ) البيوض
(ب) السرطانات
(ج) النورة غير الورقية
(د) الطرود المائية
- ١٥- أفضل درجة حموسة (PH) لنمو نبات الموز:
- (أ) ٤
(ب) ٥
(ج) ٦
(د) ٨
- ١٦- تظهر في بعض الأحيان بقع أرجوانية على أعناق أوراق الموز نتيجة نقص عنصر:
- (أ) الكبريت
(ب) الفسفور
(ج) المغنيسيوم
(د) المنغنيز
- ١٧- الهدف الرئيس لعملية إزالة البراعم الذكري في نبات الموز :
- (أ) منع انتشار عفن طرف السيجار
(ب) تأخير الإنتاج
(ج) منع تشوّه أصابع الموز
(د) تحسّن الإنمار
- ١٨- أنواع الأزهار التي تحملها أشجار الزيتون:
- (أ) الخنثى فقط
(ب) المؤنثة والمذكرة
(ج) المذكرة فقط
(د) الخنثى والمذكرة
- ١٩- العبارة الصحيحة في ما يتعلق بأشجار الزيتون هي:
- (أ) تنتج نورة عنقودية من النوع الراسيمي
(ب) تُحمل البراعم الذهري على دوابر ثمرة
(ج) يبدأ تراكم الزيت في الثمرة في شهر آب
(د) يبدأ التمايز الذهري في شهر شباط

الصفحة الثالثة

٢٠- طريقة تكثير الزيتون التي يُعاب عليها محدودية الغراس التي يمكن الحصول عليها، هي:

- أ) زراعة الأنسجة ب) العقل ج) البيوض د) التطعيم

٢١- تتراوح نسبة الزيت في ثمار صنف الزيتون الصوراني بين:

- أ) (%) ١٥-١٠ ب) (%) ١٢-١٨ ج) (%) ٢٥-٣٠ د) (%) ٢١-٣٥

٢٢- انخفاض الرطوبة الجوية عن (%) ٣٥ يؤثّر على نبات البندورة بشكل سلبي؛ لأنّه يُسبّب:

- أ) انتشار الأمراض الفطرية ب) زيادة نسبة الحموضة ج) موت حبوب اللقاح د) تساقط الأزهار

٢٣- يحتاج الدونم الواحد من أشجار البندورة في حالة الزراعة البعلية إلى:

- أ) ٢٥٠ ب) ٥٠٠ ج) ١٠٠٠ د) ١٥٠٠

٢٤- علامة التضيّع المناسبة لقطف ثمار البازنجان عندما تصل إلى الحجم واللون المناسبين، هي:

- أ) قبل تمام تضيّعها ب) عندما يصبح لونها بُنياً ج) بعد تمام تضيّعها
د) عندما يصبح لونها برونزياً

٢٥- يحتاج نبات البطاطا في المرحلة الأولى من حياته إلى كميات مناسبة من الماء؛ لأن نقصانها يؤدي إلى:

- أ) قلة عدد الدرنات المتكوّنة ب) صغر حجم الدرنات ج) قلة جودة الدرنات
د) اختصار الدرنات

٢٦- يرغب مزارع زراعة خمسة دونمات بنباتات الفلفل، إذا علمت أن المسافة بين الأتلام (١٠٠) سم،

وبيّن النباتات (٥٠) سم، فإن العدد الذي يلزم من أشجار الفلفل لزراعتها هو:

- أ) ١٠٠٠ ب) ٢٠٠٠ ج) ٥٠٠ د) ١٠٠٠

٢٧- العبارة الصحيحة في ما يتعلق بنبات الكوسا، هي:

- أ) نبات وحيد الجنس، وثنائي المسكن ب) ينتمي إلى الفصيلة البازنجانية
ج) نبات حولي يقاوم الصقيع

٢٨- يُزرع نبات الخيار في الأراضي الخفيفة بهدف:

- أ) الحصول على إنتاج غزير ب) التقليل من التسميد النيتروجيني
ج) تحسين جودة الثمار

٢٩- من أصناف الخيار المستخدمة في الزراعة المحمية:

- أ) نورا ب) حاتم ج) بيتا ألفا د) كاترينا

٣٠- الفصيلة النباتية التي ينتمي لها نبات اللفت:

- أ) البازنجانية ب) الخيمية ج) القرعية د) الصلبية

الصفحة الرابعة

- ٣١ - ارتفاع درجة الحرارة في أثناء تكوين رؤوس الزهرة يسبب:
- أ) انتشار دودة أوراق الملفوف
 - ب) حالة فسيولوجية تسمى الترير
 - ج) تكوين رؤوس كبيرة الحجم
- ٣٢ - تتراوح كمية إنتاج الدونم الواحد (بالطن) من نبات الفجل بين:
- أ) (٢-١)
 - ب) (٣-٢)
 - ج) (٤-٣)
 - د) (٥-٤)
- ٣٣ - السبب الرئيس لظهور بقع بنية اللون على جوانب قرون الفاصلولياع، ومن ثم تصبح مائمة غائرة، هو:
- أ) الرطوبة الجوية العالية
 - ب) شدة الإضاءة
 - ج) ارتفاع حموضة التربة
- ٣٤ - من الخضروات الشتوية التي تتنمي لفصيلة الخيمية، ولا تحمل الصقيع:
- أ) البقدونس
 - ب) الخس
 - ج) الملوخية
 - د) السبانخ
- ٣٥ - ظاهرة غير مرغوبه تُنْتَجُ من زراعة نبات الجزر بالأشتال تُعَرَّفُ بتكونِ جذور:
- أ) مُقرّعة
 - ب) غليظة
 - ج) باهته اللون
 - د) رفيعة وطويلة
- ٣٦ - السبب الرئيس في تكوين الأبصال المزدوجة في نبات البصل، هو:
- أ) الزراعة العميقه للأشتال
 - ب) عدم انتظام الري
 - ج) الإصابة بالبلاص الرغبي
 - د) ارتفاع درجات الحرارة
- ٣٧ - الموعد المناسب لزراعة نبات الثوم في شهر:
- أ) حزيران
 - ب) تموز
 - ج) أيلول
 - د) كانون أول
- ٣٨ - السبب الرئيس في زيادة نسبة المادة المخاطية في ثمار الباذنجان، هو:
- أ) زيادة كميات الري
 - ب) تعطيش النبات
 - ج) تأخير جمْعِ المحصول
 - د) تبكير جمْعِ المحصول
- ٣٩ - يحتوي نبات السبانخ على حامض:
- أ) السيتيريك
 - ب) الخلّيك
 - ج) الفولييك
 - د) الأكساليك
- ٤٠ - جميع العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلق بنبات الخس، ما عدا:
- أ) الزراعة السطحية للنبات تُعطِي رؤوساً صغيرة الحجم
 - ب) محصول شتوي يحتاج إلى حرارة معتدلة تميل إلى البرودة
 - ج) يُزرع في الأراضي متوسطة القوام
 - د) يُصاب بالأمراض النباتية كالبلاص الدقيقي

﴿انتهت الأسئلة﴾